Herm. A. Hesse

Preisliste Herbst 1937 Frühjahr 1938

Wiederverkäufern

gewähre ich auf sämtliche Preise dieses Verzeichnisses

25 % Rabatt.

HERM. A. HESSE
BAUMSCHULEN
WEENER (EMS)

Herbst 1937 *Frühjahr 1938*

58. Jahrgang

Preis- und Sortenliste

über winterharte Freilandpflanzen

aller Art von

HERM. A. HESSE

BAUMSCHULEN

WEENER/EMS

Ostfriesland, Prov. Hannover
Deutschland

Bankverbindungen:
Reichsbankgirokonto Nr. 92 in Leer (Ostfriesland) / Oldenburgische Landesbank (Spar- u. Leihbank) A.-G., Fil. Leer, Leer (Ostfriesland) Sparkasse (Zweckverbandsparkasse) Weener - Holthusen, Weener

Telegramm-Adresse: Hesse Baumschulen Weener

Postscheckkonto: Hannover 1342 / Fernruf: Weener 17

Gegründet 1879

Meine Baumschulen sind Mitglied der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand, gehören zu den vom Reichsnährstand als markenfähig anerkannten Betrieben und sind somit berechtigt zur Führung des Markenetiketts für Baumschulerzeugnisse der Ersten Güteklasse.

Reisevertretung:

Rudolf Bedau, Magdeburg, Herderstr. 5

H. H. Rulemann Grisson, Ahrensburg, Hamburger Str. 129

Zum Geleit!

Der vorliegende 58. Jahrgang meiner alljährlichen Preis- und Sortenliste über sämtliche Freilandpflanzen möge erneut Zeugnis ablegen von meinem Bestreben, den aufmerksamen Leser nicht nur über Sorten, Mengen und Preise der zum Verkauf gestellten Pflanzen zu unterrichten, sondern ihm auch alle erdenklichen Mitteilungen zu machen — wenn auch nur in verständlicher Kürze —, die ihm bei Auswahl, Verwendung und Pflege des reichen Materials von großem Nutzen sein können. Sämtliche Freilandpflanzen für Garten und Park, Siedlung und Forst, Sportplatz und Friedhof sind bei mir aus eigenen Kulturen zu erhalten, wodurch der Käufer erhebliche Unkosten an Porto und Fracht sparen kann. Dabei möchte ich betonen, daß mein Verzeichnis alljährlich lediglich die Pflanzen aufführt, die als Verkaufsware in den eigenen Kulturen vorrätig sind, während meine gesamten Sortimente wesentlich umfangreicher sind. Meine bekannt reichhaltigen Sortimente wurden auf der Ersten Reichsgartenschau Dresden 1936 mit einer Goldenen Medaille ausgezeichnet.

Die Einführung der verschiedenen Abkürzungszeichen hat solchen Anklang gefunden, daß ich mich bemüht habe, das Verzeichnis nach dieser Richtung hin noch weiter auszubauen, was von meinen sehr geschätzten Kunden sicherlich wieder freudig begrüßt werden wird.

Mit dem Dank an alle diejenigen, die im Laufe des vergangenen Jahres die Gelegenheit wahrgenommen haben, meine Kulturen zu besichtigen oder meine Betriebsschau mit ihrem Besuche zu beehren, lade ich erneut zum Besuch meiner ausgedehnten Kulturen — 80 Hektar Sand-, Lehm- und Moorboden — ein. Bei beabsichtigtem Besuch an Sonn- oder Feiertagen erbitte ich vorherige Anmeldung. Weener (Ems) ist Schnellzugstation an der Eisenbahnhauptstrecke Bremen-Oldenburg-Leer-Neuschanz-Groningen-Amsterdam und ist von Bremen in 2½ Stunden bequem zu erreichen. Die von Süden durch Westfalen kommenden Reisenden haben in den großen Durchgangszügen Süddeutschland-Norddeich günstige Reisegelegenheit und treffen genannte Strecke in Leer (Ostfriesland), von wo Weener in 25 Minuten zu erreichen ist. Die Vielseitigkeit meiner Kulturen bietet das ganze Jahr über stets eine Fülle von Interessantem, so daß ein Besuch jederzeit lohnend ist.

Ich danke weiter für das mir immer von neuem bewiesene Vertrauen und werde bemüht bleiben, mir durch anerkannt mustergültige Belieferung die Zufriedenheit meiner sehr geschätzten Kundschaft auch in Zukunft zu erhalten.

Ich bitte daher, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen.

WEENER (Ems), im Herbst 1937

Herm. A. Hesse, Baumschulen
Weener

Obstwildlinge.

Ich bitte alle Interessenten, Wildlingsangebot mit genauen Stärken- und Preisangaben bei Bedarf einfordern zu wollen. Wüchsige Ware aus dem Freiland mit besterFaserbewurzelung.

Obstsortiment.

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstbäumen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Güteklassenbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand entspricht.

Bei Neupflanzung von Obstgütern wende man sich zwecks Sortenwahl an die örtlich zuständigen Bauernschaften, die heute sämtlich Normalsortimente der Obstarten aufgestellt haben von Sorten, die in den jeweiligen Gegenden sich in Wuchs und Ertrag als besonders anbauwürdig erwiesen haben.

Äpfel.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
Buschobst, verpflanzt,			
auf Doucin: 2—3jährig	2.25	20.—	180.—
» » 3—4jährig	2.50	22.50	200.—
» » 4—5jährig	3.—	27.—	—
auf Paradies: 2—3jährig	2.50	22.50	—
Spaliere auf Doucin,			
Palmetten mit zwei Etagen	3.50	—	—
» » drei »	4.50	—	—
U-Form, mehrjährig	4.—	—	—
Cordons (Schnurbäumchen)			
senkrechte, auf Doucin, 3—4jährig	2.50	22.50	200.—
» auf Paradies, 3—4jährig	3.—	27.—	—
waagerechte, zweiarmige, auf Doucin, 2–3jährig	3.—	—	—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, B = Busch, S = Spalier, U = Uform, C = Cordon

Wuchsform	Sortenname	Reifezeit
H M B — — C	Adersleber Kalvill	Nov.-März
H — B — — C	Baumanns Renette	Dez.-Febr.
H — — — — —	BiesterfelderRenette	Nov.-Jan.
H M — — — C	Bismarckapfel	Dez.-März
— — B — — C	Blenheimer Goldrenette	Dez.-Febr.
H M B — — —	Boikenapfel	Jan.-Mai
H M B — — —	Bramleys Sämling	Dez.-Febr.
H M B — — C	Charlamowsky	Aug.-Sept.
H M B — — —	Coulons Renette	Dez.-März
H M B S — C	Cox' Orangenrenette	Nov.-Jan.
H M B S — C	Croncels	Sept.-Okt.
H M B S — C	Danziger Kantapfel	Okt.-Nov.
H M B — — C	Fiessers Erstling	Okt.-Dez.
H M B — — —	Filippas Apfel	Nov.-Jan.
H M B — U C	Fromm's Goldrenette	Nov.-März
H — — — — —	Geheimr. Oldenburg	Okt.-Dez.
H — — — — —	Geheimrat Wesener	Dez.-April
— — — — — C	Gelber Bellefleur	Dez.-März
H M B S — C	Gelber Richard	Okt.-Jan.
— M B S — C	Goldparmäne	Nov.-Jan.
H M B S — C	Grahams Jubiläumsapfel	Nov.-Jan.
H M B — U C	Gravensteiner	Sept.-Dez.
H M B — — C	Groninger Krone	März-April
H M B — — C	Grossherzog Friedrich	Okt.-Dez.
H M — — — —	Hagedornapfel	Okt.-Nov.
H M B — — C	Harberts Renette	Nov.-Jan.
H M B — — C	Jakob Lebel	Okt.-Dez.
H — — — — —	James Grieve	Sept.-Okt.
— — B — — C	Kaiser Alexander	Sept.-Nov.
H — B — U C	Kanadarenette	Dez.-März
H M B S — C	Klarapfel	Juli-Aug.
— — B — — —	Königin Luise von Dänemark	Dez.-März
— — B — — C	Königlicher Kurzstiel	Dez.-April
H M B S — C	Landsberger Renette	Nov.-Dez.
— — B — U C	Lewenapfel	Sept.-Febr.
— — B — — C	Londoner Pepping	Dez.-April
H — — — — —	Lord Suffield	Aug.-Sept.
H M B — — C	Moringer Rosenapfel	Oktober
— — B S — C	Nathusius' Taubenapfel	Dez.-April
H M B — — C	Neuer Berner Rosenapfel	Nov.-Jan.
— — B — — —	Odenwälder	Winter
H M B S — C	Ontarioapfel	Jan.-Juni
H M — — — —	Osnabrücker Renette	Dez.-April
H M B S — C	OstfriesischerKalvill	Okt.-Jan.
H M — — — —	Parkers Pepping	Dez.-April
— — B — — C	Peasgoods Sondergleichen	Okt.-Dez.

Äpfel (Fortsetzung):

Wuchsform	Sortenname	Reifezeit	Wuchsform	Sortenname	Reifezeit
— — B — U —	Pfirsichroter Sommerapfel	Aug.-Sept.	H M B S — C	Schöner aus Boskoop	Nov.-Mai
— — B — U C	Ribstoner Pepping	Nov.-Jan.	H M — — — —	Schöner aus Nordhausen	Dez.-Mai
H M — — — —	Roter Eiserapfel	Jan.-Mai	— — B — — C	Signe Tillisch	Nov.-Jan.
— — B — — C	Roter Herbstkalvill	Okt.-Nov.	H M B — — —	Süsse Winterkrone	Dez.-März
H M — — — —	Rote Sternrenette	Nov.-März	— — B — — —	Weißer Astrachan	Aug.-Sept.
H M B S — C	Ruhm aus Winschoten	Aug.-Sept.	H M B S — C	Zuccalmaglios Renette	Dez.-März
— — B — — C	Schieblers Taubenapfel	Okt.-Febr.			

Ahlbeeren, siehe „Schwarze Johannisbeeren".

Apfelrosen, siehe Rosa pomifera und R. rugosa unter „Parkrosen".

Aprikosen, Marillen.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Büsche	2.50	22.50

B = Busch

Wuchsform	Sortenname	Wuchsform	Sortenname
B —	Ambrosia	B —	Nancyaprikose
B —	Grosse Frühe	B —	Re Umberto
B —	Luizet	B —	Ruhm aus Dürrgoy
B —	Moorpark		

Berberitzen, siehe Berberis vulgaris unter „Laubhölzer".

Birnen.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
Buschobst,			
verpflanzt, auf Quitte, 2—3jährig	2.50	22.50	—
» » » 3—4jährig	3.—	27.—	—
» » » 4—5jährig	3.50	30.—	—
» » **Wildling,** 3—4jährig	2.50	22.50	—
» » » 4—5jährig	3.—	—	—
Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte,			
senkrechte, 3—4jährige	2.50	22.50	200.—
waagerechte, einarmige, 2—3jährig	2.—	—	—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, B = Busch, C = Cordon

Wuchsform	Sortenname	Reifezeit	Wuchsform	Sortenname	Reifezeit
— — B C	Amanliser Butterbirne	September	H M — —	Holländische Zuckerbirne	Aug.-Sept.
— M B C	Beuckes Butterbirne	September	H M B —	Josephine aus Mecheln	Dez.-Febr.
— — B C	Blumenbachs Butterbirne	Okt.-Nov.	H M — —	Kongressbirne	Sept.-Okt.
H — — —	Boscs Flaschenbirne	Okt.-Nov.	H M B C	Köstliche aus Charneu	Okt.-Nov.
H M B C	Clapps Liebling	Aug.-Sept.	H M B C	Madame Verté	Dez.-Jan.
— — B C	Diels Butterbirne	Okt.-Dez.	H — — —	Napoleons Butterbirne	Okt.-Nov.
H M — —	Emder Kochbirne	Nov.-Jan.	H M B C	Neue Poiteau	Okt.-Nov.
H — — —	Esperens Bergamotte	Jan.-März	— — B C	Olivier de Serres	Dez.-März
H M B C	Esperens Herrenbirne	Sept.-Okt.	H M B C	Pastorenbirne	Dez.-Jan.
H M B C	Gellerts Butterbirne	Sept.-Okt.	— — B —	Pfirsichbirne	August
H — — —	General Totleben	Okt.-Nov.	— — B C	Sommer-Magdalene	Juli
H — — —	Goubaults Butterbirne	Sept.-Okt.	— — B —	Sparbirne	Juli-Aug.
H M B C	Gräfin von Paris	Nov.-Jan.	— M B C	Stuttgarter Geißhirtle	Aug.-Sept.
— M B —	Gute Charlotte	September	H M B C	Triumph aus Vienne	Aug. Sept.
H M — —	Gute Graue	September	H M B C	Vereinsdechantsbirne	Okt.-Nov.
H M B C	Gute Luise	Sept.-Okt.	H M B C	Williams' Christbirne	Aug.-Sept
H — — —	Herzogin Elsa	Sept.-Okt.			

Brombeeren.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Grossfrüchtige Sorten: Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher	—.50	4.50	40.—

Dorchester
Eldorado
Erie
Hansell
Hosacks Dornlose
Kittatinny
Laciniatus
Lawton
Lucretia
Minne Waski
Newmanns Dornlose
Philadelphia
Rathbun
Sandbrombeere (Theodor Reimers)
Snyder
Ward
Weiße Kristall
Wilsons Frühe

	1	10	100
Loganbeere (Brombeere×Himbeere) . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Rubus phoenicolasius, Japanische Weinbeere . . . »	1.—	8.—	70.—

Cornelkirschen, siehe Cornus mas unter „Laubhölzer".

Hagebutten, siehe unter „Parkrosen".

Haselnüsse.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Rotblättrige Zellernuss, starkwachsend, Blätter bis zum Herbst dunkelrot gefärbt; vollständig winterhart. Bester Ersatz für Corylus Avellana atropurpurea.			
Sträucher, 80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
bewurzelte Ableger (ab Januar lieferbar)	—	—	40.—
Corylus maxima atropurpurea, 2jährige verpflanzte Ableger	—	—	50.—
Grossfrüchtige in Sorten meiner Wahl:			
Sträucher, 80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
bewurzelte Ableger (ab Januar lieferbar)	—	—	30.—
2jährige verpflanzte Ableger	—	—	50.—
3jährige » » nur „Cosford"	—	—	55.—

Str. = Sträucher, Abl. = Ableger, f = frühblühend, m = mittelfrüh, s = spätblühend.

Wuchsform	Sortenname	Wuchsform	Sortenname
Str. Abl.	Badem Funduk (Mandelnuss) f	Str. Abl.	Jewes Sämling m
Str. Abl.	Barcelloner Eckige (Grosse) f	Str. Abl.	Kaiserin Eugenie m
Str. Abl.	Barrs Spanische Nuss f	Str. Abl.	Lambert Cols m
Str. Abl.	Barrs Zellernuss f	Str. Abl.	Landsberger Lange Nuss f—m
Str. —	Bergers Zellernuss m	Str. Abl.	Längliche Riesennuss m
Str. Abl.	Burchardts Zellernuss m	Str. Abl.	Lucas Zellernuss s
Str. Abl.	Cosford m	Str. Abl	Messmers Zellernuss m
Str. Abl.	Cosford Verbesserte m	Str. —	Mogulnuss s
Str. —	Daviana m	Str. Abl.	Nottingham m
Str. Abl.	Der Schah m	Str. Abl.	Princess Royal m
Str. Abl.	Einzeltragende Kegelförmige m	Str. —	Römische Zellernuss f
Str. Abl.	Englische Zellernuss f	Str. Abl.	Rotblättrige Lambertsnuss m—s
Str. Abl.	Fertile m	Str. Abl.	Rotblättrige Zellernuss f
Str. Abl.	Frühe Lange Zellernuss m	Str. —	Rudolphs Zellernuss m
Str. —	Garibaldi m	Str. Abl.	Spanische Nuss m
Str. Abl.	Gekräuselte Nuss (Frizzled) f—m	Str. Abl.	Trapezunter Kaiserhasel m
Str. —	Grosse Kugelnuss m	Str. —	Vollkugel f
Str. —	Grosse Lambertsnuss (Bandnuss) m	Str. Abl.	Von Mehl m
Str. Abl.	Gunslebener Zellernuss m	Str. Abl.	Webbs Preisnuss f
Str. Abl.	Gustavs Zellernuss m	Str. —	Weisse Lambertsnuss s
Str. Abl.	Hallesche Riesennuss s	Str. —	Wunder aus Bollweiler f
Str. Abl.	Heynicks Zellernuss m—s		

Heidelbeeren, siehe Vaccinium Myrtillus unter „Laubhölzer".

Himbeeren.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
In rot- und gelbfrüchtigen Sorten	—.20	1.80	15.—
„Deutschland". NEUHEIT!	—.40	3.50	30.—
„Lloyd George" und „Preussen"	—.25	2.—	18.—
Schwarzfrüchtige Sorte „Shaffers Colossal"	—.40	3.50	30.—

Deutschland, rot. **Neuheit!**
Fürst Anatol Gagarin, rot
Gelbe Antwerpener, gelb
Harzjuwel (Hornet), rot
Herrenhäuser Königshimbeere, rot
Lloyd George, rot
Magnum Bonum, gelb
Preussen, rot
Shaffers Colossal, schwarz
Immertragende vom Feldbrunnen, rot, zweimaltragend.

Johannisbeeren.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Holländische, rote.			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	—
» **wurzelecht,** 100 120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	100.—
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe	1.—	9.—	—
» **wurzelecht,** 80—100 cm Stammhöhe	1.—	9.—	80.—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.30	2.50	22.50
» mit 5—8 Trieben	—.40	3.30	30.—
» mit 8—12 Trieben	—.60	5.50	50.—
Rote, in Sorten			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.40	3.30	30.—
» mit 5—8 Trieben	—.60	5.50	50.—
2jährige Stecklinge, 40—60 cm hoch	—	—	12.—
„Heros". **NEUHEIT!** Reichtragend, frühreifend, langtraubig, grossbeerig, süss, Strauch gesund und kräftig wachsend.			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.80	16.—	—
Halbstämme, 40—60 cm Stammhöhe	1.20	11.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.80	7.—	60.—
» mit 5—8 Trieben	1.—	9.—	—
Weisse, in Sorten			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.40	3.30	30.—
» mit 5—8 Trieben	—.50	4.50	—
2jährige Stecklinge, 40—60 cm hoch	—	—	12.—
Schwarze, in Sorten (Ahlbeeren)			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.40	3.30	30.—
» mit 5—8 Trieben	—.50	4.50	40.—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, h = Halbstamm, B = Busch, St = Steckling

Wuchsform	Sortenname	Fruchtfarbe	Wuchsform	Sortenname	Fruchtfarbe
H — — B —	Bang up	schwarz	H — — B —	Lees Schwarze	schwarz
— — — B St	Bar le Duc	weiss	— — — B St	Loppersumer Gelbstiel	rot
H — — B —	Boskoop Giant	schwarz	H — — B —	Neapolitanische	schwarz
— — — B St	Caucasische	rot	H M — B —	Rote Holländische	rot
H — — B St	Fays Fruchtbare	rot	— — — B St	Rote Kirsch	rot
H — — B —	Goliath	schwarz	— — — B St	Rote Versailler	rot
— — — B St	Große Rote a. Boulogne	rot	H — — B —	Schwarze Traube	schwarz
H — h B —	Heros, Neuheit!	rot	H — — B St	Weisse Holländische	weiss

Junibeeren, siehe Amelanchier unter „Laubhölzer".

Kastanien, essbare — Maronen.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Castanea vesca			
Hochstämme, 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
» 10—12 cm Umfang	4.—	36.—	320.—
» 12—14 cm Umfang	5.—	45.—	—
Büsche, 60—80 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Grossfrüchtige Sorten			
Büsche, mehrjährige, ca. 150—180 cm hoch	2.20	20.—	—
Hochstämme, 18—20 cm Umfang	12.—	—	—
» 20—25 cm Umfang	15.—	—	—

H = Hochstamm, B = Busch

Wuchsform		Sortenname	Wuchsform		Sortenname
H	B	Château Dorade	—	B	Numbo
H	B	Doré de Lyon	H	B	Paragon
—	B	Noire Précoce	H	B	Précoce de Vannes
—	B	Nouzillard			

Kirschäpfel, siehe Malus baccata und Formen unter „Laubhölzer".

Kirschen.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Büsche, 2—3 jährige	1.60	15.—	—

Kirschen (Fortsetzung): H = Hochstamm, B = Busch

Wuchsform		Sortenname	Klasse und Farbe	Reifezeit
H	B	Badacsoner Riesenkirsche	schwarzbr. Knorpelkirsche	Anfang - Mitte August
H	—	Büttners Späte	rote Knorpelkirsche	Anfang - Mitte August
H	—	Coburger Maikirsche	dunkle Herzkirsche	zweite Reifewoche
H	—	Dönnissens Gelbe Knorpelkirsche	gelbe Knorpelkirsche	Ende Juli - Anf. August
H	—	Eltonkirsche	gelb und rote Herzkirsche	Anfang - Mitte Juli
H	—	Farnstädter Schwarze Knorpelkirsche	schwarze Knorpelkirsche	Juli - August
H	—	Flamentiner (Türkine)	gelbe Herzkirsche	Ende Mai - Anfang Juni
H	—	Fromms Herzkirsche	schwarze Herzkirsche	Mitte Juni - Anfang Juli
H	—	Frühe Französische	dunkle Herzkirsche	Ende der ersten Kirschwoche
H	—	Früheste der Mark	dunkle Knorpelkirsche	Ende Mai
H	B	Gottorper Riesenkirsche	rotgelbe Glaskirsche	erste Hälfte Juli
H	—	Grosse Germersdorfer	rotbraune Knorpelkirsche	Ende Juli - Anf. August
H	—	Große Prinzessinkirsche	helle Knorpelkirsche	vierte Reifewoche
H	—	Grosse Schwarze Knorpelkirsche	schwarze Knorpelkirsche	Anfang Juli
H	—	Hedelfinger Riesenkirsche	schwarzrote Knorpelkirsche	Anfang - Mitte Juni
H	—	Holländische Maikirsche	Glaskirsche	Ende Mai - Anfang Juni
H	B	Kassins Frühe	schwarzrote Herzkirsche	Mitte Juni
H	—	Königin Hortense	hellrote Knorpelkirsche	Anfang Juli
H	—	Kronprinz von Hannover	gelbrote Herzkirsche	Mitte Juni - Juli
H	B	Lamberts Beste	schwarze Herzkirsche	Ende Juli
H	—	Lucienkirsche	bunte, hellrote Herzkirsche	Ende Juli
H	—	Neue Königliche	grosse, dunkelrote	Ende Juli
H	—	Schneiders Späte	braunrote Knorpelkirsche	Ende Juli
H	—	Winklers Weisse Herzkirsche	rosa Herzkirsche	Ende Juni
H	B	Zeisberger Riesenkirsche	dunkelrote Herzkirsche	Anfang - Mitte August

Schattenmorellen.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	—	—
Halbstämme, 7—8 cm Umfang	2.25	20.—	—
Büsche, 1 jährig	1.20	11.—	—
Spaliere, Fächer	2.50	—	—

Loganbeere, siehe unter „Brombeeren".
Marillen, siehe unter „Aprikosen".
Maronen, siehe unter „Kastanien".
Maulbeeren, siehe Morus alba unter „Laubhölzer".
Mirabellen, siehe unter „Pflaumen".

Mispeln.

Büsche, 80—100 cm hoch . . . . . 1 St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—
in nachfolgenden Sorten: Grossfrüchtige, Holländische, Kernlose, Königliche, Nottingham.

Moosbeeren, siehe Oxycoccus macrocarpus unter „Laubhölzer".
Nektarinen, siehe unter „Pfirsiche".
Ölweiden, siehe Elaeagnus edulis unter „Laubhölzer".

Pfirsiche.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Büsche, 1 jährig, veredelt auf St. Julien	2.—	18.—
» 2 jährig, veredelt auf St. Julien	2.50	22.50
Spaliere, mehrjährige Fächer	4.—	—

B = Busch, S = Spalier

Wuchsform		Sortenname	Reifezeit	Wuchsform		Sortenname	Reifezeit
B	S	Alexanderpfirsich	Ende Juli - Anf. Aug.	B	—	Proskauer Pfirsich	August - September
B	—	Amsden	Juli - Anf. August	B	S	Rivers' Frühpfirsich	Juli - August
B	S	Cumberland	Juli — August	B	S	Triumphpfirsich	Juli - Anf. August
B	—	Eiserner Kanzler	August	B	—	Yorks Frühpfirsich	Mitte - Ende Aug.
B	S	Mayflower	Juli				

Pflaumen.

(Pflaumen, Mirabellen, Renekloden, Zwetschen)

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	2.20	20.—	180.—
Halbstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Büsche, 2—3 jährig	2.—	18.—	—
» 3—4 jährig	2.50	22.50	—
» 4—5 jährig	2.75	24.—	—

Pflaumen (Fortsetzung): H = Hochstamm, M = Mittelstamm, h = Halbstamm, B = Busch

Wuchsform	Sortenname	Reifezeit
	Pflaumen	
— M h —	Angelina Burdett	Anfang-Mitte September
H M h B	Anna Späth	Ende Sept.-Anfang Okt.
H M h B	Cochet Père	Ende August
H M h —	Emma Leppermann	Anf.-Mitte Aug.
H M h —	Esperens Goldpflaume	Ende August
H M h —	Frühe Fruchtbare (Fertile Précoce)	Anfang August
H — — B	Gelbe Eierpflaume	Anfang Sept.
H M h B	Königin Viktoria	Ende August
H M h —	Merryweather	Aug.-Sept.
H M h —	Rote Eierpflaume	Anfang Sept.
H — — —	Schöne aus Löwen	August
	Mirabellen	
— M h —	Flotows Mirabelle	Ende Juli
— M h —	Herrnhäuser Mirabelle	Mitte-Ende Aug
H M h —	Königin der Mirabellen	Mitte August
H M h —	Nancymirabelle	Mitte August
	Reneklоden	
H M h —	Boddaerts Reneklode	Mitte-Ende Aug.
H M — B	Graf Althans	Ende Aug.-Sept.
H M — B	Grosse Grüne Renekl.	September
H M — B	Kaiserliche Reneklode (Imperial)	August
H M — —	Noire	Juli-August
H M h —	Oullins	August
	Zwetschen	
H M h —	Borssumer Zwetsche	September
H — — —	Ersinger Frühzwetsche (Goldquelle)	Anfang Aug.
H — h —	Italienische Zwetsche	Anfang Aug.
H — — —	Lukas' Frühzwetsche	August

Preiselbeeren, siehe Vaccinium Vitis Idaea unter „Laubhölzer".

Quitten.

Büsche, 1jährig . . . . 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—
» 2jährig . . . . 1 Stück M. 2.25, 10 Stück M. 20.—

Bereczky, Birnquitte | Königliche, Birnquitte | Portugiesische, Birnquitte
Von Bourgeaut, Apfelquitte | Von Lescovaz, Hellfleischige Riesenquitte.

Reneklоden, siehe unter „Pflaumen".
Schattenmorellen, siehe unter „Kirschen".

Stachelbeeren.

In besten grossfrüchtigen Sorten meiner Wahl:	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	11.—	100.—
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe	1.—	9.—	80.—
Halbstämme, 60—80 cm Stammhöhe	—.80	7.—	60.—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.50	4.50	40.—
» mit 5—8 Trieben	—.60	5.50	50.—

H = Hochstamm, M = Mittelstamm, h = Halbstamm, B = Busch

Wuchsform	Sortenname	Fruchtfarbe
H M h —	Bloodhound	purpurrot
H M — —	Früheste aus Neuwied	grün
H M h B	Gelbe Triumphbeere (Triumphant)	hellgelb
— — — B	Golden Drop	gelb
H M h B	Green Walnut	dunkelgrün
H M — —	Grüne Flaschenbeere (Green Willow)	dunkelgrün
H M h B	Grüne Hansa	grün, weiss [geadert
H M h —	Grüne Riesenbeere (Angler)	hellgrün
H M h B	Hellgrüne Samtbeere (Smiling Beauty)	gelblichgrün
H M — B	Hönings Früheste	gelb
H M h B	Lady Delamere	gelblichgrün
— — — B	Langley Gage	silberweiss
H M — —	Maiherzog (May Duke)	dunkelrot
H M h —	Maurers Sämling	schwarzrot
H M h B	Nailer	weisslichgrün
— — h B	Overall	hellbraunrot
H — — B	Pilot	hellgelbgrün
— M — —	Profit	hellgrün
— — — B	Rifleman	hellrot
H M h B	Rote Triumphbeere (Whinhams Industry)	dunkelrot
— M — —	Stockwell	dunkelgrün
H M — —	Viktoria	blassrosa
H M h B	Weisse Triumphbeere (White Smith)	gelblichweiss
— — — B	Wellingtons Glory	grünlichweiss

Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulce),	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Hochstämme, Stammhöhe ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—
» Stammhöhe ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50

Walnüsse.

Juglans regia,		
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	5.—	—
» 8—10 cm Umfang	7.—	—

Weinbeeren, japanische, siehe unter „Brombeeren".
Weinreben führe ich nicht der Reblauskonvention wegen.
Zwetschen, siehe unter „Pflaumen".

Rosen

Edelrosen

Von jeher ist die Liebe zur Rose, der Königin der Blumen, allseits gross gewesen, und zahlreiche Züchter des In- und Auslandes sehen es als ihre Lebensaufgabe an, die Rosen züchterisch immer mehr zu vervollkommnen, um sie zu immer verlässlicheren Freudespendern für die Menschheit zu machen. Gross ist alljährlich die Zahl der als Neuheiten angepriesenen Zuchtergebnisse, und es ist von vornherein klar, dass es unmöglich ist, alle Rosensorten im Sortimente zu kultivieren. So habe ich mich bemüht, durch jahrelange Auslese aus dem gewaltigen Heer der Rosen, ein Sortiment zusammenzustellen, das den gesteigerten Wünschen der Rosenliebhaber durchaus gerecht werden kann. Nicht alles Neue ist gut und erweist sich als unentbehrlich, sondern nur einige wenige werden alljährlich für würdig befunden, in das Sortiment aufgenommen zu werden, während wieder Rosen darin enthalten sind, die sich schon verhältnismässig lange als unentbehrlich und unübertroffen im Sortimente gehalten haben. Züchter und Zuchtjahr sind überall mit angegeben, worin der aufmerksame Leser schon ein gewisses Werturteil der einzelnen Sorte erblicken wird. Die Klassenzugehörigkeit ist ebenfalls bei allen Sorten mit verzeichnet und bedeutet: *B* = Bourbonrose, *M* = Monatsrose, *N* = Noisetterose, *R* = Remontantrose, *T* = Teerose, *TH* = Teehybridrose, worunter ich auch die Pernetiana-Klasse bereits eingereiht habe, da eine scharfe Abgrenzung dieser Prachtklasse heute kaum mehr möglich ist.

Hochstämme auf Sämlingsstämmen

In Sorten meiner Wahl, mit starken Kronen, I. Güteklasse

Stammhöhe ca. 100—140 cm, 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—
Stammhöhe ca. 75—100 cm, 1 Stück M. 1.75, 10 Stück M. 16.—
Stammhöhe ca. 50—75 cm, 1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.—

Trauerrosen, siehe unter „Schlingrosen".

Niedrige Busch-Edelrosen

I. Güteklasse 1 Stück M. —.40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 28.—
Mittelware 1 Stück M. —.30, 10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 21.—

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Alexander Hill Gray** (*A. Dickson & Sons 1911*) . . . . Gelbweiss wie „Kaiserin", gross, gefüllt, sehr wüchsig und gesund.	*T*
—	n	**Amulett** (*Math. Tantau 1930*) . . . . Leuchtend dunkelrot, gut gefüllt, wüchsig, reichblühend.	*TH*
—	n	**Arabella** (*Schilling-Tantau 1918*) . . . . Karminrosa, gefüllt, gross, starkwüchsig, reichblühend.	*TH*
—	n	**August Noack** (*W. Kordes' Söhne 1928*) „Columbia"-Sport . . . . Scharlachrot, gross, voll gefüllt, gut haltbare Farbe. Duft!	*TH*
H	n	**Betty Uprichard** (*A. Dickson & Sons 1922*) . . . . Lachsrosa, innen orangerosa, kräftig und langgestielt, Laub gesund.	*TH*
—	n	**Briarcliff** (*Briarcliff Nurseries 1926*) ⚘ . . . . Kräftig lachsrosa, innen gelblichorangerosa, gut öffnend, kräftig gestielt.	*TH*
—	n	**Captain Christy** (*Lacharme 1873*) ⚘ . . . . Hellrosa, sehr gross, gesund belaubt, reichblühend. Frühe Treibrose.	*R*
—	n	**Captain F. S. Harvey-Cant** (*Frank Cant & Co. 1923*) . . . . Salmfarbig mit Gelb, sehr gross, edel, lang gestielt, kräftiger Wuchs.	*TH*
H	n	**Cathrine Kordes** (*W. Kordes' Söhne 1930*) . . . . Leuchtend rubinrot, samtartig blutrot schattiert, nicht blauend.	*TH*
H	n	**Charles P. Kilham** (*G. Beckwith & Son 1926*) ⚘ . . . . Glänzend orangerot, leuchtend scharlach überhaucht, starkwüchsig.	*TH*
—	n	**Château de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher 1908*) . . . . Dunkel schwärzlichrot, nie verbrennend, Wuchs stark, Laub gesund.	*TH*
—	n	**Comtesse Vandal** (*M. Leenders & Co. 1932*) . . . . Aussen kupferrot bis kupferrosa, innen bräunlichgelb, edel, gross, Duft!	*TH*
H	n	**Dame Edith Helen** (*A. Dickson & Sons 1926*) . . . . Rein leuchtendrosa, sehr gross, gut gefüllt, wüchsig, Duft!	*TH*
H	n	**Dernburg** (*Dr. Krüger 1916/17*) . . . . Kräftig karminrosa, innen weiss, gross, gut gefüllt, guter Herbstblüher.	*TH*
—	n	**Edel** (*Sam Mc Gredy & Son 1919/20*) . . . . Reinweiss, langgestielt, gut aufblühend, gross, Duft!	*TH*
—	n	**E. G. Hill** (*E. G. Hill & Co. 1929*) ⚘ . . . . Weinrot, nie verblauend, kräftig gestielt, starkwüchsige Gartenrose.	*TH*
H	n	**Etoile de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*) ⚘ . . . . Dunkel- bis blutrot, gross, edel, nie verblauend, gesund und wüchsig.	*TH*
—	n	**Eugen Fürst** (*Soupert & Notting 1875*) . . . . Samtartig karmesinrot, langstielig, gut gefüllt, Duft!	*R*

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Fisher and Holmes** (*Verdier 1865*) Weltrose Leucht. scharlachrot, starkwüchsig, reichblüh. Massen-Schnitt- u. Treibsorte.	*R*
—		**Florex** (*William A. Geiger 1927*) Weltrose Korallen-salmrosa mit Orange-Karmin, lange Knospe, kräftig gestielt.	*TH*
—	n	**Fontanelle** (*E. G. Hill 1927*) Goldgelb, innen orange, sehr gross, vollgefüllt, sicher aufblüh., Dauerblüher.	*TH*
—	n	**Frank W. Dunlop** (*John H. Dunlop 1919*) Kräftig rosenrot, ideale Form, Verbesserung der „Charles Russel".	*TH*
H	n	**Frau Karl Druschki** (*P. Lambert 1901*) „Schneekönigin" Blendend reinweiss, edel, gross, wüchsig, willig blühend, Knospe leicht rosa.	*R*
H	n	**Freiburg II** (*Dr. Krüger 1917*) Weisslichrosa, aussen pfirsichrosa, wüchsig, guter Herbstblüher.	*TH*
—	n	**Gartendirektor Nose** (*W. Kordes' Söhne 1930*) Rein blutrot ohne Nebenton, sicher aufblühend, haltbar.	*TH*
—	n	**General Jacqueminot** (*Roussel 1852*) Blendend feurigrot, starkwachsend, gut remontierend.	*R*
H	n	**General Mac Arthur** (*E. G. Hill 1905*) (Weltrose) Leuchtend blutrot, Knospe spitz, gesund belaubt, dankbar blühend.	*TH*
—	n	**General-Superior Arnold Janssen** (*Leenders 1912*) Karmin-orangerot bis rosa, buschig, kräftig, gesund, williger Blüher.	*TH*
—	n	**George Dickson** (*A. Dickson & Sons 1913*) Dunkelblutrot mit Schwarz, sehr stark, Laub schön, Blume sehr gross.	*R*
—	n	**Gloire de Dijon** (*Jacotot 1853*) Goldgelb, kupfrigrosa schattiert, hart, reichblühend.	*T*
—	n	**Gloire de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*) Rot, schwärzlich schattiert, sehr gute Form, gut gefüllt, haltbar, gut öffnend.	*TH*
—	n	**Golden Dawn** (*Grant 1929*) Rein sonnenblumengelb, gross, vollgefüllt, Duft!	*TH*
H	n	**Golden Ophelia** (*B. R. Cant & Sons 1918*) Weltrose Rein goldgelb, edle Becherform, lang gestielt, kräftig, dankbar blühend.	*TH*
H	n	**Gruss an Teplitz** (*Geschwind 1889*), Weltrose, Bengalhybride Feurig scharlachzinnoberrot, in Büscheln, rötl. bel., Gruppenrose, Duft!	*TH*
—	n	**Hadley-Rose** (*E. G. Hill 1914*) Dunkelblutrot, schwärzlich schattiert, Wuchs kräftig, Laub gesund.	*TH*
H		**Heinrich Wendland** (*W. Kordes' Söhne 1930*) Rein leuchtend goldgelb, innen kapuzinerbraunrot.	*TH*
H	n	**Hermann Eggers** (*W. Kordes' Söhne 1930*) Einheitlich leuchtendrot, nie verblassend, dicht gefüllt, haltbar.	*TH*
H	n	**Hermann Lindecke** (*H. Lindecke 1929*) Weisslich lachsrosa, an „La France" erinnernd, gross, reichblühend, hart.	*TH*
—	n	**Hermann Neuhoff** (*Herm. Neuhoff-W. Kordes' Söhne 1923*) Samtartig schwärzlich, dunkelrot schattiert, Laub rötlich, gesund, hart.	*TH*
—	n	**Hermosa** (*Marchesau 1840*) Leuchtendrosa, überaus reichblühend das ganze Jahr über, sehr haltbar.	*M*
—	n	**Hugh Dickson** (*H. Dickson 1905*) Weltrose Leuchtend feurigrot, gross, gefüllt, lang gestielt, starkwüchsig, gesund.	*R*
—	n	**J. C. Thornton** (*Bees' Ltd. 1926*) Feurig leuchtend scharlach, gut gefüllt, haltbar, willig blühend, gesund.	*TH*
—	n	**Joanna Hill** (*E. G. Hill & Co. 1928*) Gelb, lang und fest gestielt. Laub, Wuchs, Blühwilligkeit sehr gut. Treibrose.	*TH*
—	n	**Johanniszauber** (*M. Tantau 1926*) Dunkelblutrot, nie verblauend, gut gefüllt, reichblühende Beetrose.	*TH*
—	n	**Jonkheer I. L. Mook** (*Leenders & Co. 1909*) Karminrosa, innen weiss, starkwüchsig, gesund, reichblühend.	*TH*
H	n	**Julien Potin** (*Pernet-Ducher 1927*) Zitronengelb, edel, langknospig, gross, Laub glänzend grün, gesund.	*TH*
H	n	**Kaiserin Auguste Viktoria** (*P. Lambert 1891*) Weltrose Rahmweiss, gross, schön gebaut, wüchsig, gesund belaubt. Teeduft!	*TH*
—	n	**Königin Luise** (*L. Weigand 1927*) Weiss, sehr gross, haltbar, starkwüchsig, reichblühend, sehr gut gefüllt.	*TH*
—	n	**Lady Florence Stronge** (*Sam Mc Gredy & Son 1925*) Krebsrot bis violettrosa, starker kräftiger Wuchs, für alle Zwecke.	*TH*
—	n	**Lady Hillingdon** (*Lowe & Shawyer 1910*) Dunkelorangegelb, gross, gut gefüllt, haltbar, kräftig, gesund.	*T*
—	n	**La France** (*Guillot 1867*) Weltrose Silbrigrosa mit Fleischfarben, gross, gut gefüllt, haltbar, kräftig, reichblühend.	*TH*

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
H	n	**Laurent Carle** *(Pernet-Ducher 1907)* Weltrose Glänzend scharlachkarmin, sehr gross, gute Form, gesund, Duft!	*TH*
—	n	**Leuchtfeuer** *(H. Kiese 1909)* Leuchtend blutrot, gross, gefüllt, reichblühend, Duft!	*M*
—	n	**Lieutenant Chauré** *(Pernet-Ducher 1910)* Dunkelblutrot, nicht blauend, gross, gut gefüllt, gesund belaubt.	*TH*
—	n	**Lilly Jung** *(Leenders & Co. 1925)* Tief goldgelb, gross, gefüllt, reichblüh., gut gestielt, Laub glänzendgrün, Duft!	*TH*
H	n	**Louise Catherine Breslau** *(Pernet-Ducher 1912)* Rein kupfrigrotgelb, sehr gross, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, reichblühend.	*TH*
H	n	**Luna** *(D. T. Poulsen 1925)* Reingelb, gross, straff gestielt, starkwachsend, gesundes Laub, Duft!	*TH*
—	n	**Mad. Bérard** *(Levet 1871/72)* Gemsledergelb mit Lachs, gross, gut gebaut, schön belaubt.	*T*
H	n	**Mad. Butterfly** *(E. G. Hill & Co. 1918)* Kräftigrosa, aprikosenrot und goldgelb getönt, reichblühend.	*TH*
H	n	**Mad. Caroline Testout** *(Pernet-Ducher 1890)* Fleischfarbigrosa, Mitte feuriger, kräftig gestielt, zuverlässig aufblühend.	*TH*
—	n	**Mad. Edouard Herriot** *(Pernet-Ducher 1914)* Kupfer- oder tangorot, kräftig, gesund, sehr frosthart.	*TH*
H	n	**Mad. G. Forest Colcombet** *(Mallerin 1928)* Dunkelkarmin mit Scharlach, Knospe spitz, Laub gesund, reichblühend.	*TH*
—	n	**Mad. Henry Queuille** *(Pernet-Ducher, Gaujard 1928)* Krabbenrot, Mitte kupfrig, Rücken goldig, Duft!	*TH*
H	n	**Mad. Jules Bouché** *(Croibier 1910)* Reinweiss, Grund kupfriggelb, reichblühend, gross, sehr haltbar.	*TH*
—	n	**Mad. Jules Grolez** *(Guillot 1887)* Lebhaft chinesischrosa bis leuchtend kirschrot, Laub rot.	*TH*
H	n	**Mad. Léon Pain** *(Guillot 1904)* Karmin- bis hellrosa, im Grunde goldbraun, reichblühend.	*TH*
H	n	**Mad. Ravary** *(Pernet-Ducher 1900)* Orangegelb, reichblühend, mittelgross, gesund.	*TH*
—	n	**Mad. Victor Verdier** *(E. Verdier 1863)* Kirschrosarot, recht gross, gut aufblühend.	*R*
H	n	**Mälar Ros** *(W. Kordes' Söhne 1932)* Weinrot, gross, langgestielt, kräftig, gesund, Duft!	*TH*
—	n	**Maman Cochet** *(Sc. Cochet 1892)* Fleischfarbigrosa mit Karmin und Lachs, sehr gross, von edlem Bau.	*T*
—	n	**Marcia Stanhope** *(G. Lilley 1922)* Reinweiss, gross, edel, sehr haltbar, buschig, Duft!	*TH*
H	n	**Maréchal Niel** *(Pradel 1864)* Leuchtend schwefelgelb, oft kupfern, edel, Laub hellgrün, Teeduft!	*T*
—	n	**Margaret Mc Gredy** *(Sam Mc Gredy & Son 1927)* Geranium-lachsrot, nicht verbleichend, edel, Wuchs kräftig, hart.	*TH*
—	n	**Marie Baumann** *(Baumann 1864)* Dunkelrot, gross, haltbar, willig aufblühend, reichblühend, gesund.	*R*
—	n	**Marie van Houtte** *(Ducher 1872)* Gelblichweiss, Rand rosa, gross, edel, gut gefüllt, Treibrose.	*T*
H	n	**Max Krause** *(M. Krause 1930)* Rötlich orangegelb in Goldgelb übergehend, gross, gut gefüllt, Knospe spitz.	*TH*
H	n	**Mevrouw G. A. van Rossem** *(G. A. van Rossem 1926)* Aprikosenrot auf Gelb, gross, gut gestielt, gut öffnend, Laub gross.	*TH*
—	n	**Miss C. E. van Rossem** *(H. A. Verschuren 1919)* Schwärzlichrot, reichblühend, Laub krankheitsfrei, Gruppenrose, Duft!	*TH*
—	n	**Miss Willmott** *(Sam Mc Gredy & Son 1907)* Perlmutterweiss, Grund gelb, gross, Laub dunkelgrün, gross, kräftig.	*TH*
—	n	**Mrs. Charles Lamplough** *(Sam Mc Gredy & Son 1920)* Milchweiss, gross, edel, wüchsig, auf langen, kräftigen Stielen.	*TH*
H	n	**Mrs. Charles Russel** *(Waban Rose Conservatories 1913)* Kräftig karminrosarot, sehr farbbeständig, sehr gut gefüllt, gesund.	*TH*
—	n	**Mrs. Henry Bowles** *(Chaplin Brothers 1921)* Rein korallenrosa, sehr reichblühend, wertvolle Gartenrose.	*TH*
—	n	**Mrs. Henry Morse** *(Sam Mc Gredy & Son 1919)* Rosa, zinnoberrot schattiert, Grund kupfriggelb, gute Haltung.	*TH*
H	n	**Mrs. Henry Winnet** *(Dunlop 1919)* Herbst-Schnittrose. Leuchtend scharlachrot, gut gefüllt, nie verblauend, gesund, Duft!	*TH*

Rosen

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Mrs. John Laing** *(Bennet 1887)* . . . . Hellrosarot, gross, edel, starkwachsend, reichblühend.	*R*
H	n	**Mrs. Pierre S. du Pont** *(Mallerin 1929)* . . . . Reingelb ohne Nebenton, gross, edel, gut gefüllt, kräftig gestielt.	*TH*
H	n	**Mrs. Sam Mc Gredy** *(Mc Gredy 1929)* . . . . Scharlachkupfrig-orange, gut gefüllt, edel, fest gestielt, gesund.	*TH*
H	n	**Mrs. William C. Egan** *(Howard & Smith 1922)* . . . . Silbrigrosa, aussen dunkler, gross, gefüllt, gesundes Laub.	*TH*
—	n	**Nigrette** *(M. Krause 1933)* . . . . Samtartig schwarzrot, schwärzeste aller Rosen, reichblühend.	*TH*
H	n	**Ophelia** *(Paul & Son 1912)* . . . . Zart fleischweiss, oft goldgelb und rot angehaucht, wüchsig, gesund.	*TH*
—	n	**Paul Neyron** *(Levet 1869)* . . . . Rein rosenrot, sehr gross, gut gefüllt, gut öffnend, Laub gesund.	*R*
—	n	**Phoebe** *(B. R. Cant & Son 1922)* . . . . Rahmweiss, innen gelblich, sehr gut gefüllt, kräftig, reichblühend.	*TH*
—	n	**Pink Pearl** *(Leenders 1924)* . . . . Lebhaft rosa mit Hellrot, im Grunde gelblich-lachsfarben, Duft!	*TH*
H	n	**Pius XI.** *(M. Leenders & Co. 1925)* . . . . Rahmgelb in Weiss übergehend, haltbar, gut gestielt, reichblühend.	*TH*
H	n	**Président Herbert Hoover** *(Coddington 1930)* . . . . Goldgelb mit feurigroten Schattierungen, gross, gut gefüllt, haltbar.	*TH*
—	n	**Preussen** *(Löbner-W. Cordes' Söhne 1920)* . . . . Rein dunkelrot, edel, gross, gut gefüllt, gesundes Laub, Duft!	*TH*
—	n	**Prince Camille de Rohan** *(E. Verdier 1861)* . . . . Samtartig schwarzrot, gut gefüllt, reichblühend.	*R*
H	n	**Rapture** *(Traendly & Schenk 1927)* Sport von „Butterfly" . . . . Aprikosenfarbig, gut gefüllt, nicht verblassend, Duft!	*TH*
—	n	**Red Star** *(H. A. Verschuren & Sons 1919)* . . . . Auffallend leuchtend feuerrot, starkwüchsig, blühwillig.	*TH*
—	n	**Reine Marie Henriette** *(Levet 1879)* . . . . Herrlich kirschrot, gross, wüchsig, früh- und reichblühend.	*T*
H	n	**Reverend F. Page Roberts** *(B. R. Cant 1921)* . . . . Reingoldgelb, aussen kupfrig, gross, reichblühend, gesund.	*TH*
H	n	**Roselandia** *(Stuart Low & Co. 1924)* . . . . Goldgelb, gross, festgestielt, sehr blühwillig, Duft!	*TH*
H	n	**Roslyn** *(Towill 1929)* . . . . Rein sonnengelb, kräftig gestielt, vorzüglich gefüllt, gesund.	*TH*
		Schneekönigin, siehe „Frau Karl Druschki".	
—	n	**Souvenir de Claudius Pernet** *(Pernet-Ducher 1921)* . . . . Leuchtend »Rayon d'or«-gelb, lang gestielt, gesund, guter Herbstblüher.	*TH*
H	n	**Souvenir de Georges Pernet** *(Pernet-Ducher 1921)* . . . . Türkischrot, gross, kräftig, reichblühend, gesund.	*TH*
—	n	**Souvenir de H. A. Verschuren** *(H. A. Verschuren & Sons 1922)* . . . . . Goldgelb, orange getönt, gross, auf langen, starken Stielen.	*TH*
—	n	**Souvenir de la Malmaison** *(Beluze 1844)* . . . . Blass fleischfarbig, rötlich umsäumt, gross, Duft!	*B*
H	n	**Talisman** *(The Montgomery Co. 1929)* Farbenrose . . . . Scharlach, rosa, kupfrig und goldgelb, starkwüchsig, Laub gesund, Duft!	*TH*
—	n	**Ulrich Brunner fils** *(Levet 1882)* . . . . Kirschrote Treibrose, gut gefüllt und gut aufblühend, gesund.	*R*
—	n	**Van Houtte** *(Lacharme 1864)* . . . . Amarant-feuerrot, dunkel schattiert, dicht gefüllt.	*R*
H	n	**Vierlanden** *(W. Kordes' Söhne 1932)* . . . . Orangerosa, gut gefüllt, lang gestielt, starkwüchsig, wenig bestachelt.	*TH*
H	n	**Ville de Paris** *(Pernet-Ducher 1925)* . . . . Goldgelb, leicht orange schattiert, spitz, gross, gesund, Duft!	*TH*
—	n	**W. E. Chaplin** *(Chaplin Brothers 1929)* . . . . Rein leuchtendrot, gross, vollgefüllt, nie verblauend, starkwüchsig.	*TH*
H	n	**Westfield Star** *(Morse & Son 1920)* . . . . Atlasweiss bis leicht schwefelgelb, gross, haltbar.	*TH*
H	n	**Wilhelm Kordes** *(W. Kordes' Söhne 1922)* . . . . Kapuzinerbraunrot auf Goldgelb, gut gefüllt, hochedel, gut gestielt.	*TH*
—	n	**William Allen Richardson** *(Vve Ducher 1879)* . . . . Orange bis gelb, gross, spitzknospig, starkwüchsig, reichblühend.	*N*

Neuere Edelrosen der letzten Jahre

Hochstämme, untenstehender Sorten, 100—140 cm Stammhöhe, 1 Stück M. 2.50

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
H	n	**Annie Jebens** *(W. Kordes' Söhne 1932)* . . . . Aussen goldgelb, innen blutrot mit Kapuzinerbraun, gross, vorzüglich gefüllt, Laub glänzend, gesund, Duft!	*TH*	—.60	5.50
H	n	**Barcelona** *(W. Kordes' Söhne 1932)* . . . . Aussen karminrot, innen sammetartig dunkelrot mit Schwarz, gross, haltbar, kräftig gestielt, Wuchs ausgezeichnet, gesund.	*TH*	—.60	5.50
—		**Better Times** *(Jos. H. Hill 1934)* . . . . Dunkelblutrot, gefüllt, haltbar, länglich, spitz. Treibrose.	*TH*	—.80	7.—
—	n	**Crimson Glory** *(W. Kordes' Söhne 1935)* . . . . Karmesinrot, sammetartig dunkel schattiert, nie verbrennend oder verblauend, starkwüchsig, reichblühend, voll gefüllt, sehr gross, krankheitsfrei, Duft!	*TH*	1.—	9.—
—	n	**Edith Krause** *(Max Krause 1930)* . . . . Resedaweiss, gross, gut gefüllt, edel, Knospe lang, kräftig gestielt, sehr haltbar.	*TH*	—.60	5.50
H		**Eduard Schill** *(W. Kordes' Söhne 1931)* . . . . Einheitlich ziegelbraunrot, sehr gross, vorzüglich gefüllt, Laub gross, dunkelgrün, gesund.	*TH*	—.60	5.50
—	n	**Effekt** *(M. Krause 1935)* . . . . Goldgelb aussen, innen karminlachsrot, Knospe goldorangegelb, rötlich berandet, Wuchs buschig, williger Blüher. Gruppenrose.	*TH*	1.—	9.—
—	n	**Elli Knab** *(W. Kordes' Söhne 1934)* . . . . Aussen kräftigrosa, innen rosigweiss, gross, gut gefüllt, haltbar, lang gestielt, starkwüchsig, blühwillig, gesund, Duft!	*TH*	—.80	7.—
H	n	**Geheimrat Duisberg** *(W. Kordes' Söhne 1933)* . . . . Reingelb, nicht verbrennend, gross, hochedel, haltbar, Laub glänzend, gesund.	*TH*	—.60	5.50
H	n	**Goldenes Mainz** *(W. Kordes' Söhne 1933)* . . . . Leuchtend reingelb, reichblühend, langgestielt, bis zum vollkommenen Verblühen von unübertroff. Leuchtkraft, Beetrose.	*TH*	—.80	7.—
—	n	**Hede** *(M. Tantau 1934)* . . . . Rein sonnengelb, gross, gut gefüllt, straff gestielt, haltbar.	*TH*	—.80	7.—
H	n	**Heros** *(M. Tantau 1933)* . . . . Rot, sehr beständige Farbe, Knospe spitz, grossblumig, gut gefüllt, Laub dunkelgrün, gesund, Duft!	*TH*	—.80	7.—
—	n	**Hinrich Gaede** *(W. Kordes' Söhne 1931)* . . . . Bräunlich orangegelb, gross, gut gefüllt, Laub dunkelgrün, gesund, Duft!	*TH*	—.60	5.50
—	n	**Kardinal** *(M. Krause 1934)* . . . . Feurig scharlachrot, Knospe schwärzlichrot, edel, becherförmig, kräftig gestielt, buschig, Laub gesund.	*TH*	—.80	7.—
—	n	**Kathrine Pechtold** *(Verschur.-Pechtold 1934)* . . . . Kupfrig-orange mit Goldgelb und Rosa schattiert, enorm gross, voll gefüllt, reichblühende Gartenrose, Duft!	*TH*	1.—	9.—
—	n	**Luise Krause** *(M. Krause 1930)* . . . . Rötlichorange, Spitzen der Petalen in Hellgelb übergehend, gross, stark gefüllt, straff gestielt, Knospe spitz, Laub gesund.	*TH*	—.60	5.50
—		**Mary Hart** *(Jackson & Perkins 1933)* . . . . Samtartig blutrot, nie verblauend, reichblühend.	*TH*	—.60	5.50
—	n	**Rote Rapture** *(Johs. Weber 1934)* . . . . Hell kirschrot, reichblühend, kräftig gestielt, Laub dunkel, sonst wie „Rapture".	*TH*	—.70	6.—
—		**Sterling** *(E. G. Hill 1933)* . . . . Hellrot in Rosa übergehend im Grunde, ideale Form, vorzüglich gef., buschig, gesund, Treib-, Schnitt- u. Gartenrose, Duft!	*TH*	—.80	7.—
—	n	**Viktoria Adelheid** *(W. Kordes' Söhne 1932)* . . . . Goldgelb mit feurig Braunrot, sehr gross, reichblühend.	*TH*	—.60	5.50

Polyantha-Rosen / Vielblumige Zwergrosen

Diese Rosenklasse findet vorzüglich Verwendung bei Bepflanzung schmaler Beetstreifen, zumal in Verbindung mit irgendwelcher Architektur wie Denkmäler, Wasserbecken, Terrassen und dergleichen. Überall da, wo es darauf ankommt, einheitliche Farbenwirkung zu erzielen, ist Massenverwendung von Polyantharosen am Platze. Erstaunliche Blütenfülle, beachtenswerte Blütendauer, einheitlicher, mässig hoher Wuchs, verlässliche Winterhärte und sonstige Anspruchslosigkeit sind Eigenschaften, die die Polyantharosen zu unentbehrlichem Werkstoff für den Gartengestalter gemacht haben. Hochstämmig veredelt bilden Polyantharosen ganz wundervolle Kronen und wirken bei ihrer Blütenfülle als Blütenkugeln ganz vortrefflich. Als Schnittblumen für Raumschmuck bilden Polyantha-Rosen vielbegehrten Werkstoff.

Niedrige, I. Güteklasse, 1 Stück M. —.40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—

Ännchen Müller *(J. C. Schmidt 1907)*
Leuchtend korallenrosa, mässig gefüllt, reichblühend in grossen Dolden. 40—50 cm.

Dr. Kater *(Dir. Struve 1925)* Sport von „Orléansrose"
Tiefsamtig dunkelrot, starkwüchsig, reichblühend, in grossen Dolden.

D. T. Poulsen *(D. T. Poulsen 1930)*
Reinleuchtend blutrot, in Dolden, reichblühend, gesund.

Eblouissant *(Turbat & Cie. 1918)*
Feurig karminrot, dunkler schattiert, gleichmässig gedrungen, dankbarer Blüher.

Ellen Poulsen *(D. T. Poulsen 1911)*
Kirschrot, gefüllt, doldig, breitbuschig, gesund belaubt, reichblühend.

Else Poulsen *(D. T. Poulsen 1924)*
Zartrosa, schalenförmig, halbgefüllt, sehr gross, lange haltbar, für Beet und Schnitt, bis 80 cm.

Eva Teschendorff *(Teschendorff 1923)* Sport von „Echo". Auch als Topfrose wertvoll.
Reinweiss, in grossen Dolden, kräftig wachsend.

Frau Dr. Erreth *(Geduldig 1916)* Polyantha-Hybride
Dunkelgelbe „Gruss an Aachen", gross bis zu dreien, gut gefüllt, Edelrosen-ähnlich.

Frau Rudolf Schmidt *(R. Schmidt 1919)* Sport von „Jessy"
Feurig blutrot, gefüllt, in lockeren Sträussen, gedrungen, reichblühend.

Freudenfeuer *(Kiese & Co. 1917)* Sport von „Orléansrose"
Leuchtend kirschrosa, nie verblassend, grossdoldig, reichblühend, gefüllt.

Gloria Mundi *(G. de Ruiter 1929)*
Feurigorange ohne Nebenton, gefüllt, reichblühend, guter Wuchs, gesund, auffallend.

Gruss an Aachen *(Geduldig 1909)* Polyantha-Hybr.
Weiss bis gelblich, zuweilen leichtrosa, sehr gross, unaufhörlich blühend, gefüllt.

Ideal *(Jean Speck 1921)*
Schwärzlichblutrot, grossdoldig, Ramblertyp, auch wertvolle Topfrose.

J. F. Müller *(J. F. Müller 1928)* Sport von „Rödhätte"
Feurig blutrot, gross, in mächtigen Dolden, gesund belaubt, Dauerblüher, sehr leuchtend.

Johanna Tantau *(M. Tantau 1928)* Zwergwichuraiana-Hybride mit Polyanthacharakter
Frischrosa mit gelblichweisser Mitte, gut gefüllt, in grossen Büscheln, Laub glänzend.

Joseph Guy *(Nonin 1921)*
Leuchtendrot, ähnlich „Rödhätte", besser gefüllt, grössere Dolden, gleichmässiger im Wuchs.

Katharina Zeimet *(P. Lambert 1899)*
Reinweiss, gefüllt, in Dolden, wüchsig, gesund, reichblühend, Duft!

Kirsten Poulsen *(D. T. Poulsen 1924)*
Leuchtend scharlachrot, einfach, schalenförmig, in grossen Dolden, Dauerblüher, bis 80 cm.

Lady Reading *(C. van Kleef & Co. 1921)* Sport von „Ellen Poulsen" (= „Rudolf Kluis")
Leuchtendrot, dichtbuschig, gefüllt, gesund, reichblühend.

Louise Walter *(Walter 1909)*
Porzellanweiss, rosa geadert, dankbarer Blüher, für Gruppen und Töpfe.

Merveille des Rouges *(Dubreuil 1910)*
Blendend samtig karminrot, reichblühend, sehr gedrungen, zu Einfassungen.

Nathalie Nypels *(Leenders 1920)*
Hortensienrosa, halbgefüllt, sehr gross, in Dolden, starkwachsend, gesund.

Orléans-Rose *(Levavasseur 1909)*
Geranienrosa, gross, gefüllt, grossdoldig, starkwachsend, gesund, reichblühend, 50—70 cm.

Paul Crampel *(Kersberger 1930)*
Dunkel orangescharlach, in Dolden, unempfindlicher Dauerblüher.

Rödhätte *(D. T. Poulsen 1911)* („Rotkäppchen")
Leuchtendrot, gross, in grossen Dolden, kräftig, gesund, Beetrose. Sehr hart.

Rufus *(A. I. & C. Allen (1926)*
Dunkel samtigkarmesinrot, sehr wetterfest, gut gefüllt, in grossen Dolden.

Superba *(de Ruiter 1927)*
Leuchtend scharlachrot, voll gefüllt, in grossen Dolden, reichblühend, gesund.

Suzanne Turbat *(E. Turbat & Cie. 1919)*
Kupfrigrosa, gross, in grossen Dolden, reichblühend, niedrig.

Teschendorff's Jubiläumsrose *(Teschendorff 1928)* Sport von „Orléans-Rose"
Zartrosa, enorm gross, vollgefüllt, in Dolden, wüchsig, reichblühend.

Neue Polyantharosen der letzten Jahre

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Anne-Mette Poulsen *(D. T. Poulsen 1935)* . . . . . Feurich hellrot, sehr gross, halbgefüllt, kräftig, aufrecht, reichblühend.	1.—	—
Dagmar Späth *(L. Späth 1935)* . . . . . Alabasterweiss, Sport von Joseph Guy, gross, halbgefüllt, reichblühend.	—.80	7.—
Dance of Joy *(Sauvageot 1932)* . . . . . Auffallend leuchtend scharlachrot, samtig, sehr gross, grossdoldig, Wuchs buschig, aufrecht, reichblühend.	—.60	5.50

Neue Polyantharosen (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Dick Koster *(D. A. Koster 1935)* Hell-lachsrosa bis orange, ziemlich gross, in Büscheln, sehr reichblühend. Treibrose, Topfrose.	—.80	7.—
Flamboyant *(Turbat & Cie. 1931)* Blendend scharlachrot, mittelgross, in Dolden, nicht verblauend, gedrungen, reichblühend, gesund und hart.	—.60	5.50
Fortschritt *(W. Kordes' Söhne 1933)* Pernetiana Mrs. S. du Pont × Gloria Mundi Primelgelb, orangerosa schattiert, Einzelblume enorm gross, ähnlich „Gruss an Aachen", in grösseren Dolden, reichblühend.	—.60	5.50
Frau Astrid Späth *(L. Späth 1930)* Sport von „Joseph Guy" Korallenrosa, üppig, grossdoldig, reichblühend, gesund.	—.60	5.50
Gabrielle Privat *(B. Privat 1931)* Rein, seidenartig rosa, reichblühend, vollkommen gefüllt, gesund, vorzügl. Beetrose.	—.60	5.50
Heidekind *(Münch & Haufe 1931)* Rugosa × Polyantha 100 St. M. 60.— Korallenrosa mit lachs Mitte, gut gefüllt, gross, in grossen Dolden, Wuchs gedrungen, unermüdlich blühend, gesund, hart. Hochstämme M. 2.50	—.80	7.—
Ingar Olsson *(D. T. Poulsen 1931)* Rein karminrosa, gut gefüllt, enorm gross, in Dolden, Wuchs kräftig, steil aufrecht.	—.60	5.50
Karen Poulsen *(D. T. Poulsen 1933)* 100 St. M. 60.— Feurig scharlachblutrot, einfach, schalenförmig wie „Kirsten Poulsen", haltbar, wüchsig, gesund, reichblühend.	—.80	7.—
Mevrouw (van Straten) van Nes *(M. Leenders & Co. 1934)* 100 St. M. 65.— Glühend cochenillekarmin, gross, schön gefranzt und gewellt, halbgefüllt, grossdoldig, Wuchs gedrungen, reichblühend. „Dauerwellenrose".	—80	7.—
Rouge *(Verschuren 1935)* Feurig blutrot, nicht verblauend, gross, gefüllt, Sport von „Rödhätte", reichblühend.	—.80	7.—
Valerie *(Chaplin Brothers 1932)* 100 St. M. 50.— Sonnengelb, gross, fast edelrosenähnlich, in Dolden, breitbuschig, Laub glänzend.	—.60	5.50

Schlingrosen / Kletterrosen

Die Verwendung der Schling-, Rank- oder besser Kletterrosen ist gar vielgestaltig. Als Werkstoff zur Bepflanzung von Säulen und Mauern, von Bogen und Lauben oder mehr landschaftlich als Kletterrosen auf alten Bäumen, als Bodendecke an Abhängen oder zur Bepflanzung von Teichrändern, überall wird man mit den Rankrosen vortreffliche Bilder schaffen. Wo Rankrosen auftreten, werden sie den Gartenteil durchaus veredeln und ihr Blütenreichtum wird zu einem alljährlich wiederkehrenden Erlebnis werden. Bei der Zusammenstellung meines Sortimentes habe ich besonderen Wert auf die Widerstandsfähigkeit gegen den gefürchteten Rosenmehltau gelegt, denn nur solche Sorten haben heute noch ein Recht darauf, angepflanzt zu werden. In dieser Beziehung sind von ganz besonderer Bedeutung alle Rankrosen mit Wichuraiana-Blut, die im nachstehenden Sortimente kenntlich gemacht sind durch die Wortabkürzung „Wichur.". Das der Wichuraiana eigene, glänzende Laub ist das ganze Jahr über eine ganz besondere Steigerung der Rankrosenwirkung. Hochstämmig veredelt bilden Rankrosen an Gestellen schirmartig gezogen wahre Prunkstücke im Rosengarten und als stimmungsvolle Trauerrosen sind sie für Grab- und Weihestätten ein Werkstoff von auserlesener Gestaltungskraft.

Starke Pflanzen, niedrig veredelt (n)

regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben
1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50, 100 Stück M. 50.—

Trauerrosen (Tr), Stammhöhe ca. 170—200 cm, 1 Stück M. 3.50, 10 Stück M. 30.—

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Albéric Barbier** *(Barbier 1900)* Milchweiss, Mitte gelb, edelrosenähnl., gross, gefüllt, starkwachsend.	Wichur.
Tr	n	**Albertine** *(Barbier & Co. 1921)* Lachsfarben kupfrigrosa, innen kupfrig, edelrosenähnl., reichblühend.	Wichur.
—	n	**American Pillar** *(Conard & Cie. 1901)* Rein rosenrot mit Weiss. Mitte, einf., in riesig. Dolden, starkwachs.	Wichur.
—	n	**Asta von Parpart** *(Geschwind 1909)* Purpurkarmin, in Büscheln, gut remontierend, frostsicher.	Multifl.-Hybr.
—	n	**Augenschein** *(Lambert 1905)* Gelblichweiss, sehr früh, gross, gefüllt, stark, winterhart, Duft!	Multifl.
—	n	**Auguste Kordes** *(W. Kordes' Söhne 1928)* Sport v. „Joseph Guy" Feurig scharlachrot, reichblühend, remontierend, gesund.	Polyantha

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Aviateur Blériot** *(Fauque & Fils 1910)* . . . . Tief safrangelb, edelrosenähnlich, in Dolden, wüchsig, schön belaubt.	Wichur.
—	n	**Chaplins Pink Climber** *(Chaplin Brothers Herbst 1929)* . . . . Rein leuchtend rosa, sehr gross, starkwachsend, reichblühend, gesund.	*TH*
		Climbing-Sorten siehe unter „Rankende".	
—	n	**Crimson Rambler** *(Chr. Turner 1894)* „Soukara-Ibara" (Kirschrose) . Kirschrot, starkrankend, in grossen Dolden.	Multifl.
—	n	**Diabolo** *(Fauque & Fils 1909/10)* . . . . Dunkelrot, einfach, samtig, gehört zu den dunkelsten, reichblühend.	Wichur.
Tr	n	**Dorothy Perkins** *(Perkins 1902)* . . . . Kirschrot-lachsrosa, gefüllt, in riesigen Dolden, sehr wüchsig.	Wichur.
—	n	**Dr. W. v. Fleet** *(P. Henderson 1910)* . . . . Fleischrosa, edel, gefüllt, haltbar, schönes Laub, winterhart.	Wichur.
Tr	n	**Excelsa** *(Walsh 1910)* . . . . Dunkelblutrot, gefüllt, grossdoldig, reichblühend, wüchsig.	Wichur.
—	n	**Fragezeichen** *(Böttner 1910)* . . . . Sattrosa, gross, gefüllt, in Dolden, reichblühend, winterhart.	Multifl.
Tr	n	(HAH) **Fräulein Octavia Hesse** *(Herm. A. Hesse 1910)* . . . . Reinweiss auf gelbem Grunde, „Kaiserin"-ähnlich, sehr edel, mittelgross, gefüllt, Duft! Verlangt wenig Schnitt!	Wichur.
—	n	**François Guillot** *(Barbier & Co. 1907)* . . . . Milchweiss, halbgefüllt, reichblühend, Staubbeutel dunkelgelb.	Wichur.
—	n	**Geisha** *(Geschwind-Lambert 1913)* . . . . Blutrot, gefüllt, gross, reichblühend, innen weiss gestreift.	Multifl.
		Gloire de Dijon, siehe unter „Edelrosen".	
—	n	**Gerberose** *(Barbier 1905)* . . . . Dunkelrosa, gross, gefüllt, edel, remontiert, winterhart, fast immergrün.	Multifl.
—	n	**Gruss an Freundorf** *(Prascač 1909)* . . . . Dunkelrot, locker gefüllt, grossdoldig, starkwachsend, haltbar, spät.	Wichur.
—	n	**Heart of Gold** *(v. Fleet 1926)* . . . . Schwarzrot mit weisser Mitte, einfach, starkwachsend, gesund.	Wichur.
		Helenae, siehe unter „Park- und Wildrosen".	
—	n	**Hiawatha** *(H. Walsh 1906)* . . . . Blutrot mit gelblichweisser Mitte, einfach, in Dolden, Wuchs kräftig.	Wichur.
—	n	**Ida Klemm** *(Walter 1907)* Weisse „Crimson Rambler" . . . . Schneeweiss, in riesigen Dolden, starkwachsend, reichblühend.	Multifl.
—	n	**Jean Guichard** *(Barbier & Cie. 1907)* . . . . Lachskarminrot, gefüllt, gross, Knospen zinnoberrot und gelbrot.	Wichur.
—	n	**Kommerzienrat W. Rautenstrauch** *(P. Lambert 1909)* . . . . . . Lachsrosa mit Hellgelb, polyantha-ähnlich, immerblühend, in Dolden.	Lambert.
—	n	**Lady Gay** *(H. Walsh 1905)* . . . . Kirschrosa mit Lachsschein, grossdoldig, starkwüchsig, hellaubig.	Wichur.
—	n	**Léontine Gervais** *(Barbier & Co. 1905)* . . . . Karmin bis kupfrigrosa, gefüllt.	Multifl.
—	n	**Le Rêve** *(Pernet-Ducher 1923)* . . . . Rein goldgelb, gross, halbgefüllt, nicht verblassend, reichblühend, winterhart, starkwachsend, frühblühend, auch Strauchrose.	Lutea-Hybr.
—	n	**Mad. Sancy de Parabère** *(Bonnet 1875)* . . . . Rosa, gefüllt, edel, gross, starkwüchsig, stachellos, reichblühend, winterhart, altbekannte Spalierrose.	Alpina
		Maréchal Niel, siehe unter „Edelrosen".	
—	n	**Marie Henriette Gräfin Chotek** *(Lambert 1912)* . . . . Leucht. karmesinrot, gross, gefüllt, stark rankend, gesund, winterhart.	Multifl.
—	n	**Mary Wallace** *(Dr. W. v. Fleet 1923)* . . . . Leuchtend silbrigrosa, edel, gefüllt, haltbar, starkwüchsig, reichbl., winterhart.	Wichur.
—	n	**Minnehaha** *(Walsh 1913)* . . . . Rosenrot, gefüllt, grossdoldig, starkwüchsig, reichblühend, winterhart.	Wichur.
—	n	**Mrs. F. W. Flight** *(Cutbush 1907)* Rambler-Typ . . . . Rein nelkenrosa, Mitte weiss, halbgefüllt, grossdoldig, starkwüchsig, reichblühend.	Multifl.
Tr	n	**New Dawn** *(Somerset Rose Nursery 1930)* . . . . Zart weisslichrosa, edel, haltbar. „Immerblühende Dr. W. v. Fleet". Duft!	Wichur.

Wuchsform		Name, Züchter, Einführungsjahr, Beschreibung	Klasse
—	n	**Nymphe** *(Türke 1910)* . . . . Reinweiss, runde Ballform einzeln oder in Büscheln, Wuchs stark, Laub hellgrün, wie „Maréchal Niel", remontierend.	Polyantha
—	n	**Oriole** *(P. Lambert 1912)* . . . . Nielgelb, gefüllt, haltbar, Knospen rötlich, Laub gesund, winterhart.	Multifl.
Tr	n	**Paul's Scarlet Climber** *(W Paul 1917)* . . . . Feurig scharlachrot, halbgefüllt, in mächtigen Sträussen, nie blauend, reichblühend, frühe Säulenrose, auch Strauchrose.	Wichur.
—	n	**Perle von Britz** *(Kiese & Co. 1910)* . . . . Rosa bis weiss, grossdoldig, dornenlos, Duft!	Multifl.
Tr	n	**Primevère** *(Barbier & Co. 1929)* . . . . Rein sonnengelb, gefüllt, gross, edel, starkwüchsig, gesund, winterhart, Duft!	Wichur.
—	n	**Prinses van Oranje** (de Ruiter 1933) Sport von „Gloria Mundi" . . Feurigorange, in gross. Dolden, leucht., gefüllt, haltbar, starkwüchsig.	Polyantha
—	n	**Rankende Wilhelm Kordes** *(Wood & Ingram 1927)* . . . . Kapuzinerbraunrot auf goldigem Grund, hart, reichblühend.	Pernet.
Tr	n	**Red Explorer** *(A. Penny 1928)* . . . . Schwärzlich schattiert scharlachrot, lange blühend, starkwüchsig.	Multifl.
		Reine Marie Henriette (Rote Gloire de Dijon) siehe unter „Edelrosen".	
—	n	**Sodenia** *(Weigand 1911)* . . . . Karminrot, grossdoldig, gefüllt, wüchsig, reichblühend.	Wichur.
—	n	**Solarium** *(Turbat & Co. 1927)* . . . . Leuchtendrot mit weisser Mitte, einfach, in Dolden, reichblühend.	Wichur.
Tr	n	**Tausendschön** *(I. C. Schmidt 1907)* . . . . Zartrosa, grossdoldig, halbgefüllt, gross, starkwüchsig, gesund, stachellos, winterhart, frühblühend.	Multifl.
—	n	**Trier** *(P. Lambert 1904)* . . . . Rahmweiss, halbgefüllt, doldig, gesund, hart, remontierend.	Lambert.
—	n	**Veilchenblau** *(I. C. Schmidt 1909)* . . . . Rötlichlila bis stahlblau, halbgefüllt, stachellos, wüchsig, hart.	Multifl.
Tr	n	**venusta pendula** . . . . Weiss, rosig angehaucht, starkwüchsig, reichblühend, sehr winterhart.	Arvensis
—	n	**Wartburg** *(Kiese & Co. 1910)* . . . . Karminrosa, gefüllt, grossdoldig, Petalen gedreht, reichblüh., winterh.	Multifl.
—	n	**White Dorothy** *(B. R. Cant 1909)* Sport von „Dorothy Perkins" . . . Weiss, gefüllt, grossdoldig, oft rosig angehaucht, reichblühend.	Wichur.
—	n	**Zéphirine Drouhin** *(Bizot père 1869)* . . . . Leuchtendrosa, locker gefüllt, sehr starkwüchsig, unermüdlich blühend, winterhart.	Bourbon

Neue Kletterrosen der letzten Jahre

Wuchsform		Name	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Tr	n	**Blaze** *(Jackson & Perkins 1933)* Wichur. Immerblühende „Paul's Scarlet Climber". Trauerrose M. 4.— . . . . 100 St. M. 60.— Blumenfarbe und Grösse wie Stammsorte, dazu am alten Holze dauernd blühend.	—.80	7.—
—	n	**Eva** *(W. Kordes' Söhne 1933)* Lambertiana . . . . Feurig blutrot, einfach, in gewaltigen Dolden, im Grunde weiss, stark kletternd, unaufhaltsam blühend, krankheitsfrei.	—.80	7.—
—	n	**Golden Climber** *(Mrs. Arthur Curtis James 1935)* . . . . Goldgelb, edelrosenähnlich, Knospe leicht scharlachorangerot gestreift, lange blühend, gut gestielt, winterhart.	1.—	9.—
—	n	**Hamburg** *(W. Kordes' Söhne 1935)* Lambertiana . . . . Feurig scharlachrot, halbgefüllt, gewaltig gross, blaut nicht, Laub krankheitsfrei, winterhart, Blüten in sehr grossen Dolden, auch dauerhafte Schnittblume.	1.—	9.—
—	n	**Louis Rödiger** *(W. Kordes' Söhne 1935)* Macrantha-Hybride . . . . . . Orangegelb, haltbar, Pflanze sehr starkwachsend, vollkommen winterhart und gesund.	—.80	7.—
—	n	**Wilhelm** *(W. Kordes' Söhne 1934)* Lambertiana . . . . Blutrot, gefüllt, grosse Dolden, reichblühend, winterhart.	—.80	7.—

Niedrige botanische Park- und Wildrosen

Die unter diesem Sammelbegriff hier aufgeführten Rosenarten und -formen sind vorzüglich geeignet, zu Gruppen oder auch zu Hecken verarbeitet zu werden. Auch als Einzelpflanzen im Rasen werden sie sich in jedem Garten als Schmuckstücke ganz besonderer Art erweisen. Nicht nur, dass sie den Zier- und Blütensträuchern an Wert gleichzusetzen wären, nein, auch ihr reicher und vielgestaltiger Fruchtbehang verschafft den Parkrosen bis spät in den Herbst hinein einen eigenen Reiz. Vielfach von ganz besonders würzigem Duft sind die überaus zahlreichen Blüten nicht nur prächtige Gartenzierde sondern auch stets willkommene Schnittblumen, deren einfachblühende Formen auch als Bienenweide gerne beflogen werden. Die Bestachelung des Rosenholzes macht viele Sorten zu wertvollen, undurchdringlichen Heckengehölzen, die den wichtigen Singvögeln willkommenen Unterschlupf und sichere Nistgelegenheiten bieten, so daß zumal die stark fruchtenden Formen vorzüglich für Fasanerien, Wildgehege und Vogelschutz Verwendung finden können. Die erprobte Winterhärte steigert den Wert der Wild- und Parkrosen noch bedeutend, und die geringe erforderliche Pflege gestaltet auch den Unterhalt für jedermann tragbar. Da es sich um reichblühende Strauchrosen handelt, empfiehlt sich nur ein sinngemässes Auslichten und später Verjüngen des Strauches je nach Bedarf. Sollte der Strauch im Laufe einer Vegetationsperiode stark Wasserschosse treiben, die dann über den Strauch hinauswachsen und dessen Blühbarkeit beeinträchtigen oder den zierenden Fruchtbehang bedecken, so empfiehlt es sich, diese unverzweigten frischen Triebe bis in den Strauch hinein bereits im Sommer zurückzuschneiden und im nächsten Frühjahr vor dem Austrieb diese Schosse auf etwa 20 cm über dem Erdboden zu kürzen, damit sie zur Verzweigung angeregt werden. Im übrigen beachte man die Angaben bei jeder einzelnen Sorte meines reichhaltigen Sortiments.

Parkrosen, in schönsten Sorten meiner Wahl 10 Stück M. 5.50, 100 Stück M. 50.—

Rosa — Rose — Rosaceae	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
acicularis *Ldl. 1820* . . . . . Frischrosa, nadelstachlige Zimtrose, einf., zu 4 gehäuft, feiner Duft! 150, VI.	—.60	5.50	—
alba Maiden's Blush *Kew. 1797* (R. alba incarnata *West*) ♗ . . . . . Blass fleischfarbigrosa, gefüllt, für Gruppen und Hecken, 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
alpina plena *Hort.* Gefülltblühende Alpen-Zimtrose . . . . . Tiefpurpurkarmin, schön gedrungen buschig, 200—250, VI.	—.70	—	—
amblyotis siehe R. cinnamomea oxyodon.			
arvensis *Huds.* (R. repens *Scop*) △ . . . . . Weiss, einfach, dünntriebige, kriechende Felsenrose. VI—VII.	—.60	5.50	—
Bergrose von Colorado *Hort.* . . . . . Leicht rosa, Rückseite dunkler, einzeln, 5—7 cm Dm., altes Holz rot, fast stachellos, Blatt 7 fiederig, Duft! 150, V—VI.	—.60	5.50	—
burgundiaca *Roess* (R. centifolia parvifolia *Rehd.*) Burgunderrose △ . . Dunkelrosenrot, zu zweien, buschig, würziger Duft! 80, VI—VII.	—.60	5.50	—
calcutensis *Hort* . . . . . Rosa, Laub blaugrau, 250—350, VI.	—.60	5.50	—
californica plena siehe R. Theano.			
canina caucasica *Pall.* . . . . . Rosarot, später stark verblassend, zu zweien, starkwachsend, 250, VI.	—.60	5.50	—
carelica *Fries.* (R. acicularis Gmelini *C. S.*) △ . . . . . Hellrosa, dichtborstig, buschig, Früchte birnförmig, bis 100, IV—V.	—.60	5.50	—
centifolia *L* △ . . . . . Hellrosa, dichtgefüllt, stark würziger Duft! 80—150, VI—VII.	—.60	5.50	—
» **Rose des Peintres** △ . . . . . Rosa, Mitte dunkler, gross, gefüllt, duftig, 100, VI—VII.	—.60	5.50	—
» **Unica** *Grimwood 1778* (Unique blanche, White Provence) △ . . . . Milchweiß, gefüllt, starkwüchsig, Duft! 100, VI—VII.	—.60	5.50	—
» **muscosa Blanche Moreau** *Moreau-Robert 1881* △ . . . . . Reinweiß gef., gross, in Büscheln, sehr gut bemoost, Duft! 100, VII.	—.60	5.50	—
» » **cristata** *Kirche 1827* (Châpeau de Napoléon) △ . . . . . Rosa, groß, gef., kugelig, stark bemoost, breitbusch., Duft! 80, VII.	—.60	5.50	—
» » **Julie de Mersan** *Thomas 1854* △ . . . . . Purpurrosa Moosrose. 100, VI—VII.	—.60	5.50	—
» » **bifera Deuil de Paul Fontaine** Fontaine *1874* △ . . . . . Dunkelpurpur, feuerrot schattiert, gross, gefüllt, willig, aufblühend, stark remontierend, 100, VII.	—.60	5.50	—
» » » **Impératrice Eugénie** *Guillot père 1856* △ ♗ . . . . . Leuchtendrosa, gross, gefüllt, stark bemoost, fast immerblühend, 100, VII.	—.60	5.50	—
» » » **Madame Moreau** *Moreau-Robert 1872* △ . . . . . Zinnober, weiß gestrichelt, gross, gut gef., remont., 100, VII.	—.60	5.50	—
» » » **Nuits d'Young** *Laffay 1845* △ . . . . . Kastanienbraun bis purpurrot, remontierend.	—.60	5.50	—

Rosa (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
cinnamomea oxyodon *Hort.* (R. amblyotis *Meyer*) . . . . Hellrosa mit dunkler Aderung, reichblüh., schwach bewehrt, 200—250, VI.	—.60	5.50	—
» **plena** *Hort.* (R. foecundissima *Münchh.*) . . . . Purpurn, gefüllte Zimtrose, 150, VI.	—.70	—	—
coruscans *Lk.* △ ☘ . . . . Rot, einfach, ähnlich R. rugosa, Wuchs gedrungener, frischgrün, reich fruchtend, 100, VI—VII.	—.60	5.50	—
dahurica *Pall.* (R. daurica, R. davurica) . . . . Leuchtend tiefkarminrot mit weisser Mitte, einzeln, einfach. 150, VI.	—.60	5.50	—
damascena Madame Hardy *Hardy 1833* △ . . . . Reinweiss, gross, flach, gefüllt, oft Mitte grünlich, 100, VI.	—.60	5.50	—
» **mundi selfcoloured** △ . . . . Karmin, halbgefüllt, reicher Fruchtbehang, Duft! 100, VI.	—.60	5.50	—
Davidii *Crépin* ☘ . . . . Rosa, einf., bis 5 cm breit, Fr. orangerot, flaschenförmig, 150—300, VI—VII.	—.70	6.50	—
Dingleri *C. S.* (R. glauca × rubiginosa forma Dingleri *Hort. Monac*) . . . Lichtrosa, gross, einfach, sehr reichblühend, starkwachsend f. Parke, 200, VI.	—.60	5.50	—
Fargesii *Hort.* (R. Moyesii Fargesii *Rolfe*) ☘ . . . . Samtig dunkelkarminrot, einfach, Staubfäden altgold, kranzartig, Früchte scharlachrot, flaschenförmig, Laub dunkel, 300, VI.	1.20	10.—	90.—
Fendleri *Crép* . . . . Weisslichrosa, reichbl., wüchsig, Fr. klein, dunkelrot, ellipt., 200, VI—VIII.	—.60	5.50	—
ferox *M. Bieb.* (R. Biebersteini *Ldl.*) △ . . . . Weiss, zu 1—3, einf., dichter Wuchs, für Vogelschutz! 40—70, VI—VII.	—.80	—	—
gallica grandiflora *Hort.* Ölrose ⌂ . . . . Leuchtend hell- bis tiefkarminrot, stark wachsend, 100—150, VI.	—.70	6.50	60.—
Giraldii *Crépin* . . . . Rosa, reichblühend, buschig, Fr. eiförmig, scharlach, bis 250, VI.	1.—	—	—
Griseldis, Geschwinds Nordlands-Rose . . . . Rosarot, stark gefüllt, starkwüchsig, Duft! Bis 250, VII.	—.60	5.50	50.—
haematodes *Boiss.* (R. oxyodon haematodes *Arb. Zöschen 1894*) ☘ . . . Rosarot, stark buschig, schön zierfrüchtig, 300, VI.	—.60	5.50	—
Helenae *Rehd. & Wils* . . . . Weiss, in Büscheln, Fr. eiförmig, rot, köstlicher Duft! Bis zu 5 m lange Schosse, VI—VII.	—.80	7.—	—
hibernica *Sm. 1824* (R. spinosissima × canina) . . . . Leucht. rosa, gross, einfach, reichbl., aufrecht, Fr. rot, bis 300, V—VI.	—.60	—	—
Hugonis *Hemsl.* . . . . Kräftig gelb, reichblühend, einfach, Fr. schwarzrot, winterhart, nichtwuchernd, 150—250, V—VI.	1.—	9.—	—
Lawrenceana *Hort* (R. chinensis minima) Bengal-Pompon-R., △ **m. Tb.** Rosarot, kleines gefülltes Zwergröschen, fast immerblüh., 20—30, V—IX.	1.20	10.—	90.—
Lehmanniana *Bngl. 1851* ☘ . . . . Rosa, ähnlich R. Beggeriana, Fr. orangerot, bis 150, VI—VII.	—.60	—	—
lucida plena *Hort.* . . . . Hellrosa, gross, starker Duft! Bis 150, VIII.	—.80	7.—	—
lutea hybrida Austrian Yellow *Gérard 1896* . . . . Reingelb, einfach.	—.70	6.50	—
» **hybrida Jaune bicolore** *Gerard 1896.* Wiener Rose △ . . . . . . Kapuz.-gelb, Mitte karmin od. kapuzinerbraun, mittelgross, einfach	—.70	6.50	60.—
» » **Parkfeuer** *Lambert 1906* . . . . Glühend scharlachrot, mittelgross, einfach, winterhart, 400, VII.	—.60	5.50	50.—
» » **Persian Yellow** *Willock 1883* (R. persica lutea) . . . . Dunkelgoldgelb, mittelgross, kugelig, halbgefüllt, reichblüh., hart.	—.70	6.50	60.—
» » **Soleil d'or** *Pernet-Ducher 1897* . . . . Orangegoldgelb, kapuzinerrot schattiert, gross, gefüllt, wohlriechend, wüchsig, hart.	—.80	7.—	—
» » **Star of Persia** *Rev. J. H. Pemberton 1919* . . . . Sattgelb, halbgefüllt, hart, 150, VII.	—.60	—	—
» » **Von Scharnhorst** *Lambert 1921* . . . . Schwefelgelb bis buttergelb, halbgefüllt, reichblühend, remontierend, 150, VI—IX.	—.60	—	—
macrantha *Desp.* . . . . Fast weiss, sehr grossblumig, einfach, 200, VI—VII.	—.60	5.50	50.—
macrophylla *Ldl.* ☘ . . . . Rosa, zu 1—3, Fr. flaschenförmig, 150—200, VI—VII.	—.60	5.50	—

Rosa (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Madame Plantier *Plantier* Indica-Noisettiana-Hybride ⌂ Schneeweiss, reich in Dolden blühend, gefüllt, zu Hecken, 150, VI—VIII.	—.70	6.50	—
majalis *Ldl.* Mairöschen Purpurrosa, halbgefüllt, bis 2 m hoch kletternd, V—VI.	—.60	5.50	—
manca *Greene* △ ♣ Weiss, einfach, reichblühend, Laub lackglänz., Fr. korallenrot, 100 V—VI.	—.60	5.50	—
microphylla *Roxb.* (R. Roxburghii *Tratt.*) Rosa, einfach, wüchsig, zierlich belaubt, Fr. kugelig, rot, stachelig, 150 —250, VII.	—.70	6.50	—
micrugosa *Henkel* (R. microphylla × rugosa) △ ♣ ⌂ Rosa, einf., Laub gross, zierend, Fr. gross, rot, stark bestach. 75—100, VI.	—.60	—	—
moschata *Herrm.* Moschus-Rose Hellrosa, halbgefüllt, reichblühend, rottriebig, grosslaubig, 5teilig, bis 300, VI—VII.	—.60	—	—
moschata Duponti *Hort.* Weiss, grossblumig, einfach, Laub 7teilig, Holz grau, 200, VI.	—.60	5.50	—
Moyesii *Hemsl. & Wils.* ♣ Tiefsamtig scharlachrot, einzeln an Kurztrieben, tellerförmig, Laub lichtgrün, Fr. flaschenförmig, reichfruchtend, 400, VI—VII.	1.20	10.—	90.—
multibracteata *Hemsl. & Wils.* ♣ Rot, in Trauben, m. viel. Brakteen, Fr. orangerot, borstig, spät, 200, VI—VII.	1.—	—	—
multiflora *Thbg. 1784* ⌂ Weiss, klein, einfach, in grossen vielblütigen Dolden, Wuchs überhängend, 300, V—VI.	—.50	4.50	40.—
nitida *Willd.* Glanzrose △ ≌ Lebhaft dunkelrosenrot, einfach, schön glänzend belaubt, Zweige dicht rotborstig, Fr. rot, borstig, 50, VI—VII. Auch für feuchte Lagen.	—.80	7.—	—
omeiensis pteracantha *Rehd. & Wils.* Weiss, 4-petalig, zierl. belaubt, schön bestachelt, Fr. klein, rot u. gelb, 200, V.	—.70	6.50	—
pimpinellifolia Lady Hamilton *Hort.* △ Bläulich violett, 100, VI.	—.80	7.—	—
» **Maria Stuart** *Hort.* △ Zartrosa, gelbgrundig, gefüllt, einzeln, Duft! 100, VI.	—.80	7.—	—
» **Staffa** *Hort.* △ Milchweiss mit zartrosa Anflug, halbgefüllt, reichblühend, 100, V—VI.	—.80	7.—	—
» **Stanwelliana perpetual** *Brown* △ Zartrosa, gefüllt, gross, buschig, 100, V—IX.	—.80	7.—	—
» **xanthina** *Ldl.* △ Leuchtend dunkelgelb, gross, einfach, reichblühend, VI.	—.80	7.—	—
» » **var. Allard** *Hort.* △ Rein goldgelb, gross, einfach, reichblühend, V—VI.	—.80	7.—	—
pisocarpa *A. Gray 1872.* Erbsenrose ♣ Rosa, einfach, reichblühend, Früchte erbsengross, orangerot, macht stark Ausläufer, daher für Böschungen! 200—250, VI.	—.60	5.50	—
pomifera *Herrm.* (R. villosa *L.*) Rosenapfel ♣ + Rosa, einfach, in Dolden, Laub blaugrau, Fr. birnförmig, dunkelrot, 200—250, VI—VII.	—.60	5.50	—
Prattii *Hemsl.* Tiefrosa, zu 1—3, Stacheln strohgelb, Fr. orangescharlach, 150—250, VI.	—.60	5.50	—
provincialis Georges Vibert *Robert 1853* △ Purpurn mit Violett, weiss gestreift, gross, flach, gefüllt, 100, VII.	—.60	—	—
» **Oeillet parfait** *Foulard 1891* △ Rot, lila und purpurn gestreift, mittelgross, gefüllt, flach, 100, VII.	—.60	5.50	—
pubescens *Roxb.* ♣ Leuchtend rosarot, einfach, herrlicher Fruchtbehang, bis 300, VI.	—.60	5.50	—
Rouletii *Corr. 1923* „Glückröschen" △ **m. Tb.** Dunkelrosenrot, flach, sehr klein, Laub spitz, Liliput-Röschen, immerblühend, 15, VI—IX.	1.20	10.—	—
rubiginosa *L 1767* Weinrose, Schottische Zaunrose, Sweet Briar ⌂ Rosenrot, einfach, reichblühend, Laub nach Äpfeln duftend, 250, VI.	—.40	3.50	—
» **Bradwardine** *Keynes & Cie. 1894* Lebhaft rosa, reichblühend, einfach mit hellerer Mitte, 300, VI.	—.60	5.50	—
» **Lady Penzance** *Penzance 1894* Kupfriggelb, einfach, Fr. orangescharlach, 250, VI.	—.60	5.50	50.—
» **Lucie Ashtown** *Keynes & Cie. 1894* Frischrosa mit weißer Mitte, oft zweireihig, 300, VI.	—.60	5.50	—
» **magnifica** *Hesse 1916* ⌂ Leuchtend karminrot, halbgefüllt, reichblüh., schön belaubt, 200, VI.	—.60	5.50	50.—

Rosa (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
rubiginosa Refulgence *Paul & Sons 1908* . . . Leuchtend blutrot, halbgefüllt, gross, reichblühend, 250, VI.	—.60	5.50	—
rubrifolia livida *Hort.* . . . Rosenrot, einfach, Laub hechtblau und rot, 200, V—VII.	—.60	5.50	—
» **plena** *Hort.* . . . Dunkelrosa, gefüllt, reichblüh., leicht überhäng., Laub wie Art, 200, VI.	—.60	5.50	—
rugosa *Thbg. 1784.* Nordische Apfelrose, Kartoffelrose ♧ + . . . Rot, einfach, gross, reichblühend, Laub gross, Frucht grosskugelig, eßbar, harter kräftiger Wachser, würziger Duft! 150, V—VI.	—.50	4.50	40.—
» **alba** *Hort* ♧ + . . . Weiss, einfach, gross, reichblühend, sonst wie Art, besonders gut fruchtend, 150, V—VI.	—.50	4.50	—
» **calocarpa** *Hort.* ♧ . . . Rosa, gefüllt, trotzdem reichtragend, 150—200, V—VI.	—.60	5.50	—
» **hybrida Agnes** *Sanders 1922* . . . Hellgelb, gefüllt, groß, wüchsig, hart, 150, VI. Remontiert.	—.60	5.50	—
» » **à Parfum de l'Hay** *J. Gravereaux 1904* . . . Karmin-kirschrot, kugelig gefüllt, kräftiger Ölrosenduft! 150, VI.	—.60	5.50	—
» » **Bergers Erfolg** *V. Berger 1924* . . . Leuchtend rot, einfach, haltbar, 150, VI.	—.60	5.50	—
» » **Blanche double de Coubert** *Cochet-Cochet 1894* . . . Reinweiss, halbgef., sehr gross, stark, remont., hart, 150, VI—IX.	—.60	5.50	—
» » **Carmen** *Lambert 1906* . . . Leuchtend dunkelblutrot, einfach, dicht bestachelt, 200, VI—X.	—.60	5.50	50.—
» » **Conrad Ferdinand Meyer** *Dr. Müller 1900* . . . Silbrigrosa, stark gef., sehr gross, stark bestach., hart 200, VI—IX.	—.60	5.50	50.—
» » **F. J. Grootendorst** *De Goy 1918* „Nelkenrose" △ . . . Satt kirschrot, dicht gefüllt, scharf gesägte Blütenblätter, 80—100, VI—VIII.	—.60	5.50	50.—
» » **Kaiserin des Nordens** *Regel* (Rosa rugosa rubra plena *Rehd.*) Violettpurpur, gefüllt, groß, hart, 250, VI—VIII.	—.60	5.50	—
» » **Mad. Georges Bruant** *Bruant 1888* . . . Glänzend weiss, halbgefüllt, gross, reichblühend, hart, starker Duft! 150, VI—X.	—.60	5.50	—
» » **Nowa Zembla** *Mees 1906* . . . Reinweiss, gefüllt, hart, wüchsig, Duft! 200, VI—VIII.	—.60	5.50	—
» » **Sanguinaire** *F. Gillot 1933* . . . Leuchtend blutrot, auf gelb. Grund, gefüllt, unaufhörlich blühend, sehr hart, bis 200, VI—Herbst.	—.80	7.—	—
» » **Schneelicht** *Geschwind 1894* △ . . . Blendendweiß, einfach, leicht rankend, 50, VI—VII.	—.60	5.50	—
» » **Schneezwerg** *P. Lambert, 1912* △ ♗ . . . Blendendweiss, in Dolden, flach, halbgefüllt, fruchtend, 60, VI—X.	—.60	5.50	—
» » **Souvenir de Christophe Cochet** *Cochet-Cochet 1895* . . . Lebhaft fleischrosa, mit Karmin, sehr gross, halbgefüllt, schön fruchtend, 150, VI—VII.	—.60	—	—
» » **Souvenir de Philemon Cochet** *Cochet-Cochet 1900* . . . Weiss, Mitte rosa, gross, gefüllt, starkwüchsig, 150. VI—VII.	—.60	—	—
» » **Stern von Prag** *V. Berger 1924* . . . Samtig blutrot, gefüllt, edel, hart, reichblühend, starker Duft! 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
» » **Türke's Rugosa-Sämling** *Türke 1923* . . . Gelb, gross, dichtgefüllt, i. Verblüh. pfirsichrosa, hart, Duft! 150, VI.	—.60	5.50	50.—
» **repens** (alba) *Paul* (R. Paulii *Rehd.*) △ Clematisrose . . . Reinweiss, einf., sternartig, gross, als Laufrose, wertvoll, VI—VIII.	—.60	5.50	—
sericea pteracantha *Franch.* Stacheldrahtrose . . . Elfenbeinweiss, klein, 4-petalig, Laub zierlich, Stacheln breit, durchscheinend rot, 250, V.	—.80	7.50	70.—
setigera *Mch.* Prairie-Rose . . . Rosenrot, einfach, bis 5 cm Durchmesser, reichblühend, später weisslich, 100—200, VI—VIII.	—.60	5.50	—
setipoda *Hemsl. & Wils.* ♧ . . . Hellrosa, einfach, in lockeren Rispen, Fr. flaschenförmig, zierend, bis 300, VI.	—.60	5.50	—

Rosen

Rosa (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sweginzowii *Koehne* . . . . Hellrosa, mit kürzeren Kelchen und runder als R. setipoda, Fr. urnenförmig, bis 300, VI.	—.80	7.—	—
Theano *I. C. Schmidt* (R. californica plena *Hort.*) . . . . Leuchtend rosa, gefüllt, reichblüh., Dolden mit bis 100 Blüten, 150, VI—VII.	—.60	5.50	—
venusta pendula siehe unter „Schlingrosen".			
villosa siehe R. pomifera.			
Vilmorinii siehe R. micrugosa.			
Willmottiae *Hemsl.* . . . . Rosapurpurn, einfach, klein, aber sehr reichblühend, zierliches Laub, breit ausladender Strauch, 150, V—VII.	1.20	11.—	—

Neue Parkrosen der letzten Jahre

Rosa hybrida bifera Hermann Löns *(M. Tantau 1931)* . . . . Leuchtend rot, einfach, reich und lange blühend, Laub gross, gesund, winterhart, Früchte gross, rot, Wildrosenduft! 150, VI—IX.	—.70	6.50	60.—
Rosa rubiginosa hybrida Rosenwunder *(W. Kordes' Söhne 1934)* . . . Hellrot, gut gefüllt, enorm gross, edelrosenartig, reichblühend, starkwüchsig, Laub glänzend, gesund, winterhart, 200, VI—VII.	—.80	7.—	—
Rosa rugosa hybrida Dr. Eckener *(V. Berger-Teschendorff 1930)* . . . . Sattgelb mit Orange durchzogen, gross, starkwachsend, reichblühend, hart, 200, V—VII.	—.70	6.50	—
Rosa rugosa hybrida Goldener Traum *(Türke-I. C. Schmidt 1933)* . . . Rein sonnengelb, nie verblassend, gut gefüllt, unaufhörlich blühend, hart, gesund, langstielig, 150, VI—VII.	1.—	9.—	—

Koniferen. — Nadelhölzer.

Der teils schön regelmässige, teils wirkungsvoll malerische Wuchs macht die Nadelhölzer zu beachtlichen Haupt-Kernpunkten eines jeden Gartens. Sowohl als Einzelpflanzen als auch in Gruppen vereint sind Nadelhölzer, zumal bei ihrem grossen Farbenreichtum des Austriebes oder des gesamten Nadelkleides und ganz besonders im Winter von meist überraschender Wirkung in der Landschaft. Ihr Wert als Hecken- oder als Randpflanzung zur Verdeckung der Gartengrenzen oder als Sicht- und Windschutz ist genügend bekannt und geschätzt. Die dunkelgrünen oder stahlblauen Formen finden schon immer viel Beachtung bei Ausgestaltung von Grab- und Weihestätten. Die lustigen Zwergformen sind begehrte Prunkstücke in jedem Steingarten und werden auch dort der ganzen Anlage den Halt geben.

Die beste Pflanzzeit ist Ende August bis Ende Oktober und die Frühjahrsmonate April-Mai. Beim Pflanzen beachte man genau die Vorschriften für Behandlung von Ballenpflanzen, wie an anderer Stelle meines Verzeichnisses angegeben.

Ballenpflanzen.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Die Höhenangaben bei den Sortenbeschreibungen beziehen sich auf die Heimat-Standorte.

Abies — Weiss- oder Edeltanne — Pinaceae.	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alba mit Formen, siehe A. pectinata mit Formen.				
amabilis *Forb.* Purpurtanne. Echt! Eine der schönsten, edelsten Tannen, von herrlichem Bau, Benadelung sehr dicht, aromatisch, glänzend. „White Fir" der Amerikaner, aus dem Kaskaden-Gebirge Oregons, bis 75 m.	80—100	6.—	54.—	—
	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	12.—	110.—	—
Ⓝ **arizonica** *Merr.* Arizona-Korktanne ℨ. Eine der schönst gefärbten Blautannen mit korkiger Rinde, Stamm, Äste und Zweige sehr hell, 15 m.	100—125	8.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
	150—175	15.—	—	—
	175—200	18.—	—	—
balsamea *Mill.* Balsamtanne. Raschwachsend, schmal pyramidal, dunkelgrüne Tannenart Nordamerikas, 15 bis 25 m.	50—70	2.—	18.—	—
brachyphylla *Maxim.* (A. homolepis *Sieb. & Zucc.*). Stattliche Nikkotanne, regelmässig pyramidal. Teilweise auch als A. umbilicata oder A. homolepis umbilicata im Handel. Dichtstehende, glänzend dunkelgrüne Benadelung an regelmässig abstehenden, gefurchten Zweigen. Japan, bis 40 m. Wird nur selten vom Wild verbissen.	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	7.—	65.—	—
	200—250	10.—	90.—	—
	250—300	15.—	140.—	—
	300—350	18.—	160.—	—
cephalonica *Loud.* (A. panachaica *Heldr.*). Herrliche, dekorative Weisstanne, dunkelgrüne, stechend spitze Nadeln, Griechenland, 15—30 m.	80—100	3.50	31.50	—
	100—125	4.—	—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	6.—	—	—
	175—200	8.—	—	—
cephalonica × pinsapo, siehe A. Vilmorini.				
concolor *Lindl. & Gord.* Grautanne ℨ. Mit langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln. Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart. Aus den Gebirgen Kaliforniens, 25—50 m.	40—60	2.—	18.—	150.—
	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
	175—200	15.—	135.—	—
	200—250	20.—	180.—	—
	250—300	25.—	225.—	—
	300—350	28.—	—	—
	350—400	30.—	—	—
• **violacea** *Hort.* ℨ. Sehr seltene, besonders blauweisse Form der blaufarbigen Grautanne. Vollkommen hart wie die Art.	175—200	20.—	—	—
	200—250	25.—	225.—	—
	250—275	28.—	—	—
Ⓝ **Delavayi** *Franch.* An A. Veitchi erinnernd, Blätter an den Rändern eigentümlich eingerollt, Zapfen dunkelpflaumenblau. China, bis 40 m.	40—60	6.—	—	—
	100—125	12.—	—	—
Ⓝ **Faxoniana** *Rehd. & Wils.* Neu! Flach benadelte, dunkelgrüne Art West-Chinas, bis 40 m.	60—80	6.—	54.—	—
grandis *Lindl.* Grosse kalifornische Küstentanne. Bildet schlanke, dunkelgrüne Pyramiden, Benadelung glänzend dunkelgrün, kammförmig gestellt, westliches Nordamerika, bis 90 m.	250—300	15.—	—	—
	300—350	18.—	—	—
	350—400	22.—	—	—
	450—500	25.—	—	—
homolepis, siehe A. brachyphylla.				

Abies (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
lasiocarpa *Lindl.* (A. concolor lasiocarpa *Engelm. & Sarg.* A. Lowiana *Murr.*) Rauhfrüchtige Tanne	40—60	2.—	18.—	—
Wuchs ziemlich schmal und steifer als bei A. concolor. Nadeln lang, ziemlich regelmässig zweireihig. Kalifornien, bis 75 m.	ca. 500	35.—	—	—
» *Nutt.*, siehe A. subalpina.				
nephrolepis *Maxim*	100—125	8.—	—	—
Schlanker Baum, Nadeln nicht gescheitelt oberseits, dichtstehend, unterseits silberweiss. Zapfen klein. NO-China bis Korea, bis 30 m.				
nobilis *Lindl.* Edle Weiss- oder Silbertanne	80—100	5.—	45.—	—
Gedeiht in allen Lagen, verdient weiteste Verbreitung. In der Jugend von langsamem Wachstum, später herrlicher Stammbildner. Oregon, 60—90 m.	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
	150—175	15.—	135.—	—
	175—200	18.—	160.—	—
» **argentea** *Beissn.*	100—125	15.—	—	—
Sehr seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit Silberschimmer.	125—150	18.—	—	—
» **glauca** *Beissn.*	100—125	10.—	90.—	—
Prächtig dunkelblau gefärbte Form. Sehr wüchsig.	125—150	15.—	—	—
Nordmanniana *Spach.* Nordmanns Tanne	30—40	3.—	27.—	—
Prächtige dunkelgrüne Art mit wuchtigen, geschwungenen Ästen, Kaukasus, 25—30 m.	40—60	3.50	31.50	—
	125—150	10.—	—	—
» **pendula** *Hort.* Nordmanns Trauertanne	30—40	5.—	—	—
Form mit stark herabhängenden Zweigen.	100—125	15.—	—	—
panachaica, siehe A. cephalonica.				
pectinata *DC* (A. alba *Mill.*) Weisstanne	60—80	2.—	18.—	—
Schöner, bekannter Baum des Schwarzwalds mit quirlig ausgebreiteten Ästen, Blätter glänzend dunkelgrün, schön gescheitelt, unterseits mit 2 weissen Streifen. Mittel-S.-Europa, 30 m.	80—100	2.50	22.50	—
	150—175	6.—	—	—
» **pendula** *Hort.* (A. alba pendula *Hort.*)	30—40	5.—	—	—
Üppige Hängeform der bekannten Weisstanne mit phantastisch unregelmässig herabhängenden Zweigen u. Ästen.	60—80	8.—	—	—
	175—200	20.—	—	—
» **pyramidalis** *Carr.* (A. alba pyramid. *Carr.*)	50—70	6.—	—	—
Besonders schön, aufstrebende Säulenform.				
pinsapo *Boiss.* Spanische Tanne	100—125	8.—	—	—
Baum vom Grund auf beästet, Äste in regelmäss. Quirlen, Blätter sehr dicht, um den Zweig gleichmässig verteilt, dicklich und stechend, dunkelgrün. S.-Spanien, bis 25 m.				
» **glauca** *Hort.* Blaugrüne, spanische Tanne	175—200	20.—	—	—
Herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird, bis 25 m.	200—225	25.—	225.—	—
	225—250	28.—	—	—
	250—275	30.—	—	—
subalpina *Engelm.* (A. lasiocarpa *Nutt.*)	150—175	10.—	90.—	—
Westamerikanische Balsamtanne, ganz hart, mit bläulich schimmernder Benadelung, bis 30 m.	175—200	12.—	110.—	—
sutchuenensis *Rehd. & Wils.*	40—60	6.—	—	—
Rotzweigige Art Westchinas mit gekrümmten, glänz. Nadeln				
Veitchii *Lindl.* Veitchs Weisstanne	125—150	4.50	40.—	—
Ganz harte und reizende Art Japans mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Auserlesener Schmuck für Garten und Park, 30—40 m.	200—250	8.—	—	—
	250—300	12.—	110.—	—
	300—350	15.—	135.—	—
Vilmorinii *Mast.* (A. cephalonica×pinsapo)	150—175	15.—	—	—
Dichtzweigig, breit pyramidal mit frischgrüner Benadelung.	200—225	20.—	—	—
	250—275	25.—	—	—

Araucaria — Schmucktanne — Araucariaceae

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
imbricata *Pav.* (A. araucana *K. Koch*). **m: Tb.**	20—30	5.—	—	—
Bizarr aussehender Zierbaum mit dachziegelartig angeordneten im Grunde stark verbreiterten Nadeln, Chile, 30—50 m.	30—40	6.—	—	—
lanceolata *Hort.* siehe Cunninghamia sinensis.				

Cedrus — Zeder — Pinaceae

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
atlantica *Manetti*, Atlas-Zeder	40—60	3.—	27.—	—
Schöner Baum Nordafrikas von stets pyramidalem Wuchs bis 40 m.	60—80	5.—	45.—	—
	175—200	20.—	—	—
	200—225	25.—	—	—
	300—350	35.—	—	—



Pinus leucodermis
Schlangenhautkiefer

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cedrus (Fortsetzung):				
atlantica aurea *Hort.* Form mit sehr schön dunkelgelber Benadelung an jungen Trieben, ältere mehr grün, widerstandsfähig.	80—100	10.—	90.—	—
» **glauca** *Hort.* Schön stahlblaue, wirkungsvolle Form.	40—50	6.—	54.—	—
	80—100	10.—	90.—	—
	125—150	15.—	135.—	—
deodara *Laws.* Himalaya-Zeder, Deodara-Zeder. Leicht überhängende Bezweigung und blaugrüne Benadelung, bis 50 m.	80—100	8.—	72.—	—
	100—125	10.—	—	—
	250—300	25.—	—	—
	300—350	30.—	—	—
	350—400	35.—	—	—
» **robusta** *Hort.* Üppige Form mit im Bogen überhängenden Ästen.	150—175	15.—	—	—
	300—350	30.—	—	—
» **verticillata glauca** *Hort.* Prächtig blaugrün, Äste quirlständig, sehr langnadelig.	40—50	8.—	—	—
libani *Laws.* Libanon-Zeder. Krone schirmförmig, Laub dunkelgrün, 25—40 m.	175—200	20.—	—	—
» **pendula** *Hort.* (C. libani pendula Sargentii *Hort.*) Interessante Hängeform.	30—40	4.—	36.—	—
	60—80	8.—	72.—	—
Cephalotaxus — Kopfeibe — Cephalotaxaceae				
drupacea *Sieb. & Zucc.* Kopfeibe. Baum Central-Chinas mit quirlförmigen Ästen und lederartigen, dunkelgrünen Nadeln, bis 10 m.	20—30	3.—	—	—
	40—60	4.—	—	—
» **fastigiata** *Carr.* (C. pedunculata fastigiata *Hort.*, Podocarpus koraiana *Sieb.*) Säulen-Kopfeibe. Von regelmässigem dichtem Wuchs, auch als Kübelpflanze wertvoll.	20—30	4.—	36.—	—
Fortunei *Hook.* Fortunes Kopfeibe. Breiter Strauch mit langen, hellgelblichgrünen Nadeln. In der Heimat China Baum bis 12 m.	30—40	4.—	—	—
pedunculata fastigiata, siehe C. drupacea fastigiata.				
Chamaecyparis — Schein-Zypresse — Cupressaceae				
Lawsoniana *Parl.* Weitverbreitete Lebensbaum-Zypresse Kaliforniens bis 50 m.	225—250	6.—	54.—	—
	300—350	10.—	90.—	—
» **Alumii** *Hort.* Unstreitig die wertvollste, blaue Säulenform von schmalem, dichtem Wuchs.	40—60	1.50	13.50	—
	60—80	2.—	18.—	—
	175—200	6.—	50.—	—
	200—225	8.—	72.—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	250—300	12.—	110.—	1000.—
» **argenteo-variegata nova** *Hort.* Sehr schön silberbunt, beständig, winterhart.	20—30	2.—	18.—	—
	30—40	3.50	31.50	—
» **Bowleri (pendula)** *Hort.* Form mit zierlich hängenden Zweigspitzen.	150—175	10.—	—	—
» **coerulea** *Hort.* Breit pyramidal, mit blaugrüner Bezweigung.	275—300	12.—	—	—
	300—350	15.—	—	—
» **conica**, siehe Cham. Laws. Wisselii.				
» **darleyensis** *Hort. Angl.* Goldbunte, breitkegelförmige Form.	20—30	2.—	18.—	—
	275—300	15.—	—	—
» **erecta alba** *Kees.* Dichtgeschlossene, schlanke Pflanzen bei gedrungenem Wuchs und schöner, silbriger Belaubung.	150—175	7.—	—	—
	175—200	9.—	80.—	—
	250—275	15.—	—	—
» **erecta filiformis robusta** *Hort. Holl.* Kräftige Säulenform mit schön überhängenden, fadenförmigen Zweigenden.	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
» **erecta viridis** *Hort.* Von schlankem Wuchs und frischem, saftigem Grün.	150—175	5.—	45.—	—
	175—200	6.—	54.—	—
	200—225	8.—	72.—	—
» **filiformis** *Hort.* △ hoch und breit. Zierliche, rundliche Form, mit fadenförmig im Bogen überhängenden Zweigen, frischgrün. Für geschützte Lagen!	70—80	12.—	—	—
» **Fletcheri** *Fletch. & Sons.* Dichte, bläulichgrüne, zierlich federige Säulenform.	30—40	2.—	18.—	—
	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	4.—	36.—	—
» **forsteckensis** *Hort.* △ hoch und breit. Vollkommen dicht, breit kegelförmiger Wuchs.	20—30	3.—	27.—	250.—
	30—40	6.—	54.—	—

Koniferen

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lawsoniana Fraserii *Hort.* Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	175—200	4.—	35.—	320.—
	200—250	6.—	50.—	450.—
» **glauca argentea** *Hort.* Verbesserte „Triomf van Boskoop", jedoch streng pyramidal wachsend. Färbung herrlich blau.	150—175	5.—	—	—
	250—275	10.—	—	—
	275—300	12.—	110.—	—
	300—350	20.—	180.—	—
» **glauca Veitch** *Hort.* Säulenförmig, ausgeprägt stahlblau.	300—325	15.—	—	—
» **intertexta** *Hort.* Mit im Bogen schwer überhängenden Zweigen.	250—275	20.—	—	—
	300—350	25.—	—	—
» **Krameri** *Hort.* △ Breite, dichte Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	80—100	8.—	—	—
	100—125	12.—	—	—
	125—150	15.—	—	—
» **lutea** *Hort* Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung.	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	12.—	—	—
	200—225	15.—	—	—
» **minima glauca** *Hort.* △ . . . . hoch und breit Dicht breitwachsende, dunkelblaugrüne Kugel.	20—30	2.50	22.50	—
	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	4.—	36.—	—
	50—60	6.—	—	—
	60—70	8.—	72.—	—
» **monumentalis nova** *Hort.* Sehr wertvolle, hellblaue Säulenform. Auch als Cham. Laws. erecta glauca im Handel.	250—300	12.—	110.—	—
	300—325	15.—	—	—
» **nana compacta** *Hort.* △ . . . . hoch und breit Schöne und sehr gute Kugelform.	30—40	3.—	—	—
	40—50	4.—	36.—	—
	60—70	8.—	72.—	—
» **Olbrichi** *Hort. Froeb.* Dicht u. feinzweigige Form, blaugrün, v. säulenförmigem Wuchs. Die nadelförm. spitz abstehenden Schuppenblätter bringen eine feine, zierlich federige Verzweigung hervor.	150—175	6.—	—	—
» **patula** *Hort.* Bräunlich dunkelgrüne Form mit feiner Bezweigung und bogig aufgerichteten Trieben.	125—150	6.—	—	—
	175—200	8.—	—	—
	200—225	10.—	—	—
» **pendula vera** *Hesse* Wertvolle Hängeform m. schlaff herabhängenden Zweigen.	100—125	5.—	45.—	—
» **pulcherrima** *Hort.* Lockerzweigige, weiss schimmernde Form.	125—150	8.—	72.—	—
» **pyramidalis alba** *Hort.* Schlanke Form mit weissen Zweigspitzen.	125—150	6.—	—	—
	250—275	15.—	—	—
» **pyramidalis glauca** *Hort.* Schlanke, lebhaft blaugrüne Säulenform.	300—350	15.—	—	—
» **robusta** *Hort.* Widerstandsfähige, dicht säulenförm., dunkelgrüne Form.	250—300	8.—	—	—
» **robusta glauca** *Hort.* Üppig wachsende, breit säulenförmige Pflanze von tiefblaugrüner Färbung.	150—175	10.—	—	—
	175—200	12.—	—	—
» **Rosenthalii** *P. Smith & Cie.* Säulenförmig aufstrebende, saftig hellgrüne, zierlich leichtbezweigte, dekorative Form.	100—125	5.—	—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	250—275	12.—	110.—	—
	300—350	15.—	—	—
» **Schongariana** *Hort. Pfitzer* Aparte, stahlgrün gefärbte Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker gestellten Zweigen.	175—200	10.—	90.—	—
	200—225	12.—	110.—	—
	300—350	18.—	—	—
» **Silver Queen** *Hort.* Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung. Hat sich als besonders winterhart bewährt.	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	8.—	72.—	—
	200—225	10.—	90.—	—
	225—250	12.—	110.—	—
	250—275	15.—	135.—	—
» **Smithi** *Hort.* Wuchs breit, pyramidal, fest geschloss., Nadeln graugrün.	60—80	3.—	27.—	—
	275—300	12.—	110.—	—
» **Stewardtii** *Hort.* Neuere, intensiv gelb gefärbte Form, die aufrechten Wuchs zeigt.	60—80	4.—	36.—	—
	80—100	5.—	45.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	125—150	7.—	63.—	—
	150—175	8.—	—	—
	175—200	10.—	90.—	—
	200—225	12.—	110.—	—
	225—250	15.—	135.—	—
	250—275	18.—	—	—

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lawsoniana Triomf van Boskoop *Hort. Holl.* . . . . . . Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	225—250	8.—	72.—	—
	250—275	10.—	90.—	—
	300—350	20.—	180.—	—
» **versicolor** *J. Coninck* . . . . Zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, besonders winterhart.	100—125	6.—	—	—
	200—225	12.—	110.—	—
» **Westermannii** *Hort.* . . . . Pyramidale, dichte, goldgelb schimmernde Form.	150—175	8.—	—	—
	175—200	10.—	—	—
» **Wisselii** *Hort. Holl.* (Cham. Laws. conica *Beissn.*) . . . Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.	60—80	4.—	—	—
	100—125	7.—	63.—	—
	125—150	9.—	80.—	—
	150—175	12.—	110.—	—
	175—200	15.—	—	—
» **Youngii** *Hort.* . . . . Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung.	200—225	8.—	72.—	—
	250—275	15.—	—	—
	275—300	18.—	160.—	—
	300—325	20.—	—	—
nutkaënsis *Spach.* (Thujopsis borealis *Hort.*) . . . . Zierliche, winterharte Nutka-Zypresse aus dem nordwestlichen Nordamerika. 30 bis 40 m.	40—60	2.50	22.50	—
	100—125	5.—	—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	10.—	90.—	800.—
	200—225	12.—	110.—	—
» **glauca** *Hort.* . . . . Überhängende, ausgeprägt blaugrüne Form.	40—60	4.—	36.—	—
	60—80	5.—	45.—	—
» **glauca aureo-variegata** *Hort.* . . . . Beständig goldbunte Form von blaugrün. Grundton.	60—80	5.—	—	—
» **lutea** *Hort.* . . . . Goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	60—80	6.—	—	—
	100—125	9.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
	225—250	20.—	—	—
» **pendula** *Hort.*, Hänge-Nutka-Zypresse . . . . Prächtige Hängeform mit schwer fahnenartig hängenden Zweigen. Durch starken Fruchtbehang besonders zierend.	50—70	8.—	—	—
obtusa albo-spicata *Hort.* (Retinisp. obt. albo-spic.) △ . . Schöne Spielart der japanischen Feuerzypresse mit weissen Zweigspitzen.	30—40	4.—	36.—	—
	50—60	6.—	54.—	—
	60—70	7.—	63.—	—
	125—150	15.—	—	—
» **aurea** *Hort.* . . . . Form mit beständig goldgelber Färbung.	30—40	3.—	27.—	—
» **aurea gracilis** *Hort.* . . . . Form mit überhängenden, goldig schimmernden Zweigen.	50—60	5.—	—	—
	80—100	8.—	72.—	—
	100—125	10.—	—	—
» **aurea nova** *Hort.* . . . . Form von lockerem, pyramidalem Wuchs mit fast weissen Zweigen mit gelben Trieben. Durch die weisse Innenfärbung gut unterschiedlich von anderen gelben Formen.	15—20	3.—	—	—
» **compacta** *Hort.* . . . . Von dichtrundlich kegelförmigem Wuchs.	50—70	6.—	—	—
	70—80	8.—	—	—
» **Crippsii** *Hort. Angl.* . . . . Zweigfärbung blassgelb oder goldgelb, Wuchs dicht.	20—30	3.—	27.—	—
	50—70	8.—	72.—	—
	100—125	15.—	135.—	—
» **filicoides** *Hort.* △ . . . . Eigentümliche, schwachwüchsige Form, Zweigchen wie Farnwedel.	20—30	4.—	36.—	—
» **lycopodioides** *Carr.* △ . . . . Dunkelgrüne Zwergform mit lycopodiumähnl. Zweigchen.	15—20	2.50	22.50	—
» **lycopodioides aurea** *Beissn.* △ . . . . Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümmter, an üppigen Spitzen monströser Bezweigung v. schön goldiger Färbung.	10—15	3.—	—	—
» **lycopodioides coralliformis** *Beissn.* △ . . . . Interessante Form mit korallenförmig gabeliger Verzweigung.	30—40	5.—	—	—
» **magnifica** *Hort.* . . . . Form mit üppig frischgrün glänzenden Zweigen.	70—90	4.—	36.—	—
	150—175	10.—	—	—
» **Mariesi** *Hort. Angl.* △ . . . . Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.	15—20	3.—	—	—
	30—40	5.—	—	—
» **nana aurea** *Hort.* △ . . . . Fächerförmige Zweige von goldgelber Färbung.	15—20	3.—	27.—	—
	80—100	10.—	—	—
	100—125	15.—	—	—

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
obtusa nana gracilis *Hort.* Δ . . . . . . hoch und breit. Zierliche Zwergkegelform, glänzend dunkelgrün, mit dichten, fächerförmigen, eigentümlich tutenförmig gedrehten Zweigchen.	15—20	4.—	36.—	—
	25—30	6.—	54.—	—
» **tetragona aurea** *Hort. Barron.* Δ . . . . Langsam wachsende, goldgelbe Zwergkegelform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnenkammartigen Zweigen und dicht dachziegelartig gestellten Blättchen, später schlanke Kegel bildend.	15—20	4.—	—	—
pisifera *Sieb. & Zucc.* (Retinispora pisifera *Sieb. & Zucc.*) . . Von schöner, lockerer Bauart, leicht überhängend. Japan, 25—30 m.	300—325	12.—	—	—
» **argenteo-variegata** *Hort.* . . . . Harte, weissbunte Form.	100—125	4.—	—	—
	125—150	5.—	45.—	—
	150—175	6.—	—	—
» **aurea** *Hort.* . . . . Rein goldgelbe Varietät mit der normalen Zweigform der Stammart.	100—125	4.—	—	—
	225—250	10.—	90.—	—
	250—300	12.—	—	—
	300—350	20.—	—	—
» **filifera** *Hort.* . . . . Dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen.	60—80	3.—	27.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	125—150	8.—	72.—	—
	150—175	10.—	90.—	—
	175—200	12.—	—	—
	200—250	15.—	—	—
» **filifera aurea** *Hort.* Δ . . . . hoch und breit. Spielart mit fadenförmiger, goldgelber Bezweigung.	20—30	4.—	—	—
» **filifera nana** *Hesse* Δ . . . . hoch und breit. Grüne, dichtbuschige Zwergform m. fadenförmig Zweigen.	40—50	5.—	45.—	400.—
	50—60	6.—	54.—	—
	70—80	8.—	72.—	—
» **nana aureo-variegata** *Hort.* Δ . . . hoch und breit. Niedrigbleibende, dichte, goldbunte Kugel.	50—60	6.—	—	—
	60—70	8.—	—	—
» **plumosa** *Hort.* (Retinispora plumosa *Veitch*) . . . . Wertvolle, dunkelgrüne, harte, gedrungene Form.	150—175	5.—	45.—	—
	175—200	6.—	54.—	—
	200—250	7.—	—	—
» **plumosa aurea** *Hort.* . . . . Schön goldgelb gefärbt.	100—125	3.—	27.—	—
	125—150	4.—	36.—	320.—
	150—175	5.—	45.—	—
» **plumosa flavescens** *Hort.* Δ . . . . Breite, dichte Kegel mit gelblichweissen Zweigspitzen.	60—80	4.—	36.—	—
	80—100	5.—	45.—	—
» **plumosa nana aurea** *Hort.* Δ . . . . Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform.	20—30	3.—	27.—	—
» **plumosa nana compressa** *Hort.* Δ hoch und breit. Dichtbuschige Zwergform von gelblichgrüner Färbung.	10—15	3.—	25.—	—
	15—20	4.—	35.—	—
» **squarrosa** *Beissn. & Hochst.* . . . . Buschige, pyramidale Pflanzen m. prächtiger, silbergrauer Färbung.	40—60	2.50	22.50	—
	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	4.—	36.—	—
» **squarrosa aurea** *Hort.* . . . . Im Sommer gelb gefärbt, zierlich.	100—125	5.—	45.—	—
» **sulfurea** *Hesse* . . . . Schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.	150—175	7.—	—	—
	175—200	9.—	—	—
sphaeroidea *Spach* (Cupressus thyoides *L.*) . . . . . . Baum mit schlanker Krone, Äste aufrecht, Zweige zierlich, kurz, gedrückt, graugrün, Blättchen dicht dachziegelig, beim Reiben streng riechend, Zäpfchen klein, bläulich. N.-Amerika, bis 25 m.	60—80	4.—	—	—
» **andelyensis** *Carr.* (Ch. thyoides andel. *Schneid.*) . . . . Von pyramidalem, dicht kegelförmigem Wuchs und starkem, zierendem Fruchtbehang.	50—70	4.—	—	—
	100—125	7.—	—	—
» **atrovirens** *Knight* (Ch. thyoides atrovirens *Sudw.*) . . . Tiefdunkelgrüne Form.	30—40	3.—	—	—
	60—80	4.—	—	—
	150—175	8.—	—	—
» **aurea** *Hort.* (Ch. thyoides aurea *Fitschen*) . . . . Zierliche spitze Kegel von ganz goldgelber Färbung.	80—100	5.—	—	—
Cryptomeria — Sicheltanne — Taxodiaceae.				
japonica *Don.* Japanische Sicheltanne . . . . Schöner Baum mit dichtstehenden, pfriemlichen Nadeln von blaugrüner Färbung. Japan. Bis 40 m.	100—125	2.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cryptomeria (Fortsetzung):				
japonica araucarioides *Henk. & Hochst.* (Cr. mucronata *Hort.*) Breit pyramidale Form, erinnert an die Zimmertanne.	80—100	3.—	—	—
» **Bandai sugi** *Hort.* . . . . Form von massigem, ganz unregelmässigem Wuchs, kurztriebig, dicht knäuelig, grobblattrig, bläulichgrün.	10—15	2.50	—	—
» **cristata** *Beissn.* (Cr. monstrosa *Hort.*) . . . . Buschig wachsende, monströse Form.	30—40	2.50	22.50	—
	40—60	3.50	—	—
	60—80	5.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
» **elegans** *Mast.* . . . . Dichtzweigige Jugendform, weichnadelig.	50—70	2.50	22.50	—
» **Jindai sugi** *Hort.* . . . . Form von dicht eiförmigem Wuchs, feinnadelig, frischgrün.	15—20	2.50	—	—
» **selaginoides** *Hort.* (Cr. jap. viminalis *Hort.*) . . . . . . Langzweigig mit anliegenden Nadeln.	40—50	2.50	—	—
Cunninghamia — Spiesstanne — Taxodiaceae.				
sinensis glauca *Hort.* (C. lanceolata glauca *Hort.*) . . . . . An Araucaria erinnernde, blaugrüne Konifere Chinas, bis 15 m.	30—50	3.—	27.—	—
	50—70	4.—	36.—	—
Ephedra — Meerträubel — Ephedraceae.				
fragilis *Desf.* △ . . . . **m. Tb.** Niedrig, sehr feinzweigig, stumpf dunkelgrün. Dalmatien.	20—30	2.50	22.50	—
» **campylopoda** *C. A. Mey.* △ . . . . **m. Tb.** Dunkelgrün, dünnzweigig, überhängend.	15—20	2.50	—	—
Gerardiana *Wall.* △ . . . . **m. Tb.** Dichtzweigig, gerieft, matt bläulichgrün.	15—20	2.50	22.50	—
» **sikkimensis** *Stapf.* △ . . . . **m. Tb.** Straff aufrecht, frischgrün.	30—40	2.50	22.50	—
helvetica *C. A. Mey.* Schweizer Meerträubel △ . . . **m. Tb.** Flache Sträucher, schön grün. Rhone-Tal, 50 cm hoch.	15—20	2.50	—	—
Ginkgo — Fächerblattbaum — Ginkgoaceae.				
biloba *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*) Fächerblattbaum . . . Pyramidaler Baum mit weit ausladenden Ästen. Die lederartigen, in ihrer Form an Adiantum erinnernden Blätter werden im Herbst abgeworfen. China, 30 m.	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	—	—
» **pendula** *Hort.* . . . . Interessante Hängeform.	30—50	4.—	36.—	—
Glyptostrobus, siehe Taxodium.				
Juniperus — Wacholder — Cupressaceae.				
chinensis argenteo-variegata *Hort.* (J. chin. alba *Rehd.*) . Dichte Kegel mit teilweise ganz weissen Zweigspitzen.	30—40	4.—	36.—	—
» **aurea** *Young* . . . . Männl., schlanke Pflanze von schön goldgelber Färbung.	15—20	3.—	—	—
» **Pfitzeriana** *Späth.* △ . . . . Breite Pyramiden mit kräftigen, waagerechten Ästen.	30—40	2.50	22.50	200.—
	40—60	3.50	31.50	—
	60—80	4.50	40.—	—
	80—100	5.50	50.—	—
» **procumbens aurea** *Beissn.* (J. jap. aurea *Carr.*) △ . . . Lang übergebogene Äste, kurze, dichte Zweige, goldgelb gefärbt.	20—30	3.—	27.—	240.—
® **communis arborea candelabriformis** *Kuphaldt* **m. Tb.** Baumwacholder von pyramidalem Kronenaufbau und kandelaberartig hängenden Ästen. **Neuheit!**	30—40	5.—	45.—	—
communis columnaris *Hort.* . . . . **m. Tb.** Pyramidalwachsende Form im Alter baumartig werdend	20—30	2.—	18.—	—
» **compressa** *Carr.* △ . . . . **m. Tb.** Zierliche Säulenzwergform für den Steingarten.	10—15	2.—	18.—	—
	15—20	3.—	27.—	—
» **cracovica** *Gord.* . . . . Aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyramiden. Sehr hart.	30—50	2.50	22.50	—
	50—70	3.—	27.—	—
	70—90	4.—	36.—	320.—
	100—125	6.—	—	—

Juniperus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimeter	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
communis hibernica *Gord.* Irländischer Wacholder . . . Dichte, schmale, blaugrüne Säulenform.	30—40	2.50	22.50	—
	40—60	3.—	27.—	—
	100—125	5.—	—	—
	125—150	7.—	—	—
» **hibernica excelsa pyramidalis** *Hort.* . . . . Von etwas breiterem Wuchs als J. hibernica.	30—40	2.—	18.—	160.—
	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	45.—	400.—
	125—150	7.—	63.—	—
» **nana aureo-spica** *Hort.* △ . . . . Gelbbunte Zwergform.	20—30	4.—	—	—
» **suecica** *Loud.* . . . . Pyramiden-Wacholder mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.	60—80	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	45.—	—
Ⓐ **horizontalis** *Hort. Gibbs.* △ . . . . Zweiglänge 50—70 cm Niedergestreckt, blaugrün.	—	5.—	45.—	—
Ⓐ » **major glauca** *Hort.* **Neu!** . . . Zweiglänge 20—30 cm Form, langästig mit besonders schön blauer Benadelung, auffallende Färbung.	—	5.—	—	—
» **plumosa** *Hort.* . . . . Zweiglänge 30—40 cm Form, breitrund wachsend, mit schön dichtfederiger Belaubung, graugrün.	—	4.—	36.—	—
macrocarpa *Libth.* (J. neaboriensis *Laws.*) . . . . Strauch oder kleiner Baum, Nadeln pinselartig gehäuft, fast 3 cm lang, Beerenzapfen gross, blau bereift. Mittelmeergebiet, bis 4 m.	15—20	2.50	—	—
monosperma *Sarg.* [K] . . . . 15—20 cm breit Im Alter Baum mit ausgebreiteter Krone, Blätter schuppenförmig anliegend, graugün, Beerenzapfen dunkelblau, bereift, Mexiko, bis 15 m.	—	2.50	—	—
procumbens *Sieb.* △ . . . . 20—30 cm breit Niedrig, bläulich, mit nadelförmigen Blättern.	—	2.50	—	—
recurva *Buchan.-Hamilt.* (J. repanda *Hort.*) . . . . Baumartig mit überhängenden Zweigen, schon in der Jugend stark zurückgekrümmt. Nadeln kurz, anliegend, graugrün. Himalaja, bis 10 m.	15—20	3.—	27.—	—
» **densa** *Carr.* (J. squamata *Buchan.-Hamilt.*) △ . . . . . . Dunkelgrüne Zwergform mit kurzen, dichten Zweigen.	20—30	3.—	27.—	—
	50—70	6.—	—	—
Sabina *L.* Gemeiner Sadebaum ☠ . . . . . hoch und breit Schöner, d.-grün. Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet. Bis 4,5 m.	30—40	2.50	22.50	—
» **prostrata** *Loud.* . . . . Zweiglänge 20—25 cm Bildet einen dicht dem Boden aufliegenden, weithin kriechenden, langästigen Strauch mit sehr zahlreichen, dichtstehenden Zweigen.	—	4.—	—	—
» **repens** *Hort.* △ . . . . Zweiglänge 30—40 cm Langästige, dem Boden sich anschmiegende Form.	—	4.—	36.—	—
» **tamariscifolia** *Ait.* △ . . . . 15—20 cm breit Bläulichgrüne, breitgehende Form.	—	3.—	27.—	—
20—30 cm breit	—	4.—	36.—	—
squamata Meyeri *Rehd.* △ . . . . Niedrige, stark weissblaue Form.	20—30	4.—	36.—	—
	30—40	5.—	45.—	—
» **Wilsonii** *Rehd.* . . . . Aufrechter, dichter Strauch.	20—30	3.—	27.—	—
	30—40	5.—	—	—
virginiana fastigiata *Hort.* Virginischer Säulenwacholder Schlankpyramidale, frischgrüne Form.	20—30	3.—	—	—
	40—60	4.—	—	—
» **glauca** *Knight.* (J. glauca *Willd.*). ☠ . . . . Üppig wachsende Form, prächtig blaugrün.	60—80	5.—	—	—
	80—100	6.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
	400—450	80.—	—	—
» **Kosteriana** *Hort.* . . . . Hübsche, niedrigbleibende Form mit schirmförmig abstehenden Ästen und sehr zierlich schuppiger Benadelung	20—30	3.—	27.—	—
» **nana compacta** *Hort.* . . . . Schöne Kugelform von blaugrüner, schuppiger und nadeliger Belaubung.	10—15	3.—	27.—	—
» **pseudocupressus** *Hort.* . . . . Von schlankem, säulenförmigem Wuchs, mit aufstrebenden Ästen und grau- bis blaugrüner Färbung.	60—80	4.—	—	—
	80—100	5.—	—	—
	100—125	6.—	—	—
	125—150	8.—	72.—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Juniperus (Fortsetzung):				
virginiana pyramidalis *Hort.* Dichtbezweigte, nadelblättrige Säulenform. Im Landschaftsbild der italienischen Zypresse täuschend ähnlich.	30—40	4.—	36.—	—
	40—50	5.—	—	—
	60—80	6.—	—	—
	100—125	10.—	—	—
» **Schottii** *Hort.* Pyramidal buschige Form, welche sich durch schönes, frisches Grün auszeichnet.	60—80	5.—	—	—
	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	10.—	—	—
Larix — Lärche — Pinaceae				
leptolepis pendula *Hort.*	40—60	4.50	—	—
Halbstämmchen, Stammhöhe 100—120 cm. Seltene Form der japanischen Lärche mit streng nach unten gerichteten Ästen und Zweigen.	—	6.—	—	—
Libocedrus — Flusszeder — Cupressaceae				
decurrens *Torr.* Kalifornische Flusszeder, Weihrauchzeder. Schlank, säulen- bis kegelförmiger Baum Kaliforniens mit abstehenden, kurzen Ästen. Die feine Bezweigung ist frischgrün. 45 m.	175—200	7.—	63.—	—
	200—250	9.—	80.—	—
	250—300	10.—	—	—
» **columnaris** *Hort.* Säulenform mit kurz., dichtsteh. Ästen, langsam wachsend	15—25	3.—	—	—
» **compacta** *Hort.* △ Ganz gedrungene, dichtwachsende Form v. rundl. Wuchs	15—25	3.—	—	—
Picea — Fichte, Rottanne — Pinaceae				
ajanensis *Fisch.* Ajanfichte ℨ Im Wuchs der P. excelsa ähnlich, jedoch zierlicher. Nadeln unterseits auffallend blauweiss bereift. Sibirien, Amur, Japan, bis 50 m.	200—250	10.—	—	—
	250—300	15.—	—	—
	300—350	18.—	—	—
	350—400	20.—	—	—
ajanensis aurea, siehe P. jezoënsis aurea.				
alba Albertiana conica *Hort.* (P. canadensis conica *Beissn*). △ Zwergige, langsam wachsende Form, bildet hellgrüne spitze Pyramiden, Zweige dicht, Nadeln sehr weich.	15—20	2.50	22.50	—
	30—40	5.—	—	—
Alcockiana *Carr.*, Alcocks Fichte ℨ Durch dicke, kant. Nadeln u. minder schlanken Wuchs von P. ajanensis zu trennen. Frosthart, treibt spät. Zentral-Japan, 30—40 m.	80—100	4.—	—	—
	100—125	5.—	—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	7.—	—	—
	200—225	9.—	—	—
⊛ **asperata** *Mast.* Vierkantnadelige Fichte von Nordwest-Szech-uan. Von regelmäss. Wuchs und bläulichgrauer Benadelung. 35 m.	40—60	2.50	22.50	—
	60—80	3.—	27.—	—
	100—125	5.—	—	—
	125—150	6.—	—	—
	150—200	8.—	—	—
⊛ » **glauca** *Hort.* Besonders auffallend blaue Form.	40—60	3.—	—	—
	60—80	4.—	—	—
⊛ » **notabilis** *Rehd. & Wils.* Langnadelige Form.	150—175	7.—	—	—
⊛ » **ponderosa** *Rehd. & Wils.* Rinde grau, Zweige fast glatt und gelb.	100—125	6.—	—	—
	275—300	15.—	—	—
⊛ **brachytyla** *Pritz.* Wuchs pyramidal, Äste horizontal, Zweige hängend, Nadeln unterseits auffallend weiss. China, 10—25 m.	60—80	8.—	—	—
⊛ **Breweriana** *Wats.* Brewers Fichte. Dekorative Fichte Nord-Kaliforniens. Seitentriebe dünn, schlaff senkrecht herabhängend. Dunkelblaugrüne Benadelung. Sehr hart. 30—50 m.	60—80	6.—	54.—	—
	80—100	7.—	—	—
	100—125	10.—	90.—	—
	125—150	12.—	110.—	—
Engelmannii *Engelm.* ℨ Sehr widerstandsfähige, bläulichgrüne Fichte Nordamerikas, 20—50 m.	100—125	10.—	—	—
excelsa acrocona *Fries* Form der heimischen Rotfichte mit schon in der Jugend starker Zapfenbildung.	30—40	3.—	27.—	250.—
	50—70	5.—	45.—	—
» **alpestris** *Brügg.* Alpenfichte. Wuchs gedrungen, derbe, bläulich bereifte Nadeln.	200—250	8.—	—	—
	250—275	10.—	—	—
	300—350	12.—	—	—
⊛ » **argenteo-spicata** *Hesse* Sehr schöne Form mit weissen Triebspitzen, besonders beim Austreiben wirkungsvoll.	300—350	8.—	72.—	—

Koniferen

Picea (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
excelsa aurea *Carr.*	300—350	8.—	—	—
Form mit schöner, goldgelber Zweigfärbung.	350—400	10.—	—	—
» **Clanbrassiliana** *Carr.* △	20—30	5.—	45.—	—
Rundliche oder kegelförmige, gedrungene, sehr kurz und dichtbezweigte Zwergform.	40—50	7.—	—	—
» **compacta** *Hort.* △	60—70	4.—	36.—	—
Zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchs.	70—80	5.—	45.—	—
	90—100	6.—	—	—
	100—125	7.—	63.—	—
	125—150	8.—	72.—	—
» **Cranstonii** *Carr.* (P. exc. Dicksoni *Hort.*)	175—200	8.—	—	—
Höchst eigentümliche Form, nur aufrechter Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen.	250—300	10.—	—	—
» **cupressina** *Thomas.* Zypressenfichte	60—80	3.—	—	—
In der Tracht einer geschlossenen, etwas breiten Säulenzypresse ähnlich, wirkt in der Landschaft wie eine breite Pyramidenpappel.	150—175	6.—	—	—
» **echiniformis** *Hort.* Igelfichte △	10—15	2.50	22.50	200.—
Kissenartige, igelförmig benadelte Zwergform.	15—20	3.—	27.—	—
» **eremita** *Carr.*	175—200	6.—	—	—
Üppige, schmale Pyramide.	200—250	7.—	—	—
» **finedonensis** *Hort.*	80—100	4.—	—	—
Interessante, bunte Form, junge Triebe blassgelb, später wie bronziert erscheinend.	250—300	8.—	—	—
» **Gregoryana** *Hort.* △	15—20	2.50	22.50	—
Kurznadelige, dichte, rundliche Zwergform.	20—30	3.—	27.—	—
» **inversa** *Hort.*	30—40	3.—	27.—	—
Äste und Zweige stark hängend.	40—60	4.—	36.—	—
» **Mariae-Orffii** *Hort.* △	8—12	3.—	—	—
Hexenbesenartige, frischgrüne Kugel.				
» **Maxwellii** *Hort.* △	20—30	2.50	22.50	—
Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner	30—40	3.—	27.—	—
Benadelung. Zwergform . . . . hoch und breit	40—50	4.—	36.—	—
	50—60	5.—	—	—
	80—90	8.—	—	—
	90—100	10.—	90.—	—
	100—125	12.—	—	—
» **Merki** *Hort.* △ . . . . . hoch und breit	20—30	4.—	36.—	—
Dicht und breitwachsende Zwergform.	30—40	5.—	45.—	—
» **nidiformis** *Beissn.* △ . . . . . hoch und breit	30—40	3.—	27.—	240.—
Kissenbildende Form mit kurzen, fächer- 60—70 cm breit	30—40	4.50	40.—	—
förmigen, hellgrün. Zweigen, die waage- 70—80 » »	40—50	5.—	45.—	400.—
recht übereinander stehen. 80—100 » »	40—50	6.—	54.—	500.—
» **Ohlendorffii**, siehe P. exc. pygmaea.				
» **parviformis** *Hort.* △	30—40	3.—	—	—
Ganz gedrungene, breitpyramidale Zwergform.	100—125	8.—	—	—
	125—150	10.—	90.—	—
	150—175	12.—	—	—
» **procumbens** *Carr.* △ . . . . . 30—40 cm breit	—	3.50	31.50	—
Dem Boden aufliegende Zwergform. 40—50 » »	—	4.50	40.—	360.—
» **pumila glauca** *Beissn.* △ . . . . hoch und breit	30—40	3.—	27.—	250.—
Plattrunde Zwergform. » » »	40—50	4.—	36.—	—
60—70 cm breit	30—40	6.—	54.—	—
60—70 » »	60—70	8.—	—	—
» **pygmaea** *Carr.* △ . . . . . hoch und breit	30—40	3.—	27.—	—
Dichte, kegelförmige, hellgrüne Pflanzen. Auch als P. exc.	60—80	5.—	45.—	—
Ohlendorffii im Handel.	80—90	6.—	—	—
	100—125	8.—	—	—
» **Remontii** *Hort.* △	40—50	4.—	—	—
Sehr empfehlenswerte Zwergform von besonders regelmässigem, spitzkegelförmigem Bau.	50—60	5.—	45.—	—
	60—70	6.—	54.—	—
	70—80	7.—	63.—	—
	80—90	8.—	72.—	—
	90—100	10.—	—	—
	100—125	15.—	—	—
» **viminalis** *Casp.* Schwedische Hängefichte	40—60	3.—	—	—
Hauptäste waagerecht, Nebenäste senkr. herabhängend.	100—125	6.—	54.—	—
» **virgata** *Casp.* Schlangenfichte	50—70	3.—	27.—	—
Langwaagerechte, sehr gering bezweigte Äste.	100—125	5.—	45.—	—
	175—200	8.—	72.—	—
	200—250	10.—	—	—

Picea (Fortsetzung):	Höhe in Zentimeter	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Glehnii *Mast.* Glehn's Fichte. Echt! Kurznadlige, graugrüne Fichte. Der P. obovata nahestehende Art der Insel Sachalin. Bis 40 m.	60—80	5.—	—	—
	80—100	6.—	—	—
	100—125	7.—	—	—
	125—150	8.—	—	—
jezoënsis aurea *Hort.* (P. ajanensis aurea *P. Smith*) Goldgelb schimmernde Form, ergibt mit der weissen Blattunterseite zusammen eine auffallende Färbung.	15—20	3.—	27.—	—
⊛ **likiangensis** *Pritz.* Likiang-Fichte. Baum Westchinas. Triebe hellgelbgrau, spärlich behaart. Nadeln scharf, 15—30 m.	100—125	5.—	—	—
	150—175	6.—	54.—	—
	200—225	10.—	—	—
	250—275	12.—	—	—
	300—350	15.—	—	—
⊛ **montigena** *Mast.* Chinesische Fichte mit langen, waagerechten Zweigen und reicher Zapfenbildung. Bis 30 m.	150—175	8.—	—	—
⊛ **morindoides** *Rehd.* (P. spinulosa *Henry*) Interessanter Baum von dunkelgraugrünem Äusseren, langen Trieben, Nadeln ziemlich lang, dünn, rund um den Zweig gestellt, nadelspitz. Himalaja, bis 60 m.	30—40	5.—	—	—
nigra Mariana *Hort.* (P. mariana Beissneriana *Rehd.*) Dichtverzweigte Kegelform der nordamerikanischen Schwarzfichte mit blaugrüner Benadelung. Kleinnadelige Form, sehr zierende, breitpyramid. Einzelpflanzen bildend.	100—125	5.—	—	—
	175—200	9.—	—	—
	200—225	12.—	110.—	—
	250—275	18.—	—	—
» **pumila glauca** *Hort.* Δ Dichte, blaue, kurznadlige Zwergform.	15—20	4.—	36.—	—
Omorica *Purk.* Omorikafichte, serbische Fichte ♀. Stattlicher, schmal pyramidaler, fast säulenförmiger Baum des Balkans. Benadelung tiefdunkelgrün mit weisser Unterseite. Sehr anspruchslose Fichte für feuchte Böden, auch noch für geringwertigen Moorboden. 30 m.	125—150	4.50	40.—	380.—
	150—175	5.50	50.—	450.—
	175—200	7.—	63.—	560.—
	200—250	9.—	80.—	700.—
	250—300	12.—	110.—	—
	300—350	14.—	125.—	—
	350—400	18.—	160.—	—
» **pendula** *Hort.* Schön hängende Form, sonst mit denselben Eigenschaften wie die Art.	125—150	5.—	—	—
	150—175	7.—	—	—
	175—200	8.—	—	—
	200—225	10.—	—	—
	225—250	12.—	—	—
orientalis *Lk.* Morgenländische oder Sapindus-Fichte. Dichter, kegelförmiger Baum des Taurus und Kaukasus, Benadelung klein, glänzend dunkelgrün. Kann viel Druck vertragen. 40—60 m.	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	7.—	—	—
⊛ » **aureo-spicata** *Hesse* Wirkungsvolle Form mit goldgelb gefärbten, jungen Trieben. Später dunkelgrün werdend.	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	10.—	—	—
	200—250	12.—	110.—	—
» **gracilis compacta** *Hort.* Δ Zierliche, pyramidale Zwergform.	20—30	3.—	27.—	—
	30—40	3.50	31.50	—
	40—50	5.—	45.—	—
	50—70	6.—	54.—	—
	70—80	8.—	—	—
» **nutans** *Niemetz* Schöne Form mit elegant überhängenden Zweigen.	150—175	6.—	54.—	—
	200—225	8.—	—	—
polita *Carr.* Stachel-, Rosen- od. Tigerschwanz-Fichte. Dunkelgrüne, dolchartig spitze Nadeln, spät austreibend. Sicher gegen Wildverbiss. Japan, 20—40 m.	60—80	4.—	—	—
	80—100	5.—	—	—
	150—175	10.—	—	—
pungens glauca pendula *Hort.* Schön silberweiss gefärbt, hängende Form der Stech- oder Blaufichte.	60—80	6.—	—	—
	80—100	8.—	72.—	—
» **Kosteri** *Hort.* Prächtig graublau gefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs. Die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln.	60—70	6.—	54.—	480.—
	70—80	7.—	63.—	560.—
	80—90	8.—	63.—	600.—
	90—100	10.—	90.—	800.—
	100—125	12.—	110.—	—
	125—150	15.—	—	—
	225—250	30.—	—	—
purpurea *Mast.* Purpur-Fichte. Baum mit jung orangegelben Zweigen, Knospen kegelförmig, spitz, dunkelbraun, Nadeln oben anliegend, nach vorn gerichtet, seitlich waagerecht abstehend, auf der Zweigunterseite gescheitelt, graugrün, vierkantig. W.-China, bis 20 m.	15—20	3.—	—	—
	60—80	12.—	—	—

Koniferen

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Picea (Fortsetzung):				
Schrenkiana *F. & M.* (P. thianschanica *Rupr.*) . . . . . Zierende Fichte Zentral-Asiens, Äste und Zweige überhängend, bis 35 m.	60—80	5.—	—	—
Watsoniana *Mast.* (P. Wilsonii *Mast.*) . . . . Im Aussehen wie P. Schrenkiana. Mit ihren schlanken Zweigen und den feinen, dunkelgrünen Nadeln sehr wertvolle, harte Fichte. Zentral- und Westchina, bis 25 m.	60—80	3.—	—	—
	80—100	4.—	36.—	—
	100—125	5.—	—	—
	125—150	6.—	—	—
	250—300	9.—	—	—
	300—350	10.—	—	—
Pinus — Kiefer, Föhre — Pinaceae				
aristata *Engelm.* Fuchsschwanzkiefer, Grannenkiefer . . . . Langsam wachsend, von gedrungenem Bau, 5nadelig, stets mit weissen Harzkörnern besetzt.	40—60	5.—	45.—	—
Armandii *Franch.* Armands Kiefer . . . . Fünfnadelige Kiefer Chinas, mit dunkelgelber, glatter Rinde, dunkelgrünen älteren und hellsaftiggrünen jungen Blättern. Bis 20 m.	150—175	7.—	63.—	—
	175—200	8.—	—	—
	250—300	12.—	110.—	—
cembra *L.* Zürbelkiefer, Arve ♀ . . . . Fünfnadelig, mit blauweissen Längslinien. Besonders schöne, heimische Kiefer von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs. 10—25 m.	30—40	3.—	27.—	—
	40—60	3.50	31.50	—
	60—80	4.50	40.—	—
	80—100	6 —	54.—	—
	100—125	8.—	72.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
» **nana** *Hort.* △ . . . . Niedrige Zwergkiefer.	15—20	5.—	—	—
densiflora pumila *Hort.* △ . . . . Zwergform der dichtblütigen Rotkiefer Zentral-Japans. Kugelige Büsche, zweinadelig, lebhaft grün.	90—100	7.—	—	—
excelsa *Wall.* Tränenkiefer . . . . Baum mit pyramidaler Krone, aschgrauer, glatter Rinde, Äste quirlständig, Blätter zu 5, lang, dünn, grün mit bläulichweißen Längslinien. Himalaja, 20—50 m.	30—40	3.—	27.—	—
flexilis *James.* Nevada-Zürbelkiefer . . . . Langsam wachsend, widerstandsfähig. Blätter zu 5. Amerika, 10—25 m.	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	4.—	—	—
	100—125	6.—	—	—
funebris *Komar.* . . . . Nadeln zu 2, 5—10 cm lang, frischgrün. China, bis 25 m.	30—40	4.—	36.—	—
Jeffreyi *Murr.* . . . . Baum mit rundl. Krone, Äste stark ausgebreitet, Blätter zu fünf, blaugrün steif, 12—20 cm lang, dünn. Kalifornien, bis 60 m.	20—30	2.—	18.—	—
koraiensis *Sieb. & Zucc.* Korea-Kiefer . . . . P. Cembra ähnliche, sehr langsam wachsende Art. 20—30 m.	30—40	3.—	—	—
	100—125	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	—	—
	200—250	12.—	—	—
leucodermis *Ant.* (P. Heldreichi leucod. *Markgr.*) Echt! . Schlangenhautkiefer, zweinadelig, starr, dunkelgrün. Wuchtig wirkender, schön pyramidaler Baum Dalmatiens, 25 m.	30—40	3.—	25.—	200.—
	40—50	4.—	35.—	300.—
maritima Hamiltonii *Hort.* (P. Pinaster Hamiltonii *Parl.*) . Sehr hoher, starkästiger Baum, mit geradem, starkem Stamm. Nadeln zu zwei, sehr stark gerinnt, 18—25 cm lang, dunkelgrün.	80—100	5.—	45.—	—
	125—150	8.—	—	—
	250—275	15.—	—	—
montana *Mill.* Bergkiefer, Krummholzkiefer . . . . Strauchartig, Blätter zu zweien, stumpfspitz. dick, starr, 2—5 cm lang. Zweige regelmässig quirlig, Knospen stark verharzt. Gebirge Europas, bis 10 m.	30—40	2.50	20.—	180.—
	40—50	3.—	25.—	200.—
Montezumae *Lamb.* . . . . **m. Tb.** Baum mit sehr langen Nadeln, bläulichgrün, meist zu 5, hängend oder ausgebr. Nadelscheiden bleibend. Mexiko, bis 20 m.	10—15	6.—	—	—
monticola *Dougl.* Westamerik. Weymouthskiefer . . . . . Schlank, fünfnadelig, grün, blauweisse Längslinien. 20—50 m.	60—80	4.—	36.—	—
parviflora compacta *Hort.* △ . . . . Form der Mädchenkiefer, von dichtem, niedrigem Wuchs und kürzeren Nadeln als die Art.	15—20	5.—	—	—
Peuce *Gris.* Rumelische Weymouthskiefer . . . . Ganz harte, langsam wachsende Kiefer, von gedrängtem, spitzpyramidalem Wuchs. Blätter zu 5. Balkan, 10—20 m.	40—60	3.—	27.—	250.—
	60—80	4.—	36.—	—
	80—100	5.—	—	—
ponderosa *Dougl.* Goldkiefer . . . . Schwerholzige Art mit stark abstehenden Ästen, überhängend. Blätter zu dreien, (2—5), steif, aufrecht, dunkelgrün. Kalifornien, bis 50 m.	30—40	2.50	22.50	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pinus (Fortsetzung):				
◎ **pumila** *Rgl.* Zwerg- oder Kriechkiefer △ . . . . . **Echt!** Sehr seltene, sibirische Kriechkiefer, 5nadelig.	10—15	4.—	—	—
resinosa *Ait.* Amerikanische Rotkiefer	15—20	5.—	—	—
Breitkroniger Baum mit langen Nadeln zu zweien, junge Zweige kräft., orangefarb. Zapfen endständig. Amerika, bis 20 m.	30—40	8.—	—	—
◎ **Schwerini** *Fitschen* . . . . Interessante Hybride P. excelsa×Strobus, an P. excelsa erinnernd, Nadeln dünn 8—10 cm lang, schlaff, hängend, rauh an den Rändern, bläulichweiss.	20—30	3.—	27.—	—
silvestris Watereriana *Hort.* Silberkegelkiefer △	15—20	3.—	27.—	—
Dichte, rundliche Form mit kurzen, stahlblauen Blättern.	20—30	4.—	36.—	—
	30—40	5.—	45.—	—
strobus nivea *Carr.* Silberweisse Weymouthskiefer . . . . Die 5teiligen Blätter erscheinen oft silberweiss.	150—175	8.—	72.—	—
tabulaeformis *Hort.* (P. sinensis *Mayr.*) . . . . Chinesische Kiefer, Nadeln zu 2 oder 3, 10—15 cm lang, grün mit leicht grauem Hauch, reife Zapfen gelblich. Sehr harzreiches, dauerhaftes Nutzholz. Bis 25 m.	30—40	5.—	5.—	—
Podocarpus - Steineibe, Fussfrucht - Podocarpaceae				
koraiana, siehe Cephalotaxus drupacea fastigiata.				
Pseudolarix — Goldlärche — Pinaceae				
Kaempferi *Gord.* Goldlärche	20—30	2.50	22.50	—
Pyramidaler Baum Chinas mit hellgrünen Blattquirlen, Nadeln im Herbst abwerfend. 35—40 m.	30—40	4.—	36.—	—
Pseudotsuga — Douglastanne — Pinaceae				
Douglasi *Carr.* (Ps. taxifolia *Britt.*) Douglastanne . . . . . Schöne, überaus schnellwüchsige Konifere von hohem Nutzwert. Amerika, 60—100 m.	175—200	5.—	45.—	—
» **caesia** *Schwer.* (Ps. glauca caesia *Fitschen.*) . . . . Graublaue, wüchsige Form.	400—450	12.—	—	—
» **glauca** *Mayr.* . . . . Form mit prächtig blaugrüner Benadelung, besonders beim Austrieb auffallend. Widerstandsfähig.	80—100	4.—	36.—	—
» **glauca pendula** *Rüpp.* (Ps. glauca pendula *Fitschen*) . .	40—60	3.—	—	—
Stark herabhängende, blaugefärbte Form.	60—80	4.—	36.—	—
» **glauca pyramidalis** *Hort.*	80—100	4.—	36.—	—
Blaue, pyramidal wachsende, wertvolle Form.	100—125	5.—	45.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	8.—	—	—
» **pyramidalis brevifolia** *Hort.*	100—125	6.—	—	—
Kurznadlig, hellgrün, sehr interessante Erscheinung.	150—175	8.—	72.—	—
» **viridis** *Hort.* . . . . Sehr üppige, dunkelgrüne Standortsform.	60—80	2.50	22.50	—
Retinispora, siehe Chamaecyparis.				
Salisburia, siehe Ginkgo.				
Sequoia — Sequoie — Taxodiaceae				
gigantea *Dec.* Mammutbaum. Wellingtonie . . . . . **m. Tb.** {	20—30	6.—	—	—
Bildet regelmässige, spitze Pyramiden. Triebe dunkelblaugrün	30—40	8.—	—	—
bis braunrot. Kalifornien, 80—100 m.	60—80	15.—	—	—
sempervirens *Endl.* Eiben-Zypresse, Küsten-Sequoie . . . . Baum mit schlank pyramidaler Krone und quirligen Ästen. Blätter lederartig, flach, zweireihig, oberseits dunkelgrün, unterseits mit zwei weissen Linien. W.-Amerika, bis 60 m.	40—60	8.—	—	—
Taxodium — Sumpfzypresse — Taxodiaceae				
distichum *Rich.* Sumpfzypresse	60—80	3.—	—	—
Schön pyramidal wachsend, herrlich frischgrün. Wirft die Nadeln im Herbst ab. Nordamerika, 30—50 m.	175—200	6.—	—	—
» **pendulum novum** *P. Smith.* . . . . Elegante Hängeform mit nur normal zweizeilig. Blättern.	30—40	6.—	—	—
japonicum heterophyllum *Brongn.* (Glyptostrobus heterophyllus *Endl.*) . . . . Strauchartig mit abstehenden Ästen, dunkelgrün. China.	20—30	6.—	—	—

Koniferen

Taxus — Eibe — Taxaceae.	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
baccata *L.* Gemeine Eibe	30—40	1.20	11.—	100.—
Eins der wertvollsten heimischen Nadelhölzer, eignet sich	40—50	1.75	15.—	120.—
besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken. 12—20 m.	50—60	2.—	18.—	150.—
	60—70	2.50	22.50	180.—
	70—80	3.—	25.—	200.—
	80—90	3.50	30.—	250.—
	90—100	4.50	40.—	350.—
	100—125	5.50	50.—	450.—
	125—150	6.50	60.—	550.—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	10.—	90.—	—
	200—225	12.—	110.—	1000.—
	225—250	18.—	160.—	1500.—
ungeschnittene, breite Büsche	150—175	10.—	90.—	—
» » »	175—200	14.—	120.—	—
» **adpressa** *Carr.* Bildet breite, niedrige und unregelmässige Büsche mit dichter Verzweigung, Blätter bis 8 mm lang und 4 mm breit, glänzend dunkelgrün.	100—125	8.—	—	—
» **adpressa stricta** *Hort.*	60—80	5.—	—	—
Schnellwachs. Form mit aufstrebendem Mitteltrieb.	100—125	8.—	—	—
» **adpressa variegata** *Hort.* △	20—30	3.—	—	—
Belaubung goldgelb mit grünen Streifen.	60—70	6.—	—	—
» **aureo-variegata** *Hort.* Auffallend schöne, goldbunte Form.	60—70	6.—	—	—
» **conica** *Hort.*	20—30	2.—	18.—	—
Schmal pyramidal wachsende Form.	100—125	6.—	—	—
	125—150	8.—	—	—
» **Davisi** *Hort.*	20—30	2.—	18.—	—
Schlank pyramidal, blaugrün.	125—150	8.—	—	—
» **Dovastoni aureo-variegata** *Hort.* △	20—30	2.50	—	—
Goldbunte Form mit überhängenden Seitenästen.	30—40	3.—	27.—	—
» **erecta** *Loud.*	80—90	5.—	—	—
Wuchs schlank, Bezweigung fein, dunkelgrün.	100—125	7.—	63.—	—
	125—150	8.—	72.—	—
» **erecta aureo-variegata** *Hort.*	20—30	2.—	18.—	—
Zierliche, hellgelb-bunte Spielart.	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	4.—	—	—
	60—70	6.—	54.—	—
	70—80	7.—	63.—	—
	80—90	8.—	72.—	—
	90—100	9.—	80.—	—
	100—125	10.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
	150—175	15.—	—	—
» **ericoides** *Carr.* △ Schwachwüchs. Zwergform m. schmalen, sehr spitz. Nadeln.	20—30	3.—	27.—	240.—
» **fastigiata** *Loud.* (T. bacc. hibernica *Hort.*)	20—30	1.75	15.—	125.—
Irländischer oder Säuleneibenbaum.	30—40	2.—	18.—	150.—
Wertvolle, dunkelgrüne, steife Säulen-	40—50	2.50	22.50	200.—
form, welche Empfehlung verdient.	50—60	3.—	27.—	250.—
	60—70	3.50	30.—	280.—
	70—80	4.—	35.—	300.—
Echt!	80—90	5,—	40.—	350.—
	90—100	6.—	55.—	480.—
	100—125	7.—	63.—	560.—
	125—150	10.—	90.—	—
	150—175	15.—	135.—	—
	175—200	18.—	—	—
	30—40	1.50	13.50	—
	40—50	1.75	15.—	—
	70—80	3.50	30.—	—
	80—90	4.—	35.—	—
Aus Samen	90—100	5.—	45.—	—
gezogen!	100—125	6.—	55.—	—
	125—150	8.—	—	—
	150—175	10.—	90.—	—
	175—200	12.—	—	—
	200—225	15.—	135.—	—
» **fastigiata aurea** *Stand.* △	20—30	2.50	22.50	—
Fast rein goldgelb.	30—40	3.50	—	—
	70—80	10.—	—	—

Taxus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
baccata fastigiata aureo-variegata *Hort.*	40—50	3.—	—	—
Sehr schön goldbunt.	50—60	3.50	31.50	—
	60—70	4.—	—	—
	70—80	5.—	45.—	—
	80—90	6.—	54.—	—
	90—100	8.—	72.—	—
	100—125	10.—	90.—	—
» **fructu luteo** *Hort.*	40—50	4.—	—	—
Sehr zierende, gelbfrüchtige Form.	50—60	5.—	—	—
	90—100	7.—	—	—
» **glauca** *Carr.*	30—40	3.—	27.—	—
Üppige Form mit dunkelblaugrüner Färbung.	125—150	8.—	—	—
» **gracilis pendula** *Hort.* Nadeln dicht, breit, Gipfeltrieb aufstrebend, Äste quirlständig und leicht überhängend.	20—30	3.—	—	—
» **Hessei** *Hesse.* **Neu!**	30—40	1.20	11.—	100.—
Überaus üppig, straff aufrecht wachsende neue	40—50	1.75	15.—	120.—
Form von konstant dunkelgrüner Färbung. Die	50—60	2.—	18.—	150.—
Blätter sind auffallend breit und lang, was den	60—70	2.50	22.50	200.—
Pflanzen einen ganz besonders robusten Charakter	70—80	3.—	25.—	220.—
verleiht, somit nahezu an Cephalotaxus erinnernd.	80—90	4.—	35.—	300.—
Behält auch im Winter die dunkelgrüne Färbung.	90—100	5.—	45.—	400.—
	100—125	6.—	54.—	500.—
	125—150	6.50	60.—	—
	150—175	10.—	—	—
» **horizontalis** *Knight* Form mit auffallend ausgebreiteten, weitgestellten Ästen.	20—30	3.—	—	—
» **imperialis** *Hort.*	20—30	2.—	18.—	—
Schlank aufstrebende, lebhaftgrüne Form.	90—100	6.—	—	—
	100—125	7.—	—	—
	125—150	10.—	—	—
» **Jacksonii** *Gord.*	30—40	2.—	18.—	160.—
Straff pyramidal, Spitzen übergebogen, hellgrün.	50—60	3.—	27.—	—
	60—70	3.50	31.50	—
	90—100	7.—	63.—	—
	125—150	10.—	90.—	—
	150—175	12.—	110.—	1000.—
» **nana** *Knight.*	20—30	2.—	18.—	—
Dunkelgrüne, breite, dichtgedrungene Pyramiden.	50—60	3.—	—	—
	60—70	3.50	—	—
	70—80	4.—	36.—	—
	80—90	5.—	45.—	—
	90—100	7.—	63.—	—
» **Nedpath Castle** *Hort.*	30—40	2.50	22.50	—
Breit säulenförmig, Benadelung blaugrün.	90—100	7.—	63.—	—
	100—125	8.—	72.—	—
» **procumbens** *Loud.* △ Zweiglänge 15—20 cm Niederliegende, stumpfgrüne Form.	—	5.—	45.—	—
» **pumila aurea** *Hort. Gibbs.* △ Zwergform von niederliegendem Wuchs, Blätter sehr leuchtend gelb.	10—15	5.—	—	—
» **pyramidalis** *Carr.*	90—100	6.—	54.—	—
Üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale,	100—125	6.50	60.—	—
dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form. **Für Hecken und blockartige Flächengestaltung vorzüglich geeignet.** — **Echt!**	125—150	8.—	72.—	—
	150—175	12.—	110.—	—
Aus Samen gezogen!	60—70	2.50	22.50	—
	70—80	3.—	25.—	—
	80—90	3.50	30.—	—
	90—100	4.50	40.—	—
	100—125	5.50	50.—	—
	125—150	6.50	60.—	—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	10.—	90.—	—
	200—225	12.—	110.—	—
	225—250	18.—	160.—	—
» **pyramidalis Overeynderi** *Hort.*	30—40	1.75	15.—	125.—
Sehr wertvolle breite, dunkelgrüne Pyramidenform. **Für besonders breite Hecken!**	40—50	2.—	18.—	150.—
	50—60	2.50	22.50	200.—
	60—70	3.—	27.—	250.—
	70—80	3.50	30.—	—
	90—100	5.—	45.—	400.—
	100—125	6.—	54.—	500.—
	125—150	6.50	60.—	550.—

Taxus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	10[illegible] Stück M. Pf.
baccata repanda *Pars.* (T. bacc. repandens *Hort.*) △ . . . . Zwergform von ausgebreitetem Wuchs.	30—40	5.—	45.—	—
	40—50	8.—	—	—
» **Washingtonii** *Hort.* (T. canadensis Washingtoni *Hort.*) Von gedrungenem, rundlichem Wuchs, im Sommer grüngelb, im Winter goldbronzen.	20—30	2.50	22.50	—
brevifolia, siehe T. cuspidata nana.				
canadensis *Marsh.* △ . . . . Spitze, hellgrüne Benadelung, dichtgestellt, im Winter fuchsrot. Meist niederliegender Strauch Kanadas.	15—20	2.50	—	—
	60—70	6.—	—	—
cuspidata *Sieb. & Zucc.* . . . . Echte Art Japans mit aufstrebenden bis ausgebreiteten Ästen und von gedrungenem Wuchs. Einzige im östl. Nordamerika noch harte Art, daher sehr gesucht. **Für Hecken und Schutzwände in den kältesten Gegenden Deutschlands noch verwendbar.** Bis über 20 m.	40—50	1.75	15.—	—
	90—100	4.50	40.—	—
	100—125	5.50	50.—	450.—
	125—150	6.50	60.—	550.—
	150—175	8.—	72.—	—
	175—200	10.—	90.—	—
	200—225	15.—	—	—
	225—250	20.—	—	—
» **compacta** *Bean.* △ . . . . Dicht kegelige Zwergform, nicht so ausgebreitet wachsend wie T. cusp. nana.	20—30	4.—	—	—
» **nana** *Rehd.* (T. brevifolia *Hort.*) △ . . . . Langsam wachsende, breitwerdende Form mit hellen, kurzen und breiten Nadeln.	20—30	4.—	—	—
	30—40	5.—	—	—
	40—50	6.—	—	—
	50—60	8.—	72.—	—
	60—70	12.—	—	—
Thuja — Lebensbaum — Cupressaceae				
gigantea aureo-variegata *Hort.* . . . . Üppig wachsende, goldbunte Form des Riesen-Lebensbaums Nordamerikas. 30—60 m.	80—100	3.—	27.—	—
	100—125	3.50	31.50	—
	125—150	4.50	40.—	—
	150—175	6.—	—	—
» **aurescens** *Hort.* . . . . Schöne Form von ausgeprägt gelber Färbung, die auch beständig bleibt.	80—100	2.—	18.—	—
	100—125	2.50	22.50	200.—
	125—150	3.50	30.—	260.—
	150—175	4.50	40.—	350.—
	175—200	6.50	60.—	—
» **pyramidalis** *Bean.* (Th. gigantea fastigiata *Hort.*) . . . Schöne, pyramidal wachsende Form.	80—100	3.—	27.—	—
	125—150	4.50	40.—	—
koraiensis *Nak.* Korea-Lebensbaum △ *Neueinführung!* . Ausgebreitet, unterseits auffallend blauweiße Nadeln. $^1/_2$—2 m	20—30	2.50	22.50	—
occidentalis *L.*, abendländischer Lebensbaum . . . . . Lässt sich durch Schnitt sehr willig in jeder Form halten und ist daher vorzüglich zu Hecken zu verwenden. Baum Nordamerikas, bis 20 m.	40—60	1.20	10.—	90.—
	60—80	1.50	12.—	100.—
	80—100	1.75	16.—	140.—
	100—125	2.25	20.—	180.—
	125—150	2.50	24.—	225.—
» **Bodmeri** *Hort.* . . . . Form mit monströsen, übergebogenen Zweigen.	20—30	2.—	18.—	—
	125—150	5.—	—	—
» **Buchononi** *Arn. Arb.* (Th. occ. Buchanani *Pars.*) . . . . Zierliche, feinzweigige, graugrüne Form.	80—100	3.50	—	—
	100—125	4.—	—	—
» **Cloth of Gold** *Hort. Amer.* . . . . Lockerzweigig, lebhaft goldgelb.	60—80	4.—	—	—
» **Columbia** *Hort.* . . . . Schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen, im Herbst und Winter.	175—200	6.—	—	—
	200—225	8.—	—	—
	225—250	10.—	—	—
» **Columna** *Späth.* Echt! Keine Sämlinge! . . . . . Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	60—80	2.—	18.—	150.—
	125—150	3.—	25.—	—
	150—175	3.50	30.—	—
	175—200	4.—	35.—	300.—
	200—225	4.50	40.—	380.—
	225—250	5.50	50.—	480.—
	250—275	7.—	63.—	—
	275—300	8.—	—	—
	300—325	10.—	—	—
» **cristata** *Hort.* . . . . Form mit Hahnenkamm-förmigen Zweigspitzen.	125—150	4.—	—	—
» **Douglasi pyramidalis** *Späth.* . . . . In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides ähnelnde, langsam und gedrungen wachsende Pyramidenform.	40—60	2.—	18.—	—
	125—150	3.50	—	—
	200—250	7.—	63.—	—
	250—275	8.—	72.—	—
	350—400	15.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Thuja (Fortsetzung):				
occidentalis Ellwangeriana *Hort.*	30—40	1.50	12.—	—
Übergangsform mit zweierlei Zweigen. Bildet zierliche, dichtbezweigte, gedrungene Pyramiden, ganz hart.	60—80	2.—	18.—	—
	80—100	3.—	27.—	—
	125—150	4.—	—	—
	175—200	6.—	—	—
	200—225	8.—	—	—
	225—250	10.—	—	—
» **Ellwangeriana Rheingold** *Vollert* △	20—30	3.—	27.—	—
Kegelförmige Spielart von hellgoldgelber Färbung.	30—40	4.—	36.—	—
	40—50	5.—	45.—	—
» **erecta** *Hesse*	175—200	4.—	36.—	—
Schlank, feinzweigige, dunkelgrüne Form.				
» **filiformis** *Beissn.*	60—80	4.50	40.—	—
Wuchs kegelförmig, Zweige fadenförmig überhängend.	80—100	5.50	—	—
» **Froebeli** *Hort.*	70—80	3.—	27.—	240.—
Schöne, eirunde, frischgrüne, gedrungene Form.	80—100	6.—	—	—
» **globosa** *Hort.* △	20—30	2.50	22.50	200.—
Regelmässige Kugelform mit feinen, dichten Zweigen.	30—40	3.—	27.—	240.—
	50—60	5.—	45.—	—
	60—70	6.—	—	—
» **gracilis** *Hort.*	40—60	3.—	27.—	—
Form mit besonders zierlicher Verästelung und von schön pyramidalem Aufbau. Eine der feinblättrigsten und zierlichsten Formen. Erinnert an Th. occ. Ellwangeriana.	100—125	6.—	—	—
» **Hoveyi** *Hort.*	80—100	3.50	31.50	—
Gedrungen wachsende Form von eirundlichem Wuchs, Belaubung hellgrün.	100—125	6.—	—	—
» **Little Gem** *Hort.* (Th. occ. pumila *Beissn.*) △	10—15	1.50	—	—
Zwergform von ganz gedrungenem Wuchs, dunkelgrün, schwach und breitwüchsig.				
» **lutea** *Hort.*	125—150	3.50	30.—	250.—
Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, mit prächtig gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung.	150—175	4.50	40.—	—
	175—200	6.—	54.—	—
	200—225	8.—	72.—	—
» **Ohlendorffii** *Beissn.* (Th. occ. Späthi) △	20—30	2.50	—	—
Aufstrebende Form m. monströsen u. fadenförm. Zweigen.				
» **recurva nana** *Hort.* △ … hoch und breit	20—30	2.50	22.50	—
Frischgrüne Form für niedrige, breite Hecken.	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	4.—	36.—	—
	50—60	5.—	45.—	—
» **Riversii** *Hort.*	125—150	3.—	27.—	—
Schlank und gedrungen wachsende Pflanze mit gelblichgrüner Belaubung.	150—175	3.50	31.50	—
	200—250	7.—	63.—	—
	250—300	8.—	—	—
» **Rosenthalii** *Ohlend.*	80—100	2.50	20.—	180.—
Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	100—125	3.—	25.—	200.—
	125—150	3.50	30.—	250.—
	150—175	5.—	45.—	—
	200—225	7.—	63.—	—
» **Vervaeneana** *Hort.*	175—200	4.50	—	—
Breitpyramidale Form mit feiner, leichter Bezweigung. Die sommerliche, gelbliche Färbung geht im Winter in ein schönes Goldbronze über.	200—225	6.—	—	—
	225—250	8.—	—	—
	250—275	10.—	—	—
	275—300	12.—	110.—	—
	300—325	15.—	135.—	—
» **Wareana** *Hort.*	80—100	2.50	22.50	—
Prächtig dunkelgrün, von gedrungenem Wuchs.	100—125	3.—	25.—	—
	125—150	3.50	31.50	—
	150—175	5.—	—	—
» **Wareana lutescens** *Hesse*	100—125	6.—	—	—
Mit bald hellgelber, bald mehr dunkelgelber Färbung.				
» **Waxen** *Arn. Arb.*	100—125	3.—	25.—	—
Zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Färbung. Früchte wachsgelb.	250—275	8.—	—	—
plicata *Parl.* (Th. occ. plicata *Mast.*)	80—100	2.50	—	—
Dem gemeinen Lebensbaum nahestehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung. Nordamerika.	100—125	3.50	—	—
Standishii *Carr.* (Thujopsis Standishi *Gord.*)	30—40	2.50	22.50	—
Rundliche Bezweigung von gelbgrüner Farbe, leicht überhängende Spitzen. Japan, bis 18 m.	175—200	6.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Thujopsis — Hibalebensbaum — Cupressaceae.				
borealis, siehe Chamaecyparis nutkaënsis.				
dolabrata *Sieb. & Zucc.* Hibalebensbaum . . . . Breit pyramidale Pflanzen, breitschuppig. Japan, bis 35 m.	50—70	3.—	27.—	—
	125—150	8.—	—	—
	150—175	10.—	90.—	—
	175—200	12.—	110.—	—
» **nana** *Sieb. & Zucc.* △ . . . . Dicht und feinzweigig, kleinschuppig.	15—20	4.—	36.—	—
» **variegata** *Hort.* . . . . Wie die Art, nur weissbunt.	125—150	8.—	—	—
	150—175	10.—	90.—	—
	175—200	12.—	110.—	—
Standishii, siehe Thuja Standishii.				
Torreya — Stinkeibe — Taxaceae.				
nucifera *Sieb & Zucc.* Nusstragende Stinkeibe . . . . Grossnadelig, zweizeilig, abstehend, glänzend dunkelgrün. Japan, 10—30 m.	50—70	6.—	54.—	—
Tsuga — Hemlocks- oder Schierlingstanne — Pinaceae.				
canadensis *Carr.* Kanadische Hemlockstanne . . . . Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung. 25—30 m.	40—60	2.—	18.—	150.—
	60—80	2.50	22.50	200.—
	100—125	4.—	36.—	300.—
	125—150	5.—	45.—	400.—
	150—175	6.—	54.—	500.—
» **albo-spicata** *Hort.* . . . . Schönste bunte Hemlockstanne.	30—40	3.—	27.—	—
	40—60	5.—	45.—	—
	60—80	6.—	54.—	—
» **aurea** *Hort.* △ . . . . Goldgelb schimmernde Form, gedrungen, Zweigspitzen leicht übergebogen.	20—30	3.50	—	—
» **macrophylla** *Hort.* . . . . Rasch und üppig wachsende Form.	20—30	3.—	27.—	—
	30—40	4.—	36.—	—
» **minima** *Hort.* △ . . . . Niedrig, dicht und rund, Nadeln kürzer und schmäler.	20—30	4.—	36.—	—
» **parvifolia** *P. Smith* . . . . Sehr kleinblättrige Form, schön und zierlich.	20—30	4.—	36.—	—
	40—60	6.—	—	—
» **pendula** *Hort.* (Ts. canad. Sargenti pendula *Hort.*) ⊥ . . . Sehr dekorative Form mit stark hängenden Ästen und Zweigen, für Einzelpflanzung.	40—60	5.—	45.—	—
caroliniana *Engelm.* Karolina-Hemlockstanne . . . . . . Mittelhoher Baum mit dichtgestellten, dunkelgrünen Nadeln, 16—20 m.	175—200	6.—	54.—	—
diversifolia *Maxim.* . . . . Dichte, breite Pyramiden bildend mit verschieden langen, dunkelgrünen Nadeln. Japan, 25 m.	70—90	4.—	35.—	320.—
Mertensiana *Carr.* (Ts. heterophylla *Sarg.*) . . . . Als Unterholz wertvolle Art von grossem Zierwert. Liebt feuchten Standort und ist empfindlich gegen Wind und Sonnenbrand. Verträgt tiefsten Schatten. Westamerika, 30—60 m.	125—150	4.—	36.—	—
	150—175	5.—	45.—	400.—
	175—200	7.—	—	—
	200—250	12.—	—	—
	250—300	15.—	—	—
	300—350	25.—	225.—	—
Pattoniana *Engelm.* (Ts. Mertensiana *Sarg.*) . . . . Streng pyramidale Art mit graublauer, allseits abstehender Benadelung. Nordamerika 30—50 m.	20—30	4.—	36.—	—
	30—40	5.—	—	—
Wellingtonia — Mammutbaum — Taxodiaceae.				
gigantea, siehe Sequoia gigantea.				

Junge Koniferen. — Junge Nadelhölzer.

Zur Weiterkultur.

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück ab in Anrechnung.

Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältig kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzen zu vergleichen.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Abies, Tanne					
balsamea		2jähr.	verpfl. Säml.	4.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	5 »	» »	8.—	—
cephalonica		2 »	» »	10.—	90.—
»		3 »	» »	12.—	100.—
cilicica		2 »	» »	15.—	—
»	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
concolor	» 8—15 » »	2 »	» »	15.—	140.—
»	» 10—20 » »	3 »	» »	18.—	—
» violacea	» 8—15 » »	2 »	» »	18.—	160.—
grandis		2 »	» »	12.—	—
lasiocarpa		2 »	» »	12.—	—
»	ca. 20—45 cm hoch	4 »	» »	15.—	—
Mariesi	» 10—20 » »	4 »	» »	20.—	—
nobilis	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	140.—
Nordmanniana		2 »	» »	12.—	110.—
numidica		2 »	» »	12.—	—
pectinata		2 »	Sämlinge	4.—	30.—
»		2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
umbilicata		2 »	» »	12.—	—
Veitchi		2 »	» »	10.—	—
»	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
Biota, Morgenländischer Lebensbaum					
orientalis		1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
» elegantissima		1 »	»	6.—	—
Cedrus, Zeder					
atlantica	ca. 10—25 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
»	» 20—40 » »	3 »	» »	30.—	—
» glauca	» 10—25 » »	2 »	» »	30.—	—
deodara	» 10—20 » »	2 »	» »	25.—	240.—
Chamaecyparis, Scheinzypresse					
Lawsoniana		2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» Alumii		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	240.—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» »	» 20—40 » »	4 »	2× » »	35.—	—
» erecta viridis		2 »	» »	20.—	—
» Fraseri		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» »	» 20—40 » »	4 »	» »	28.—	—
» monumentalis nova		2 »	» »	20.—	—
» » nova	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» Rosenthali		2 »	» »	20.—	—
» Triomf van Boskoop	bis 20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
nutkaënsis		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
»	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» glauca		2 »	» »	30.—	—
obtusa		2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	10.—	—
pisifera		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
»	ca. 25—45 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» aurea		2 »	» »	20.—	—
» filifera		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» »	» 25—45 » »	4 »	» »	30.—	—
» » nana △		2 »	» »	25.—	—
» plumosa		2 »	» »	20.—	—
» »	ca 20—35 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» »	» 20—45 » »	4 »	» »	30.—	—
» » aurea		2 »	» »	20.—	—
» » »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » flavescens		2 »	» »	20.—	—

Koniferen

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Chamaecyparis (Fortsetzung):					
pisifera squarrosa		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » aurea		2 »	» »	20.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» sulfurea		2 »	» »	20.—	—
Cryptomeria, Sicheltanne					
japonica		1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»		2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Ginkgo, Ginkgobaum					
biloba	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
»	ca. 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
»	» 25—50 » »	3 »	» »	25.—	—
Juniperus, Wacholder					
chinensis Pfitzeriana △		2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
communis	ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» cracovica		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» »	» 20—40 » »	4 »	» »	35.—	—
» hibernica		2 »	» »	30.—	—
» hibernica excelsa pyramidalis		2 »	» »	30.—	280.—
» » excelsa pyramidalis	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	35.—	—
» suecica		2 »	» »	30.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	35.—	—
» nana aureo-spica △		2 »	» »	35.—	—
recurva densa △		2 »	» »	35.—	—
Sabina △		2 »	» »	30.—	—
virginiana		1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» tripartita △		2 »	verpfl. Steckl.	35.—	—
Larix, Lärche					
europaea	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
leptolepis		1 »	Sämlinge	5.—	45.—
»	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
Libocedrus, Flusszeder					
decurrens	ca. 8—15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
Picea, Fichte					
alba (P. canadensis)	ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 25—45 » »	4 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Engelmanni		2 »	» »	15.—	—
excelsa	ca. 10—20 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 15—30 » »	3 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 40—80 » »	4 »	» »	6.—	50.—
» acrocona		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» Clanbrassiliana △		2 »	» »	30.—	—
» columnaris		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» compacta △		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» conica △		2 »	» »	15.—	—
» cupressina		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» Maxwelli △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 8—10 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» nidiformis △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» parviformis △		2 »	» »	25.—	—
» procumbens △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» pumila glauca △		2 »	» »	25.—	—
» pygmaea (P. exc. Ohlendorffi) △		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» »	» 10—20 » »	4 »	» »	35.—	—
falcata, siehe P. sitchensis					
nigra		2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
obovata		2 »	» »	6.—	—
Omorica		2 »	» »	10.—	—
»	ca. 20—35 cm hoch	4 »	» »	15.—	—
orientalis		2 »	» »	10.—	—
pungens		2 »	» »	6.—	—
»	ca 10—15 cm hoch	3 »	» »	8.—	—
» glauca		2 »	» »	8.—	—
sitchensis (P. falcata)		2 »	» »	6.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Pinus, Kiefer					
excelsa	ca. 5—10 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
»	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
flexilis	» 4—8 » »	2 »	» »	15.—	—
»	» 6—10 » »	3 »	» »	18.—	—
Jeffreyi	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
Laricio austriaca §	» 5—10 » »	2 »	» »	5.—	40.—
» »	» 10—25 » »	3 »	» »	8.—	75.—
» **Poiretiana**	» 10—25 » »	3 »	» »	8.—	—
maritima	» 40—80 » »	3 »	» »	15.—	—
montana § △ ⌂	» 5—10 » »	2 »	» »	5.—	40.—
»	» 10—15 » »	3 »	» »	9.—	—
» **Mughus** △	» 5—10 » »	2 »	» »	5.—	40.—
» »	» 8—15 » »	3 »	» »	9.—	—
» **pumilio** △	» 4—8 » »	2 »	» »	5.—	40.—
Murrayana	» 40—70 » »	3 »	» »	8.—	—
ponderosa	» 4—8 » »	2 »	» »	10.—	—
silvestris	» 10—20 » »	2 »	» »	4.—	30.—
»	» 25—50 » »	3 »	» »	5.—	40.—
Strobus	» 8—15 » »	2 »	» »	4.—	30.—
»	» 15—25 » »	3 »	» »	5.—	—
»	» 30—50 » »	4 »	» »	6.—	—
Pseudolarix, Goldlärche					
Kaempferi	ca. 10—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Pseudotsuga, Douglastanne					
Douglasi	ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» **glauca**	» 8—15 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» **viridis**		1 »	Sämlinge	4.—	30.—
Taxodium, Sumpfzypresse					
distichum	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Taxus, Eibe.					
baccata fastigiata	ca. 8—15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
» »	» 15—25 » »	4 »	2× » »	25.—	—
» **imperialis**	» 20—40 » »	4 »	2× » »	20.—	—
» **pyramidalis Overeynderi** ⌂	» 10—15 » »	3 »	» »	20.—	—
» » **Overeynderi**	» 20—40 » »	4 »	2× » »	25.—	—
Thuja, Lebensbaum.					
gigantea		2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» **atrovirens**		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» »	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» **aureo-variegata**		2 »	» »	20.—	—
» » **-variegata**	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » »	» 25—45 » »	4 »	» »	30.—	—
» **aurescens**		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» **pyramidalis**	» 20—40 » »	3 »	» »	25.—	—
occidentalis § ⌂		2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	7.—	—
» **Buchononi**		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» **Columbia**		2 »	» »	20.—	—
» **Columna** ⌂		2 »	» »	25.—	—
» **Ellwangeriana**		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » **Rheingold** △		2 »	» »	25.—	—
» » »	bis 15 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
» **erecta**		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
» **fastigiata**		2 »	» »	20.—	—
» **filiformis** §		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» **Froebeli**		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» »	» 20—30 » »	4 »	» »	25.—	—
» **globosa** △		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» »	» 20—30 » »	4 »	» »	30.—	—
» » **compacta** △		2 »	» »	20.—	—
» **gracilis** §		2 »	» »	20.—	—
» **Hoveyi**		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» »	» 20—45 » »	4 »	» »	25.—	—

Koniferen

	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Thuja (Fortsetzung):				
occidentalis Ohlendorffi (Th. occ. Spaethi) △	2jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
» **recurva nana** △ ♔	2 »	» »	20.—	—
» » **nana** ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» » » » 10—20 » »	4 »	» »	30.—	—
» **Riversi**	2 »	» »	18.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » » 20—35 » »	4 »	» »	25.—	—
» **Rosenthali**	2 »	» »	20.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» **umbraculifera** △	2 »	» »	25.—	—
» **Vervaeneana**	2 »	» »	18.—	—
» » ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » » 25—45 » »	4 »	» »	25.—	—
» **Wagneri**	2 »	» »	18.—	—
» **Wareana**	2 »	» »	18.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » **lutescens**	2 »	» »	18.—	—
» » » ca. 20—40 cm hoch	4 »	» »	25.—	—
plicata	2 »	» »	20.—	—
Standishi ca. 8—15 cm hoch	2 »	» »	25.—	—
Thujopsis, Hibalebensbaum.				
dolabrata ♔	2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
» ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» **variegata**	2 »	» »	20.—	—
Torreya, Stinkeibe.				
nucifera ca. 30—50 cm hoch	5jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Tsuga, Hemlockstanne.				
canadensis ♔	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	140.—
Sieboldi	2 »	» »	15.—	—
»	3 »	» »	20.—	—

Kulturanweisung und Behandlung der Ballenpflanzen

nach dem Eintreffen sowie vor und bei dem Pflanzen.

Ballenpflanzen unterliegen der Gefahr des Austrocknens auf dem Transport. Deshalb sind alle Ballen bei Ankunft stets zu prüfen und gegebenenfalls genügend zu wässern, bevor sie gepflanzt werden. Man stelle die Ballen, ohne an der Tuchumhüllung etwas zu ändern, in ein Gefäss mit Wasser, so dass der Ballen vollkommen unter Wasser kommt, und lasse den Ballen so lange in dem Gefäss, bis keine Luftblasen mehr aus dem Ballen aufsteigen, ein Zeichen, dass der Erdballen vollkommen mit Wasser durchtränkt ist. Besonders bei Frühjahrslieferung ist Beachtung dieser Vorschrift unerlässlich.

Die von mir mit grösster Sorgfalt vorgenommene Emballage geschieht ausschliesslich durch **Juteleinen, das beim Pflanzen der Ballen am vorteilhaftesten um den Ballen verbleibt, also mit in die Erde kommt.** Lediglich sind, nachdem die Pflanzen ihren richtigen Stand haben, die Knoten zu lösen und das etwa verwendete Bindematerial zu durchschneiden. Die Pflanzgruben können alsdann nach gründlichem Einschlämmen der Ballen angefüllt werden. Die Pflanzenscheibe wird dann vorteilhaft mit Torfstreu abgedeckt, so dass die Feuchtigkeit möglichst lange erhalten bleibt. Auf diese Weise wird das oft schädliche wiederholte Giessen nach der Pflanzung überflüssig. Wird dann noch nach Bedarf der Pflanze etwas Sonnenschutz gewährt, so sind die Vorbedingungen für ein sicheres Anwachsen erfüllt, und Enttäuschungen werden vermieden.

Stauden

oder winterharte, perennierende Freiland-Pflanzen.

Stauden sind krautartige Freilandpflanzen, deren oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde herab absterben und die aus den winterharten unterirdischen Teilen im Frühjahr wieder freudig austreiben. Die beste Pflanzzeit für die hauptsächlichsten Vertreter dieser Pflanzengruppe ist der zeitige Herbst oder das Frühjahr, wobei vor allem zu beachten ist, daß nicht zu tief gepflanzt wird. Winterschutz benötigen die Stauden nur wenig und dann nur lockeren Reisig- oder Laubschutz. Die meisten Stauden trotzen unseren normalen Wintern ohne jeden Schutz und ohne jeden Schaden. Der große Schmuckwert infolge ihrer Farbenfreudigkeit, die Möglichkeit der Auswahl von das ganze Jahr über blühenden Sortimenten, ihre Verwendbarkeit als Schnittblumen, oder auch zur Treiberei und Topfkultur, ihre unerreichte Wirkung in der blühenden Rabatte oder als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und ganz besonders ihre Vielgestaltigkeit als Werkstoff im Steingarten sichern den Stauden immer mehr eine begeisterte Liebhabergemeinde, die erkannt hat, daß diese erstaunlichen Pflanzenwunder heute in jedem Garten durchaus zuverlässige und daher sehr preiswerte Freudespender sind.

Man beachte, daß Stauden nicht zum ermäßigten Frachtsatz reisen wie die Gehölze, daß vielmehr zwischen Fracht- oder Eilgutbeförderung zu wählen ist. Sofern mir vom Besteller keine Vorschriften gemacht werden, handle ich jeweils nach eigenem bestem Ermessen.

Alle von mir angebotenen Stauden werden in besonders gut kultivierten, kräftigen Pflanzen geliefert.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Art und Sorte** berechne ich den Zehnerpreis, ab 50 Stück berechne ich den Hundertpreis.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

Nur ungeteilt bei Abnahme von mindestens 50 Stauden abgebbar.

Die Mannigfaltigkeit meiner Staudensammlung gewährleistet schönste Zusammenstellung der Sortimente.

Sortiment	Menge	Preis
Schnitt- und Rabattenstauden in 15–20 guten Sorten	100 St.	M. 30.—
Schnitt- und Rabattenstauden in 15–20 **besseren** Sorten	100 »	» 40.—
Einfassungs- und Polsterstauden für Steingärten und Plattenwege	100 »	» 20.—
Mauer- und Felsenstauden in reicher Zusammenstellung	100 »	» 30.—
Alpine und bessere Stauden für Steingärten in reicher Sortenwahl, mindestens 30–40 Sorten	100 »	» 40.—
Liebhabersortiment für Steingärten in ca. 50 Sorten, darunter Zwerg-Steingartengehölze	100 »	» 75.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Acaena — Stachelnüsschen — Rosacee.			
fissistipula violacea, ○ △ ■ . . . . . **m. Tb.** Schön belaubt, Triebe bläulich, wüchsig, 10—15, VII.	—.40	3.60	—
glauca, ○ △ ■ . . . . . Blaugrünes, dunkles Laub, wüchsig, Nüsschen zahlreich, gut über dem Laub, 10, VII.	—.40	3.60	32.—
novae-zelandiae, ○ △ ■ . . . . . Grünes Laub mit großen, roten Stachelnüsschen, 15, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Acantholimon — Stachelsandnelke — Plumbaginacee.			
androsaceum, ○ △ # . . . . . **m. Tb.** Hellgrau belaubt, rosa, 15, VII—VIII.	—.80	—	—
glumaceum (Statice glumacea), Wiesenstachel ○○ △ # . . . . **m. Tb.** Laub wintergrün, Blüten hellrot, 10, VII—VIII.	—.80	—	—
ulicinum, ○○ △ # . . . . . **m. Tb.** Laub dunkelgrün, 10, VII—VIII.	—.80	—	—

Acanthus — Krebsdistel, Bärenklau — Acanthacee.	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
longifolius, Bärenklau, ○ ⊥ Blätter glänzendgrün, nicht dornig, rosa, 100, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
Perringii (A. Caroli-Alexandrii) CO △ [K] Dornige, graugrüne Blattrosetten, Blüten rosenrot, 30—50, VI—VII.	—.80	—	—

Achillea — Schafgarbe, Edelgarbe — Komposite.	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
ageratifolia (Anthemis Aizoon) ○ △ **m. Tb.** Blätter silberweiss, Blüten weiss, recht gross, 10—20, VI—VII.	—.40	3.60	—
ambigua, ○ △ ■ Rasig, schön weiss, 15, VI.	—.40	—	—
canescens, ○ △ □ Blätter doppelt federschnittig, silberweiss, Blüten doldig, weiss, 40, VI.	—.40	—	—
clypeolata, ○ △ Graufilzig, Strahlenblüten kreisrund, gelb, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
Eupatorium Parkers Varietät (A. filipendulina), ○ ▭ ✂ Goldene Tellergarbe mit grossen, flachen, gelben Blütendolden. Auch für Trockensträusse, 100, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
holosericea, ○ △ Laub schön silberwollig, Blüten hellgelb. 25—45, VII—VIII.	—.50	—	—
lingulata, ○ △ [K] Niedrige, frischgrüne Rosette, Blütenstände schön weiss, 40, VI.	—.30	2.70	—
millefolium „Cerise Queen", ○ ▭ ✂ Dankbare Schnittblume, leuchtend kirschrot, 50, VI—VIII.	—.40	—	—
» **Kelwayi**, ○ ▭ ✂ Haltbare Schnittblume, dunkel kirschrot, 50, Ende VI—IX.	—.40	—	—
Ptarmica grandiflora plena „Perry's White", Deutscher Bertram ○ ▭ ✂ weissgefüllt, 50—80, VII bis Frost.	—.40	—	—
» **plena**, CO ▭ ✂ Weiss, kugelig, 50, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **plena The Pearl**, CO ▭ ✂ Weiss, gut remontierend, Wuchs kräftig. 60—80, VI—Frost.	—.40	—	—
tomentosa (A. aurea), ○ △ ■ Goldgelb, Blätter zottigwollig, bis 30, VI—VII.	—.30	—	—
umbellata, ○ △ **m. Tb.** Aschgrau, weiss, 10—15, VI—VII.	—.60	—	—

Aconitum — Eisenhut — Ranunculacee.	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
japonicum, ◑ ▭ ✂ Kurzknollig, Blüten rispig, blauviolett, bis 150, VII—VIII.	—.50	—	—
Lycoctonum ranunculifolium, ◑ ▭ ✂ Gelb, 80—100, VII—VIII.	—.40	—	—
Napellus bicolor, „Venuswagen", ◑ ▭ ✂ Üppige Form, blau und weiss, 100, VII—VIII.	—.40	—	—
» **hybr. praecox**, ◑ ▭ ✂ Blau, früh, 80—100, VI—VII.	—.40	3.60	—
» **Spark's Varietät**, ◑ ▭ ✂ Dunkelste blaue, 120—150, VII—IX.	—.40	3.60	—
pyramidale (A. Stoerkeanum), ◑ ▭ ✂ Lange Rispen tief ultramarinblau, 80—100, VI—VIII.	—.40	—	—
rostratum coeruleum (A. variegatum coeruleum), ◑ ▭ ✂ Wundervoll lichtblau, bis 150, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Wilsoni, ◑ ▭ ✂ Straff, tiefblau, mächtige Rispe, 120, IX—X.	—.50	—	—

Actaea — Christophskraut — Ranunculacee. Siehe auch „Cimicifuga"	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
spicata, ◑ ● ⅋ Glänzend schwarze Beeren, 40—70, V—VI.	—.80	7.20	—
» **alba** (A. alba), ◑ ● ⅋ Weisse Beeren auf verdickten, roten Stielen, 100, VII—IX.	1.20	11.—	—
» **erythrocarpa** (A. erythrocarpa), ◑ ⅋ Früchte rot, Stiele schwach verdickt, 100, VII—IX.	1.—	—	—
» **rubra** (A. rubra), ◑ ● ⅋ Korallenrote Beeren, üppiger Wachser, 100, VII—IX.	1.—	9.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf
Adenophora — Becherglocke — Campanulacee.			
diplodonta, ◑ □ . . . . Hellblau, 60—70, VII—IX.	—.40	3.60	—
Tashiroi (Adenophora species Korea), ◑ △ . . . . Wuchs niedergestreckt, blau, 15, VII.	—.50	4.50	—
Adonis — Adonisröschen — Ranunculacee.			
amurensis, ◑ . . . . Blüte in blattlosem Zustand, schön goldgelb, 25, III—IV.	2.—	—	—
Aetheopappus — Flockenblume — Komposite.			
pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume, ○ □ ✕ ✲ . . . . Buschig, rosapurpur, 30—50, VII.	—.40	3.60	—
Aethionema — Steinkresse — Krucifere.			
armenum, ○ △ . . . . **m. Tb.** Ausgebreitet, sehr reichblütig, grossblumig, lilarosa, 20, V—VI.	—.50	—	—
iberideum, ○ △ . . . . **m. Tb.** Groblaubig, weiss, 10—20, V—VI.	—.50	—	—
persicum, ○ △ . . . . **m. Tb.** Lebhaft rosa, Wuchs niedrig, dicht, 15—20, V.	—.50	—	—
pulchellum, ○ △ ♎ [K] ∧ gegen Nässe . . . . **m. Tb.** Wuchs niederliegend, verzweigt, rosenrot, 10, VI.	—.50	4.50	—
Warley Hybriden, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Breite, niedrige Polster, leuchtend rosa, 10, VI.	—.50	—	—
Agapanthus — Schmucklilie — Liliacee.			
minor hybridus, ◑ △ □ ∧ . . . . In all. Teilen kleiner als A. umbellatus, Blüten gross, blau, bis 50, VII—VIII.	2.—	—	—
Ajuga — Günsel — Labiate.			
reptans atropurpurea, Purpurgünsel, ● △ . . . . Laub purpurn, Blüten bläulich, 15, V—VI.	—.25	2.25	—
Alchemilla — Frauenmantel — Rosacee.			
alpina, ○ △ . . . . Laub silbergrau, gelbe, dichte Doldentrauben, 10—20, VI—VIII.	—.30	2.70	—
Allium — Lauch — Liliacee.			
Beesianum, ◑ △ . . . . Blüten hängend, hellblau, bis 30, VIII—IX.	—.40	—	—
cernuum, ◑ △ . . . . Nickende Dolden hellrosa, später reinweisser Blüten, 30—60, VII.	—.40	—	—
cyaneum, ◑ △ . . . . Dicht grasartig. Laub, kornblumenbl. nickende Köpfchen, 15—25, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Farreri, ◑ △ . . . . Purpur, 30, VI—VII.	—.40	3.60	—
flavum, ◑ △ . . . . Laub grau, schmal, gelbe, nickende Blüten. Williger Wachser, 40, VII.	—.40	3.60	—
montanum, ∞ △ ♎ ⫶ . . . . Dichte, hellgrüne Polster, Blüten halbkugelig, lilarosa, 15, VI—VIII.	—.40	3.60	—
narcissiflorum, ○ △ . . . . Grossblumig, purpur, Laub hellgrün, 20—30, VI—VII.	—.50	—	—
pulchellum, ◑ △ . . . . Lockere Dolden, lilarot, 30—40, VIII.	—.40	—	—
tibeticum, ◑ △ . . . . Blau, breitlaubig, 30, VII.	—.40	—	—
Alsine (Minuartia) — Miere — Caryophyllacee.			
laricifolia, siehe Arenaria.			
Rosanii (A. graminifolia), Polstermiere, ∞ △ ■ . . . . Dichtrasig, glänzend grün, Blüten weisslich, 3—8, VII—VIII.	—.40	—	—
stellata (Minuartia stellata), ∞ △ ■ . . . . Polsterig, weiss, 5—10, VII.	—.40	3.60	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Althaea — Stockrose — Malvacee.			
ficifolia, Hybriden ○ ▭ . . . . Blätter tief handteilig, in gelben, weissen und rötlichen Tönungen, bis 300, VII—X.	—.50	4.50	—
Alyssum — Steinkraut — Cruciferae.			
alpestre, ♄ ○ △ ❀ . . . . **m. Tb.** Halbstrauchig, grau, hellgelbe, dichte Traube, 10—15, VI—VIII.	—.50	—	—
halimifolium, ♄ ○○ ❀ . . . . **m. Tb.** Silberweiss holzig, reinweiss, 15, V—VI.	—.60	—	—
Moellendorffianum, ○ △ ▬ . . . . **m. Tb.** Silbrig, rasig, kleinblütig, gelb, 10—20, V—VII.	—.40	3.60	—
montanum grandiflorum, ○ △ . . . . **m. Tb.** Groblaubig, silbern, sattgelb, 15—25, IV—VI.	—.40	—	—
repens, ○ △ ≏ . . . . **m. Tb.** Dichtrasig, grossblumig, tiefgelb, 5—10, IV—VI.	—.50	—	—
rostratum (A. argenteum), ♄ ○ △ . . . . **m. Tb.** Verholzend, gelb, spät, 30—40, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
saxatile (A. Arduini), Goldtuft, ○ △ ❀ . . . . **m. Tb.** Graufilzig, goldgelb, bis 40, IV—VI.	—.30	2.70	24.—
» **citrinum**, ○ △ ❀ . . . . **m. Tb.** Schwefelgelb, 30, IV—VI.	—.50	—	—
» **compactum**, ○ △ ❀ . . . . **m. Tb.** Niedrig, gelb, 20—25, IV—VI.	1.—	9.—	—
» **plenum**, ○ △ . . . . **m. Tb.** Gelb, gefüllt, 30, V—VI.	—.50	4.50	40.—
spinosum (Ptilotrichum spinosum), ♄ ○○ ∥ ❀ . . . . **m. Tb.** Silberweisses Laub, ziemlich grossblumig, weiss, 10—20, V—VI.	1.—	9.—	—
Amaryllis, siehe Crinum.			
Amsonia — Amsonie — Apocynacee.			
latifolia (A. Tabernaemontana), ○ ◑ . . . . Blassblau, 60—120, V—VII.	—.50	—	—
Anacyclus — Kreisblume — Komposite.			
depressus, ○○ ≏ . . . . **m. Tb.** Breite Rosetten, graugrün, dichtpolsterig, reinweiss, Rückseite dunkelkarminrot, 5, VII.	—.80	—	—
Anaphalis, siehe Antennaria.			
Anchusa — Ochsenzunge — Boraginee.			
italica „Dropmore variety" ◑ ▭ ❀ . . . . Rauhbehaart. Laub, reichverzweigte Blütentriebe, dunkelblau, 100, VI—IX.	—.50	4.50	—
myosotidiflora, Kaukasus-Vergissmeinnicht, ◑ ● . . . . Grosses, tiefgrünes Laub, Blüten lichtblau, 30—50, IV—V.	—.50	4.50	—
Androsace — Mannsschild — Primulacee.			
Laggeri, Frühlingsmannsschild, ◑ △ ≏ . . . . Nadelförmig, dunkelgrün, dunkelrot, 3, IV—V.	—.60	—	—
primuloides (A. sarmentosa primuloides), ◑ △ . . . . Hellrot, üppig, rosettig, 5—10, ab IV.	—.40	3.60	32.—
Anemone — Windblume — Ranunculacee.			
alpina (A. acutipetala), ◑ △ ❀ ≌ . . . . Weiss, aufrecht, bis 30, VI—VII.	—.60	5.40	—
canadensis, ◑ ▭ . . . . Grundblätter dreiteilig, Blütenstände locker, weiss, 30—40, VI—VII.	—.40	—	—
decapetala ◑ △ ❀ . . . . Gelblichweiss, 2—3 cm Durchmesser, 30—50, V—VII.	—.40	—	—
japonica Honorine Jobert (A. jap. alba), ◑ ▭ ✂ . . . . Einfach weiss, grossblumig, 60—80, VIII—XI.	—.60	5.40	—
» **Kriemhilde**, ◑ ▭ ✂ . . . . Halbgefüllt, fliederfarben, 9—10 cm Durchmesser, 40—60, VIII—XI.	—.60	—	—
» **Luise Uhink**, ◑ ▭ ✂ . . . . Halbgefüllt, reinweiss, sehr gross, 60—80, IX—XI.	—.60	—	—



(HA) Senecio Hessei, Neuheit!
Gruppe in Vollblüte



Senecio Hessei, Neuheit!
Blütenstand

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Anemone (Fortsetzung):			
Lesseri (A. silvestris×multifida) . . . . Kräftig dunkelgrün, vielblütig, leuchtendblutrot, 25—45, V—VI.	1.—	—	—
narcissiflora, ◑ △ ⚘ ≌ [K] . . . . Einfach, weiss, doldig, 2,5 cm Durchmesser, 40, V—VII.	—.50	—	—
nemorosa alba, Buschwindröschen, ● △ ≌ . . . . Weissblühend, einfach, 10—15, III—IV.	—.40	3.60	—
» **alba plena,** ● △ ≌ . . . . Weiss gefüllt, 10—15, IV—V.	—.60	—	—
» **coerulea Robinsoni,** ● △ ≌ . . . . Leicht lila, grossblumig, 15, IV—V.	—.50	4.50	—
» **rosea,** ● △ ≌ . . . . Rosa blühend, 10—15, III—IV.	—.40	—	—
Pulsatilla, Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) ○ ◑ △ [K] . . . . . . Fein zerteiltes Laub, grosskelchige Blüten vor dem Laub, hellviolett, 15—20, IV.	—.40	3.60	32.—
» **alba** („Weisser Schwan"), ○ ◑ △ [K] . . . . Weiss, 15, IV.	—.60	—	—
» **Halleri** (A. Halleri), ○ ◑ △ [K] . . . . Seidig filzig, lila, langkelchig, 20, IV.	—.50	—	—
» **Mrs. van der Elst,** ○ ◑ △ [K] . . . . Lachsrosa, 15, V.	1.—	9.—	—
» **rubra** (A. montana rubra), ○ ◑ △ [K] . . . . Dunkelblutrot, kleinblütig, schalenförmig, 30, V.	—.50	4.50	40.—
rivularis, ◑ ⚘ ≌ . . . . Weiss, aussen blau, 30—60, IV.	—.50	4.50	40.—
trifolia, ◑ △ ⚘ . . . . Blätter dreiteilig, weiss, kräftiger als A. nemorosa, 15, IV—V.	1.—	—	—
vitifolia tomentosa, ◑ ▭ ⚔ . . . . Weinblättrig, ähnlich A. japonica, lilarosa, 30, VII—IX.	—.60	5.40	—
Anemonopsis — Scheinanemone — Ranunculacee.			
macrophylla (A. japonica), ◑ ▭ ≌ . . . . Lockere Trauben, blasslila Blüten, 60—90, VII—VIII.	2.—	—	—
Antennaria — Fühlhorn — Komposite.			
aprica, ○ △ ■ . . . . Grob, weissfilzig, Blüte weiß, 15—20, V.	—.30	2.70	—
dioica tomentosa, Silberteppich ○ △ ■ □ . . . . Rasenartig, Köpfchen weiss oder rosa, nickend, 5—10, VII—VIII.	—.25	2.25	20.—
margaritacea (Anaphalis margaritacea), ○ ⚔ . . . . Flockig-wolliges Laub, weisse Immortelle, 30—60, VII—IX.	—.30	2.70	—
Anthericum — Graslilie — Liliacee.			
Liliastrum majus (Paradisia L. m., Phalangium), ◑ ⚔ ⚘ . . . . . Laub grasartig, weiss, 70—90, VI—VII.	—.60	5.40	—
ramosum (A. graminifolium), ◑ ⚔ . . . . Locker, kleinblütig, weiss, 40—60, VII—VIII.	—.40	—	—
Anthyllis — Wundklee — Papilionacee.			
Hermanniae ♄ ○ △ . . . . **m. Tb.** Dornig, holzig, gelb, 50, V.	1.—	—	—
Antirrhinum — Löwenmaul — Scrophulariacee.			
Asarina (Asarrhina Loebelii). ○○ △ ‖ . . . . **m. Tb.** Laub filzig, Blüte gelblichweiss, 25, VII—IX.	—.50	—	—
Apios — Erdbirne — Papilionaceae.			
tuberosa, (Glycine Apios), ⚲ [K] . . . . Braunrote Büscheltrauben, 200—300, IX, wuchert.	—.40	3.60	—
Aquilegia — Akelei — Ranunculacee.			
alpina, ◑ △ ‖ . . . . Lebhaft samtigblau, 20, V—VI.	1.50	13.50	—
coerulea hybrida, ◑ ▭ ⚔ . . . . Himmelblau, kurzspornig, 50, VI—VIII.	—.40	3.60	—
oxysepala, ◑ ▭ ⚔ . . . . Weisslichgelb mit Blau, langspornig, 60—80, V—VI.	—.50	—	—
truncata, ◑ △ . . . . **m. Tb.** Blüten hängend, orange mit Scharlach, 40—60, VI—VII.	—.50	—	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Arabis — Gänsekresse — Crucifere.			
albida (A. caucasica), ○ △ ⫶ # ⚘ . . . . Weiss, einfach, 15—25, V.	—.30	2.70	—
» **plena**, Levkojen-Arabis, ○ △ ⫶ # ✕ . . . . **m. Tb.** Gefüllt, weiss, duftend, 25, V.	—.40	3.60	32.—
» **variegata**, ○ △ ‖ # ⚘ . . . . **m. Tb.** Weissbuntblättrig, weissblühend, einfach, 25, V.	—.40	3.60	32.—
alpina Rosabella, ○ △ # ✕ ⚘ . . . . **m. Tb.** Grossblumig, kräftig, rosa, einfach. 15—20, IV—V.	—.50	4.50	40.—
» **rosea**, ○ △ # ⚘ . . . . Rosa, niedrig, 10—15, IV.	—.40	3.60	—
Billiardieri rosea, ○ △ ‖ # ⚘ . . . . Graufilzig, lila, 10—20, IV—V.	—.50	—	—
Carduchorum, ○ △ . . . . Rosettig, linealisch, weiss, bis 5, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
procurrens, Immergrüne Schaumkresse, ○ ◑ △ ■ # . . . . Dichte, grüne Polster, kleinblütig, weiss 25, IV—V.	—.30	2.70	24.—
Aralia — Kraftwurz — Araliacee.			
cashmeriana, (A. cachemirica) ○ ⊥ ⚘ ≌ . . . . Laub fiederig, Blüte weiss, Beere schwarz, 100, VIII—X.	1.—	—	—
cordata (A. edulis), ○ ⊥ ⚘ ≌ . . . . Früchte blauschwarz, 150, VII—IX.	1.—	—	—
Arenaria — Miere, Sandkraut — Caryophyllacee.			
grandiflora (A. triflora), ○○ △ ■ . . . . Glänzend grün, rasig, weiss, bis 10, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Griesebachii, siehe Moehringia.			
laricifolia (Alsine laricifolia), Granitmiere ○○ ⩍ . . . . Pfriemlich-sichelig, flaumig, lockerrasig, bis 30, VII—VIII.	—.40	3.60	--
Ledebouriana, ○○ △ . . . . Blaugrüne, lockere Polster, 15, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Arisaema — Rachenaron — Aracee.			
amurense ● ≌ . . . . Blätter dreilappig, Blüte grünlich, 35, VII.	1.50	—	—
Armeria — Grasnelke — Plumbaginacee.			
alpina (Statice montana), Schlernhexe, ○○ △ . . . . Blüten im Laub, tiefrosa, 20, V—VII.	—.40	—	—
caespitosa (A. juniperifolia) ○○ △ . . . . **m. Tb.** Dichtpolsterig, schmal, rosa, 5, V—VII.	—.60	—	—
formosa splendens, ○ △ . . . . Groblaubig, gross, leuchtend karminrot, 40, VI—VIII.	—.40	3.60	—
maritima (Statice Armeria), ○ △ ⫶ . . . . Lilarot, 15, V—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **alba** (A. leucocephala), ○ △ ⫶ . . . . Weiss, niedrig, 10, VI—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **Laucheana** (A. Laucheana), ○ △ ⫶ . . . . Leuchtend rosa, 10—15, V—VIII.	—.25	2.25	20.—
Arnica — Wohlverleih — Komposite.			
amplexicaulis, ○ △ . . . . Orangegelb, 30—50, VI—VIII.	—.40	3.60	—
longifolia, ○ △ . . . . Schmallaubig, gelb, 40, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Artemisia — Beifuss — Komposite.			
gnaphalioides (A. Purshiana) ○○ △ . . . . Silbergrau, 80, VII—VIII.	—.40	—	—
lactiflora, Silberraute ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Stark verzweigte Rispen, milchweiss, 150, IX—X.	—.50	4.50	40.—
mutellina (A. laxa) Edelraute ○○ △ . . . . **m. Tb.** Rasig silbergrau, gelb, 5—20, VII—IX.	—.50	4.50	—
Stelleriana, ○ ▭ . . . . Silbergrau, 50—80, VII—VIII.	—.50	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Arum — Aronstab — Aracee.			
italicum, ● ≌ +! Rote Kolben, 60, VI.	—.80	—	—
Aruncus, siehe Spiraea Aruncus.			
Asarrhina, siehe Antirrhinum.			
Asarum — Haselwurz — Aristolochiacee.			
caudatum (A. Hookeri) ● ■ # Geschwänzte Blumen, 10—20, IV—VI.	—.50	4.50	40.—
europaeum, ● ■ # Glänzend dunkelgrün, lederig, kriechend, 5—10, III—V.	—.30	2.70	—
Hartwegii (A. Hookeri majus), ● ■ # Flockig behaart, stumpfgrün, 5—15, IV—V.	—.50	—	—
Asclepias — Seidenpflanze — Asclepiadacee.			
incarnata, ○ ✲ ≌ Fleischfarben, 100, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **alba,** ○ ✲ ≌ Weiss, 100, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Asparagus — Spargel — Liliacee.			
tenuifolius, ● △ ✕ ஃ Fein, niedrig, grossfrüchtig, 30—50, VII.	—.80	—	—
verticillatus, Schmuckspargel, ● △ ✕ Kletternd, rosa, 80, V—VI.	—.80	7.20	—
Asperula — Waldmeister — Rubiacee.			
ciliata, siehe Crucianella.			
nitida, ○ △ # **m. Tb.** Zwergig, weisslichrosa, 3—5, VII—VIII.	—.60	—	—
odorata, Maikraut, ● + Wuchernd, weissblühend, 20, V—VI.	—.25	2.25	20.—
Asphodeline — Junkerlilie — Liliacee.			
lutea, ○ ⊥ ▭ # Laub dreikantig, gelb, 60—100, VI—VIII.	—.70	6.30	—
Asphodelus — Affodill — Liliacee.			
albus (A. ramosus), ○ ⊥ ▭ Laub dreikantig, weiss, 80—100, V—VI.	1.—	9.—	—
altaicus, siehe Eremurus.			
Aster — Sternblume, Aster — Komposite.			
acris (Galatella punctata) ○ ▭ ✕ Lavendelblau, 60—80, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
» **nanus,** ○ △ ▭ Niedrig, lavendelblau, 30—50, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
alpinus magnificus, ○ △ :‖: ▭ Grossblumig, satt lilablau, 15—20, V—VI.	—.30	—	—
» **Mount Everest,** ○ △ :‖: ▭ **Neu!** Hellila mit dunkelviolettem Schein, 5 cm Durchmesser, 25, VI.	—.60	5.40	—
» **Treue,** ○ △ :‖: ▭ Grossblumig, blau, 20, VI.	—.60	—	—
amellus in nachfolgenden Sorten ○ ◑ △ ✕			
» **Beauté parfaite,** tiefdunkel violett, 50, VIII—IX	—.50	4.50	—
» **Elisabeth Liemann,** tiefblau, mittelgross, straff, 50—60 VIII—IX	—.60	5.40	—
» **Goliath,** gross, hellblau, 50—70, VIII—IX	—.60	5.40	48.—
» **Hermann Löns,** klarblau, sehr gross, 50—60, IX—X	—.60	5.40	—
» **ibericus,** tief violettblau, 40—50, IX—X	—.50	4.50	—
» **Imperator,** früh, lavendelblau (King George), 60, VIII—IX	—.60	5.40	48.—
» **Kobold,** kugelig, purpurblau, 40, VIII—IX	—.60	5.40	48.—
» **Max Pohlig,** leuchtend rosa, straff, früh, 40—50, VIII—IX	—.60	—	—
» **Mignon,** sehr gross, dunkelblau, 50, VIII—IX	—.60	5.40	—
» **Otto Rudolf,** dunkellila, 40—50, VIII	—.50	4.50	—
» **Rotfeuer,** tiefdunkelrosa, 40—50, VIII—IX	—.60	5.40	—
» **rubellus** lebhaft lilarosa, 40—50, VIII—IX	—.40	3.60	32.—
» **Silberblick,** zart hellrosa, 60, IX	—.60	5.40	—
» **Sonia,** rosa, mit rotem Anflug, 60, IX	—.70	6.30	—
» **Wienholzi,** leuchtend rosafarben, wuchskräftig, 60, Ende VIII—IX	—.50	—	—
» **W. Robinson,** dunkelrosa, niedrig, 40, IX—X	—.50	4.50	40.—

Stauden

Aster (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Andersoni, ○ △ ■ Hellila Polster, 5—10, V—VI.	—.40	—	—
Chapmanni, ○ ✗ Straff, hellblau, 120—150, X.	—.40	3.60	—
dumosus hybridus Countess of Dudley, ○ △ ▭ **NEU!** Dicht, frischrosa, 40, VIII—X.	—.70	6.30	—
» **hybridus Lady Henry Maddocks,** ○ △ ▭ **NEU!** Hellrosa Blütenmassen, 40—60, VIII—X.	—.70	6.30	56.—
» **hybridus Majori,** ○ △ ▭ **NEU!** Rosalila Blütenkissen, 30—40, VIII—X.	—.70	6.30	—
» **hybridus Nancy,** ○ △ ▭ **NEU!** Zartlilarosa, 30—40, VIII—X.	—.70	6.30	56.—
» **hybridus Snowsprite,** ○ △ ▭ **NEU!** Schneeweiss, halbgefüllt, 30—50, VIII—X.	—.70	6.30	56.—
» **hybridus Sternkugel,** ○ △ ▭ **NEU!** Lilarosa, 30, IX—X.	—.70	6.30	56.—
» **hybridus Viktor,** ○ △ ▭ **NEU!** Hell-lavendelblau, 40—60, IX—X.	—.70	6.30	56.—
ericoides Erlkönig, ○ ▭ ✗ Hellrosa, kleinblumig, 80—100, X.	—.40	3.60	32.—
» **Schneetanne,** ○ ▭ ✗ Kleinblumig, schneeweiss, 100—120, IX—X.	—.30	2.70	24.—
» **White Heather,** ○ ▭ ✗ Weiss, 75, IX—X.	—.40	3.60	32.—
Farreri, ○ ▭ ✗ ❀ Schmalstrahlig, tief violettblau, Scheibe orange, 40, VI—VII.	—.40	—	—
Frikarti, ○ ▭ ✗ ❀ Gross, feinstrahlig, lavendelblau, 60—80, VIII—X.	—.50	4.50	—
himalaicus, ○ △ ❀ Lila, 20—25, V—VI.	—.40	3.60	—
horizontalis (A. diffusus horizontalis), ○ △ Breitpyramidal, weiss mit Karminrosa, 60—80, X.	—.60	—	—
hybridus luteus (Aster Linosyris × ptarmicoidex major), ○ △ ✗ Gelbe Sternchen, 30—50, VII—IX.	—.30	2.70	24.—
lichiangensis, ○ △ Rosettig, hellviolett, Scheibe schwarz, 30—50, V—VI.	—.50	4.50	—
Limprichtii, ♄ ○ ▭ Strauchig, blauweiss, 80, VII—VIII.	—.60	—	—
Linosyris, Goldschopf (Linosyris vulgaris), ○ △ ▭ ✗ ❀ Dichtbuschig, gelb, duftend, 50, VII—X.	—.40	3.60	32.—
Novae-angliae, Herbstastern in nachfolgenden Sorten, ○ ⊥ ▭ ✗.			
» **Barr's Pink,** rosa, gross, einfach, 150, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **W. Bowmann,** violettblau, 120, IX—X	—.50	—	—
Novi-belgii, Herbstastern in nachfolgenden Sorten, ○ ⊥ ▭ ✗.			
» **Blue Gem,** dunkelblau, halbgefüllt, 100, IX—X	—.40	3.60	—
» **Blütenschirm,** zart blasslila, locker, 100, IX. **NEU!**	—.80	7.20	—
» **Countess,** rosa, halbgefüllt, 100—120, IX—X	—.40	3.60	—
» **Dick Ballard,** rosa, gefüllt, 70, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Ethel Ballard,** hellrosa, gross, einfach, 120, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Glory of Colwall,** hellila, gefüllt, 150, IX—X	—.40	3.60	32.—
» **Little Boy Blue,** tiefblau, halbgefüllt, 50, IX	—.60	5.40	—
» **Nancy Ballard,** rötlich, gefüllt, 100, X	—.40	3.60	32.—
» **Queen Elisabeth,** weiss, einfach, gewellt, 100—120, IX—X	—.40	3.60	—
» **Red Star,** schön rosakarmin, 120—150, IX—X. **NEU!**	—.80	7.20	—
» **Royal Blue,** tief purpurblau, 100, IX	—.40	3.60	32.—
» **Sunset,** rosa, verfärbt nicht, 100, IX—X	—.40	3.60	32.—
Plejade, ○ △ ⫴ ▭ Niedrig, rötlich, spät, 30—40, X—XI.	—.40	3.60	32.—
ptarmicoides major, ○ △ ▭ ✗ Weiss, 40—50, VII—IX.	—.40	3.60	—
subcoeruleus, ○ △ ▭ ✗ Hellviolett, 40, V—VI.	—.30	2.70	—
» **Apollon,** ○ △ ▭ ✗ Dunkelblau, grossblumig, 30—40, VI.	—.30	—	—
» **floribundus,** ○ △ ▭ ✗ Lavendelblau, 40—50, VI.	—.30	2.70	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Aster (Fortsetzung):			
subcoeruleus Wartburgstern, ○ △ ⌐ ✕ .... Leuchtend lavendelblau, gross, 40—60, V—VI.	—.40	3.60	—
Thomsonii, ○ ▭ ✕ .... Hellila, 60, VIII—IX.	—.40	—	—
yunnanensis, ○ △ ▭ ✕ .... Dunkel lilablau, grossblumig, 40, VI.	—.50	—	—

Aster, in schönsten Sorten meiner Wahl . . 10 St. M. 3.—
100 » » 27.—
1000 » » 250.—

Astilbe — Prachtspiere — Saxifragacee.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Arendsi in nachfolgenden Sorten ○ ◑ ▭ ✕ ≌.			
» **Amethyst,** tief violettpurpurn, 60—80, VII	—.50	4.50	—
» **Bergkristall,** schneeweiss, locker, 80—100, VII	—.50	4.50	—
» **Diamant,** schneeweiss, dicht, 60—80, VII	—.50	4.50	40.—
» **Else Schluck,** leuchtend karminrot, dichte Rispe, 70—80, VII. **NEU!**	—.70	6.30	56.—
» **Fanal,** beste rote, dunkel granatrot, 40—60, VII. ..... **NEU!**	—.80	7.50	—
» **Frieda Klapp,** karmin, langrispig, 80, VIII	—.50	4.50	40.—
» **Gertrud Brix,** dunkel karminpurpur, 70, VII. ...... **NEU!**	—.70	6.30	56.—
» **Granat,** leuchtend dunkelkarmin, 100, VII—VIII	—.70	6.30	56.—
» **Grete Bücher,** gross, locker, karmin, 70, VII .... **NEU!**	—.80	—	—
» **Gunther,** reinrosa, langfederig, 80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Hyazinth,** leuchtend lilarosa, 80—100, VII .... **NEU!**	—.50	4.50	—
» **Irene Rottsieper,** lachsrosa, buschig, 50—60, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Lachskönigin,** lachsrosa, 60—80, VII	—.50	4.50	—
» **Lilli Goos,** dunkellachskarmin, locker, 80, VII. ..... **NEU!**	—.70	6.30	56.—
» **Opal,** lichtlila, breit, 70—80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Rubin,** dunkelkarmin, 100, VIII	—.60	5.40	48.—
» **Siegfried,** zart karminrosa, 70—80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Walküre,** hell karminrosa, 80, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Weisse Gloria,** rahmweiss, 40—60, VII	—.50	4.50	40.—
» **Weisse Perle,** rahmweiss, 60—80, VII—VIII	—.50	4.50	—
chinensis pumila, ○ △ ■ ≌ .... Lila, niedriges Laub, Blüten bis 30, VII—IX.	—.40	3.60	—
crispa, Zwergastilbe, ○ △ ≌ .... Rosaweiss, 10—15, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
Davidi, ○ ⊥ ✕ ≌ .... Leuchtendrot, straff, bis 180, VII—VIII.	—.50	4.50	—
grandis, ○ ⊥ ✕ ≌ .... Wuchs kräftig, milchweiss, locker, 150—200, VI—VIII.	—.50	—	—
hybrida in nachfolgenden Sorten: ○ ◑ ▭ ✕ ≌			
» **Freule van den Bosch,** dicht, dunkelrosa, 70, VII—VIII	—.50	4.50	40.—
» **Gloria purpurea,** karmin, Laub dunkel, 50—60, VII ✂	—.50	4.50	40.—
» **Holsatia,** karminviolett, 60, VII. .... **NEU!**	1.—	9.—	—
» **König Albert,** reinweiss, straff, 150, VII—VIII	—.60	—	—
» **Salland,** leuchtend karminpurpur, 120, VII—VIII	—.50	4.50	40.—
» **W. E. Gladstone,** weiss, 50, VI ✂	—.50	4.50	—
japonica hybrida in nachfolgenden Sorten: **Beste zum Treiben!** ✂			
» **hybrida Bonn,** dunkelkarminrosa, 50, VII. .... **NEU!**	—.60	5.40	48.—
» » **Bremen,** dunkellachskarmin, 50, VII. .... **NEU!**	—.60	5.40	48.—
» » **Deutschland,** blendendweiss, grossblumig, 50, VII	—.60	5.40	48.—
» » **Europa,** dicht, rein hellrosa, 40—50, VII .... **NEU!**	—.60	5.40	48.—
» » **Köln,** dunkelscharlachkarmin, dick, 50, VII	—.60	5.40	48.—
» » **Moeve,** rosakarmin, 40—50, VII	—.60	5.40	48.—
simplicifolia, ◑ △ ≌ .... Laub ungeteilt, weisslichrosa, 15—20, VIII—IX.	—.50	4.50	40.—
Taqueti, ◑ △ ■ ≌ .... Leuchtendrot, 50, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Thunbergi elegans, ○ ⊥ ▭ ✕ ≌ .... Zierlich hängend, weiss, 120, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **elegans rosea,** ○ ⊥ ▭ ✕ ≌ .... Dunkelrosa, 120, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **Moerheimi,** ○ ⊥ ▭ ✕ ≌ .... Üppig, weiss, 120, VII.	—.50	4.50	—

Astilbe, in schönsten Sorten meiner Wahl . 10 St. M. 4.—
100 » » 38.—
1000 » » 350.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Astragalus — Bärenschote — Papilionacee.			
alopecuroides, Fuchsschwanzartiger Tragant ○ ⊥ ▭ . . . . Grosses Fiederlaub, dichte, wollige Trauben, gelb, 80—100, VI.	—.80	7.20	—
angustifolius, ♄ ∞ △ . . . . **m. Tb.** Silbrig, verholzend, weiss mit Violett, bis 25, VI.	—.80	7.20	—
purpureus, ○ △ . . . . **m. Tb.** Laub sattgrün, Blüte rosapurpurn, niederliegend, 20, VI—VII.	1.—	—	—
Astrantia — Sterndolde — Umbellifere.			
major, ○ ● ⚔ ≌ . . . . An Scabiose erinnernd, rosa gestreift, 80, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Atragene, siehe Clematis.			
Aubrietia — Blaukissen — Crucifere. ✲			
deltoidea grandiflora, ○ △ ■ # . . . . Polster, lichtblau, 5—10, V.	—.25	2.25	20.—
» **graeca,** ○ △ ■ # . . . . Dunkelviolett, 5—10, V.	—.30	2.70	24.—
» **Mammut-tauricola,** ○ △ ■ # . . . . **Neu!** Dichtpolsterig, grossblumig, blau, 10, V.	—.80	—	—
Eyrei rosea, ○ △ # . . . . Leuchtend rosa, 10—15, V.	—.40	3.60	—
hybrida Dr. Mules, ○ △ # . . . . Dunkelviolett, dunkelste, 5—10, V.	—.50	4.50	—
» **Gloriosa,** ○ △ # . . . . **Neu!** Grossblumig, zartrosa, 10—15, V.	—.50	4.50	—
» **Lavendel,** ○ △ # . . . . Lavendelblau, früheste, wüchsig, blüht lange nach, 15—20, IV—V.	—.30	2.70	24.—
Leichtlini „Crimson", ○ △ # . . . . Leuchtend karminrosa, 10—15, V.	—.50	4.50	40.—
tauricola, ○ △ # . . . . Dunkelblauviolett, sehr früh, sehr niedrig, 5—10, IV—V.	—.40	3.60	32.—
Azorella — Sumpfbalsam — Umbellifere.			
pedunculata, ◑ △ ♎ # . . . . **m. Tb.** Rosettig, hellgrüne Rasenpolster, 10, VI.	—.60	5.40	48.—
trifurcata, ◑ △ ♎ # . . . . **m. Tb.** Dichte, frischgrüne Polster, lackglänzend, Blüten grünlichgelb, 10, V.	—.60	5.40	—
Bahia, siehe Eriophyllum.			
Baptisia — Wild-Indigo — Papilionacee.			
australis (Podalyria australis), ○ ▭ . . . . Lupinenähnlich, blau, 100, V—VII.	—.60	—	—
Bergenia, siehe Megasea.			
Betonica — Battunge — Labiate.			
grandiflora superba (Stachys), Scheinziest, ○ △ ▭ ⚔ ✲ . . . . . . Dichte Ähre, rotviolett, 30—40, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
officinalis glomerata, ○ △ ▭ ✲ . . . . Hellrosa, 30, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Blandfordia, siehe Galax.			
Bocconia — Federmohn — Papaveracee.			
microcarpa, ○ ◑ ⊥ . . . . Blaugrün, unterseits weiss, ornamental, üppig, weissliche Blütchen, bis 200, VIII.	—.50	—	—
Brunella — Braunelle — Labiate.			
grandiflora, ○ △ . . . . Purpurviolett, 10—20, VII—IX.	—.40	—	—
incisa, ○ △ . . . . Laub fein, violett, 20—30, VI.	—.30	2.70	—
» **rubra,** ○ △ . . . . Fein zerteiltes Laub, rote Blüten, 20—30, VI.	—.40	3.60	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Buphthalmum — Ochsenauge — Komposite.			
salicifolium, Goldmargerite, ○ ✕ [K] . . . . Doldentraubig, 3—5 cm grosse, goldgelbe Strahlenblüten, 20—50, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
speciosissimum (Telekia), ○ ✕ ≌ [K] . . . . Einköpfig, goldgelb, 60—80, VII—VIII.	—.50	—	—
Calandrinia — Bitterwurz — Portulaccacee.			
Howellii und **Leana**, siehe unter „Lewisia".			
umbellata, ◑ △ . . . . **m. Tb.** Laub schmallineal, Doldentrauben rot bis blauviolett, 15, VII—VIII.	—.60	—	—
Calimeris — Falschaster — Komposite.			
integrifolia, ○ ▭ ✕ . . . . Reichblühend, weiss, 60—80, VII—IX.	—.30	2.70	24.—
Caltha — Sumpfdotterblume — Ranunculacee.			
palustris monstrosa plena, ○ ≌ . . . . Grossblumig, fest gefüllt, gelb, 20, V.	—.50	—	—
polypetala, ○ ✲ ≌ . . . . Groblaubig, einfach gelb, 20—40, V—VI.	—.50	—	—
Calystegia — Staudenwinde — Convolvulacee.			
pubescens plena (Convolvulus japonicus plenus), ○ ⚓, 1 Stück = 10 Keime Rosa gefüllt, 100—200, VI—IX.	—.40	3.60	—
Camassia — Quamaschlilie — Liliacee.			
caucasica, ○ △ . . . . Blüte lilarosa, 40, V—VI.	—.50	—	—
Cusickii, ○ ▭ . . . . Breites, graugrünes Laub, reichblütig, hellblau, 70—90, V—VI.	—.50	—	—
esculenta (Scilla esculenta), ○ ▭ ✕ . . . . Dunkelste, tiefblau, 50—70, V—VI.	—.25	2.25	20.—
Leichtlini alba, ○ ▭ ✕ . . . . Groblaubig, grossblumig, weiß, 100, VI—VII.	—.50	—	—
» **atrocoerulea**, ○ ▭ ✕ . . . . Purpurn, 100, VI—VII.	—.50	4.50	—
Campanula — Glockenblume — Campanulacee.			
alliariaefolia (C. cordifolia), **kaukasische Waldglockenblume**, ◑ ✕ . . Buschig, milchweiss, in langen Ähren, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	—
barbata, ◑ △ . . . . Blüte bärtig, lichtblau, 20—40, VI—VIII.	—.40	3.60	—
carpatica, Karpathenglockenblume, ◑ △ ▭ . . . . Buschig, blau, reichblühend, 30—40, VII—IX.	—.40	3.60	—
» **nivea**, ◑ △ ▭ . . . . Blendend weiss, 30—40, VII—VIII.	—.40	3.60	—
celtidifolia, siehe C. lactiflora.			
collina, ◑ △ . . . . Seidig purpurn, 10—20, VI.	—.50	4.50	—
garganica, griechische Kissenglockenblume, ○ ◑ △ ⩍ :‖: [K] . **m. Tb.** Klarblau, 15, VII.	—.60	5.40	—
glomerata acaulis, ◑ △ ⩍ [K] . . . . Niedrig, dunkelviolette Kissen, 5—10, VI—VIII.	—.50	4.50	—
» **superba**, Knäuelglockenblume, ◑ △ ▭ ✕ . . . . Straff, tief dunkelviolett, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
istriaca, ◑ △ ⩍ [K] . . . . **m. Tb.** Klarblau, spitzpetalig, 15, VII.	—.50	4.50	40.—
Kolenatiana, ⊙ ◑ △ . . . . **m. Tb.** Himmelblau, 30, VII.	—.50	—	—
lactiflora (C. celtidifolia), ◑ ▭ ✕ . . . . Verzweigte, milchweisse Rispen, 75—100, VI—VIII.	—.40	3.60	—
» **coerulea**, ◑ ▭ ✕ . . . . Hellblau, 75—100, VI—VIII.	—.40	—	—
latifolia, Waldglockenblume, ● ▭ . . . . Hellviolett, 75—100, VI—VII.	—.50	—	—
persicifolia alba (C. pers. Backhousei), ○ ▭ ✕ . . . . Pfirsichblättrig, blendend weisse, edle Glocken, 75, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **grandiflora**, ○ ▭ ✕ . . . . Leuchtend blaue Form, 60—80, VII.	—.50	4.50	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Campanula (Fortsetzung):			
Poscharskyana, ◑ △ [K] . . . . **m. Tb.** Langtriebig, blau, 20—25, VI—X.	—.40	3.60	32.—
» **pulcherrima,** ● . . . . Zum Verwildern! Pyramidale, verzweigte Blütenstände, leuchtend violettblau, wuchert! 75, VII—VIII.	—.40	3.60	—
pulla, ◑ △ [K] . . . . **m. Tb.** Tief dunkelblau, 5—10, VI.	—.60	5.40	48.—
pulloides (C. pulla × turbinata) ◑ △ . . . . **m. Tb.** Kräftig wachsend, blauviolett, 10—15, VI—IX.	—.50	4.50	—
punctata (C. nobilis), ◑ △ . . . . Wuchert! Blüten nickend, rötlich, länglich, innen gefleckt, 30—40, VI.	—.40	3.60	—
pusilla (C. cochleariifolia, C. Bellardii), Zwerg-Glockenblume ◑ △ **m. Tb.** Hellblau, 10—15, VII—IX.	—.40	3.60	—
» **alba,** ◑ △ . . . . **m. Tb.** Weiss, 10—15, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
sarmatica (C. sarmentosa), ◑ △ . . . . Derbléderig, hellblau, 30—50, VII.	—.50	4.50	—
Saxifraga, ◑ △ . . . . **m. Tb.** Sehr schön enzianartig, dunkelblau, gross, 10—15, V—VI.	—.70	6.30	—
Scheuchzeri, ◑ △ . . . . Satt violettblau, bis 30, VI—VII.	—.40	3.60	—
» **alba,** ◑ △ . . . . Weiss, bis 30, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **grandiflora,** ◑ △ . . . . Reichblühend, dunkelviolettblau, 30, VI—VII.	—.50	4.50	—
turbinata alba, ○ △ . . . . Schalenförmige, weisse Blüten, 30, VI—VIII.	—.50	4.50	—
Carlina — Silberdistel — Komposite. ⊙			
acanthifolia (C. acaulis acanthifolia), ○ △ . . . . Grossblumig, gelblich, 10, VI—VIII.	—.60	—	—
acaulis caulescens, Wetterdistel, ○○ △ . . . . Flach, silberweiss, bis 20, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
Cassia marylandica, siehe unter „Laubhölzer".			
Centaurea — Kornblume — Komposite.			
bella, ○ △ ⁝‖⁝ ✿ . . . . Laub filzig, rosa, niedrig, bis 20, VII.	—.40	3.60	—
dealbata, ○○ ▭ ✕ . . . . Reichblühend, rosa, 50—70, V—VIII.	—.40	3.60	—
Kerneriana, ○ △ . . . . Trübrot, 40, VI.	—.50	4.50	—
Kosaninii, ○ ▭ . . . . Einfache Rosettenblätter, Blütenköpfe pfirsichrot, 50—70, VII.	—.50	—	—
macrocephala, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Straff, kugelig, gelb, grossköpfig, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	—
montana alba, ○ △ ✕ ✿ . . . . Weiss, 30, V—VIII.	—.30	2.70	—
» **sulfurea,** ○ △ ✕ ✿ . . . . Grossblumig, blassgelb, 30, V—VIII.	—.30	—	—
Centranthus — Spornblume — Valerianacee.			
ruber, ○ ▭ ✕ . . . . Blaugraugrün belaubt, dunkel karminrosa, 60—80, ab VI.	—.40	—	—
» **albus,** ○ ▭ ✕ . . . . Weiss, 60—80, ab VI.	—.40	3.60	—
» **coccineus,** ○ ▭ ✕ . . . . Scharlachkarmin, 60—80, ab VI.	—.40	3.60	—
Cephalaria — Schuppenkopf — Dipsacee.			
tatarica (Scabiosa elata, Succisa), ○ ⊥ . . . . Schwefelgelb, 150—200, VI—VII.	—.40	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf
Cerastium — Hornkraut — Caryophyllacee.			
alpinum lanatum, ∞ △ . . . . **m. Tb.** Weisswollig, weiss, 10—15, VI.	—.60	—	—
arvense compactum, ○ ▬ # ❋ . . . . Rasig, weiss, 5, V—VI.	—.50	4.50	—
Biebersteini, ○ △ ▬ # ❋ . . . . Weisswollig, weiss, 20, VI—VII.	—.30	2.70	24.—
candidissimum, ○ △ ▬ # ❋ . . . . Niedrig polsterig, silberweiss, weiss, 15, VI.	—.40	3.60	—
tomentosum, ○ △ ▬ ⁞‖⁞ # . . . . **m. Tb.** Ganz niedrig, echt, weiss, 10, VI—VII.	—.50	—	—
Ceratostigma — Bleiwurz — Plumbaginacee.			
Griffithi, ♄ ○ △ ▭ ∧ . . . . **Neu! m. Tb.** Laub gewellt, Blüten blau, 40, IX—XI.	1.—	—	—
plumbaginoides (Plumbago Larpentae), ♄ ○ △ ▭ ⊘ [K] . . **m. Tb.** Kupfriger Austrieb, blau, 30, VIII—X. Wuchert!	—.50	4.50	—
Willmottiae, ♄ ○ △ ▭ [K] . . . . **m. Tb.** Heller blau als C. plumbaginoides, Wuchs lockerer, 60, VIII—X.	1.—	—	—
Chelone — Schlangenkopf — Scrophulariacee.			
Lyoni, ○ ◑ ▭ . . . . Verzweigt, rosapurpurn, 30—40, VII—IX.	—.60	—	—
obliqua alba (Ch. glabra), ○ ◑ ▭ ✕ . . . . Weiss, 30—50, VIII—X.	—.40	—	—
Chiastophyllum — (Cotyledon) — Crassulacee.			
oppositifolium (Cotyledon simplicifolia), Goldtröpfchen, ◑ △ # . . . Sedumartiges Laub, Blütenstände überhängend, gelb, 20, VI—VII.	—.40	—	—
Chionodoxa — Schneestolz — Liliacee.			
Luciliae, ○ △ . . . . Zum Verwildern! Blauweiss, 12—15, III—IV.	—	—.70	—
Chrysanthemum — Margerite — Komposite.			
arcticum, Nordlands-Margerite, ○ △ ▭ . . . . Dunkelgrüne Polster, reinweiss, 5—6 cm Durchmesser, 15—25, IX—XI.	—.80	7.20	—
atratum (C. coronopifolium), ◑ △ [K] . . . . Blätter nur gezähnt, Blüten einzeln, weiss, 10—20, VII—VIII.	—.50	—	—
indicum (Chr. japonicum) Garten-Chrysanthemum, ○ ▭ ✕. Winteraster, auch für Topfkultur, in nachfolgenden Sorten:			
Altgold, goldbronzegelb, Pompon, 50, IX—X	—.50	4.50	—
Anastasia, karminrosa, Pompon, 60, IX	—.50	4.50	—
Belle Mauve, silberlila, grossblumig, 70—100, X—XI	—.50	4.50	40.—
Blanche Poitevine, weiss, spät, ✂, 40, X—XI	—.60	5.40	—
Bronze Early Buttercup, goldfarben, gross, 60—80, IX—X	—.60	—	—
Champ d'Or, glänzend leuchtend gelb, edel, 70, IX—X	—.60	—	—
Crimson Diana, braun mit Gold, kugelig, 60, X	—.60	—	—
Flamme, scharlachbronze, dahlienartig, 80, IX—X	—.60	5.40	—
Goldperle, strohgelb, Pompon, mittelfrüh, 70, X	—.60	—	—
Idi („Braune Normandie"), goldbronze, Modefarbe, 75, IX	—.60	5.40	—
La Garonne, leucht. terracottarot, 80, X	—.60	—	—
Mad. Lyobard, weiss, straff, grossblumig, ✂, 60, X—XI	—.60	5.40	—
Marg. Kiessling, goldbraun, Pompon, 30—40, VIII—IX	—.50	—	—
Normandie, rosa, reichblühend, edel, 80, IX—X	—.50	4.50	—
Pride of Cheston, purpurrot, 70—80, X	—.50	4.50	—
Purpur, purpurrot, spät, zuverlässig, 80—100, X—XI	—.50	4.50	—
Ruby King, samtig, rotbraun, 80, X	—.60	5.40	—
Toulousaine, rotbraun, Pompon, 50—60, IX—X	—.50	4.50	—
Verbesserte Miss Selby, silberrosa, Pompon, 30—50, VIII—IX . . .	—.50	—	—
Zwergsonne, goldgelb, Pompon, 50, IX	—.50	4.50	—

Chrysanthemum indicum
in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 St. . . . . M. 4.—
mit Ballen 20% Aufschlag

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
koreanum Apollo, ○ ▭ ✕ . . . . **Neu! m. Tb.** Bronzerot, einfach, grossdoldig, Mitte altgold, 60—80, IX—X.	1.50	—	—

serotinum, siehe Leucanthemum uliginosum.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Chrysoboltonia — Gattungshybride — Komposite.			
pulcherrima (Boltonia squamata×Chrysanthemum Zawadskii), ○ □ ⚔ Rosarote Margeriten, 50—70, VIII—X. **Neu! m. Tb.**	1.50	—	—
Cimicifuga — Silberkerze — Ranunculacee.			
cordifolia, ◑ □ ⚔ ≌ . . . . Grosses Laub, schlanke, weisse Kerzen, bis 150, VIII—IX.	—.60	5.40	—
japonica, ◑ □ ⚔ ≌ . . . . Dreiteiliges Laub, locker, weisse Blütenkerzen, 80, IX—X.	—.60	5.40	—
racemosa, ◑ □ ⚔ ≌ . . . . Üppig, cylindrische, weisse Kerzen, bis 200, VII—VIII.	—.60	5.40	—
simplex, ◑ □ ⚔ ≌ . . . . Weiss, stumpf, bogig, 80—100, X.	—.60	5.40	48.—
» **Armleuchter,** ◑ □ ⚔ ≌ . . . . Besonders reichblühende, verzweigte Form, 100, X.	—.70	6.30	56.—
» **serotina,** ◑ □ ⚔ ≌ . . . . Sehr spätblühende Form, 100, X—XI.	—.50	4.50	40.—
Clematis — Waldrebe — Ranunculacee.			
alpina (Atragene alpina), Alpenwaldrebe, ◑ ⚓ △ ♣ . . . . . . **m. Tb.** Blaue Glocken, schöne Samenstände, bis 200, V—VI.	1.—	9.—	80.—
» **lactea,** ◑ ⚓ △ . . . . **m. Tb.** Weiss, bis 200, V—VI.	1.50	—	—
» **roseola,** ◑ ⚓ △ . . . . **m. Tb.** Rosa angehaucht, 200—300, IV.	1.—	9.—	—
Davidiana, ◑ □ ⚔ . . . . Groblaubig, blau, 80, VII—IX.	1.50	—	—
integrifolia, ◑ △ □ . . . . Aufrecht, buschig, violettblau, nickend, 40—60, VI—VIII.	1.20	—	—
koreana (Atragene [Clematis] serratifolia) ◑ ⚓ △ . . . . **m. Tb.** Gelb, nickend, 150, X.	1.—	9.—	—
recta, ∞ ⚔ ≌ . . . . Weiss, nicht rankend, 60—100, VI—VII.	—.60	—	—
» **hispanica,** ○ □ ≌ . . . . Dunkellaubig, weiss, 80—100, VII—VIII.	—.80	—	—
» **mandschurica** ∞ ⚔ ≌ . . . . Weiss, lockerer, 60—100, VII—VIII.	—.60	—	—
» **plena,** ○ ◑ ≌' . . . . Form mit weissen, dicht gefüllten Blüten, 60—80, VII—VIII.	2.—	—	—
stans, ○ □ . . . . Laub dreiteilig, Stengel rauh behaart, blau, 150—180, IX—X. Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen".	1.20	—	—
Codonopsis — Glockenkraut — Campanulacee.			
clematidea (Glossocomia), Ampelglocke, ◑ ● □ . . . . Innen sehr interessant gezeichnete Blüte, aussen rosa, 40—60, VII.	—.40	3.60	—
Colchicum — Zeitlose — Liliacee.			
autumnale, Herbstzeitlose, ○ ◑ △ ≌ . . . . Crocusartige Blütenkelche, lilarosa, 10—15, X.	—.50	4.50	—
Bornmuelleri, Herbstzeitlose, ○ ◑ △ ≌ . . . . Grösste, dunkel rosalila, Mitte weiss, 20, IX.	—.80	7.20	—
byzantinum, Herbstzeitlose, ◑ △ +! . . . . Reichblühend, lilapurpurn, 15—25, IX.	—.50	4.50	—
Convallaria — Maiblume — Liliacee.			
majalis, grandiflora, ◑ ● ⚔ +! ≌ . . . . Keime Bekannte grossblumige, wohlriechende Maiblume, 20, V.	—	—.70	6.—
Polygonatum (Polygonatum officinale), echter Salomonssiegel, ● ⚔ +! Triebe bogig, Blüten grünlichweiss, hängend, bis 70, V—VI.	—.30	2.70	—
Convolvulus, siehe Calystegia.			
Coprosma — Kotbaum — Rubiacee.			
acerosa, ♄ ∞ △ □ . . . . Gelbholzig, 60, IX—XI.	—.70	—	—
Petriei, ○ ◑ △ ♎ # . . . . **m. Tb.** Polsterbildend, Blütchen weiss, 5—10, VII.	—.80	7.20	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Coreopsis — Mädchenauge — Komposite.			
lanceolata Golden Queen, ○ ▭ ✕ . . . . Prächtig goldgelbe Form, 60—80, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
rosea, ○ △ . . . . Rosapurpurn, bis 40, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
tripteris, ○ ▭ ✕ . . . . **Neu!** Hellgelb, 100—150, IX—X.	—.50	—	—
verticillata, ○ ▭ ♗ ✲ . . . . Gelb, Laub zierlich, bis 60, VII—X.	—.40	3.60	32.—
® » **grandiflora,** ○ ▭ ✲ . . . . **Neu!** Dunkelgelb, grossblumig, 50—70, VII—X.	—.60	5.40	48.—
Cornus — Hartriegel — Cornacee.			
canadensis ● △ ஃ . . . . **m. Tb.** Bodenbedeckend, weiss, Beeren korallenrot, 10, VI.	1.50	13.50	—
suecica, ● △ ஃ . . . . **m. Tb.** Blätter gegenständig, Scheinblüten klein, Frucht glänzendrot, 5—10, VII—VIII.	1.50	13.50	—
Coronilla — Kronwicke — Papilionacee.			
montana (C. coronata), ∞ △ [K] . . . . **m. Tb.** Gelbliche Blüten, aufrecht, 30, V—VIII.	1.50	—	—
vaginalis ∞ △ [K] . . . . **m. Tb.** Leuchtend gelb, reichblühend, niederliegend, 15, V—VI.	1.—	9.—	—
Cortusa — Glöckel — Primulacee.			
Matthioli, ◑ △ ≌ . . . . Rosapurpurn, 20—30, V—VI.	—.50	4.50	—
pubens (C. Matthioli pubens) ◑ △ ≌ . . . . Weichbehaarte Form, tiefgelappt, rötlich, 20, V—VI.	—.50	—	—
Corydalis — Taubenkropf — Fumariacee.			
lutea, Lerchensporn, ◑ △ ✲ . . . . Laub graugrün, gelber Dauerblüher, 20—30, VI—IX.	—.40	3.60	—
nobilis, ○ ◑ △ . . . . Grosslaubig, gelb mit dunklem Tupf, bis 60, IV—V.	—.50	—	—
solida (C. digitata) Finger-Lerchensporn, ● △ ✲ . . Topf mit Knöllchen Laub grün, trübpurpur, 15, III—IV.	—.40	3.60	—
Cotula — Fiederpolster — Komposite.			
dioica, ◑ △ ■ ≌ . . . . Schöne Polster, rasig 5—10, VI.	—.25	2.25	20.—
squalida (Leptinella squalida), Fiederpolster, ◑ △ ■ ≌ . . . . Rasige Polster, braungrün, gelbe Blütchen, 5, VII—IX.	—.20	1.80	16.—
Cotyledon, siehe Chiastophyllum.			
Crambe — Meerkohl — Crucifere.			
cordifolia, ○ ⊥ . . . . Grosse herzförm. Blätter, weisse Blütenschleier, bis 2 m Durchm. VI—VIII.	—.70	6.30	—
koktebelica, ○ ⊥ . . . . Stattliches Laub, Blütchen weiss, 80, VII.	—.70	—	—
maritima, ○ ⊥ . . . . Laub blaugrau, dicklich, weiss, 50, VII.	—.70	—	—
Crinum — Hakenlilie — Amaryllidacee.			
capense (Cr. longifolium) ○ ◑ ⊥ ✕ . . . . Laub graugrün, Blüte weiss, aussen rötlich, 40—60, VII—VIII.	1.50	—	—
Powellii (Amaryllis Powellii), ○ ◑ ⊥ ✕ . . . . Lilienartige Blüte, hellkarmin, 100, VII—IX.	1.—	9.—	—
» **album,** ○ ◑ ⊥ ✕ . . . . Blüten weiss, 100, VII—VIII.	1.—	9.—	—
Crucianella — Kreuzblatt — Rubiacee.			
stylosa (Phuopsis stylosa, Asperula ciliata), ○ ◑ △ . . . . Kriechend, karminrosa in köpfigen Ähren, wuchert, 15, V—VII.	—.40	3.60	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cyclamen — Alpenveilchen — Primulacee.			
coum, ● △ Laub vor den Blüten, leuchtend karmin, 6, XII—III.	—.80	7.20	—
europaeum, ● △ Karminrot, 5—10, VII—X.	—.60	5.40	—
ibericum, ● △ Laub mit schöner Silberzeichnung, sonst wie C. coum, 6, XII—III.	—.80	7.20	—
neapolitanum (C. hederaefolium), ● △ Langblättrig, Knolle oben bewurzelt, rosa, vor dem Laub, Blütenkranz geöhrt, 5—10, VII—IX.	—.70	6.30	56.—
» **album**, ● △ Weissblühende Form, sonst wie die Art.	1.50	—	—
repandum, ● △ Rundlich-blättrig, karminrosa, nach dem Laub, Knolle nur unten bewurzelt, 5—10, IV—V.	—.80	7.20	—
Datisca — Scheinhanf — Datiscacee.			
cannabina, ○ ⊥ ▭ Schöne Blattpflanze, Blüten rispentraubig, 200, VII.	—.80	—	—
Delphinium — Rittersporn — Ranunculacee.			
atropurpureum, ○ ⊥ ▭ ⚔ ❀ Sehr früh, leuchtend purpurviolett, 60—70, VI.	—.50	4.50	—
cultorum (D. hybridum), ○ ⊥ ▭ ⚔ ❀ in nachfolgenden Sorten:			
Amos Perry, halbgefüllt, straff, rosa malvenfarbig mit Hellblau, 120—160	—.50	4.50	—
Andenken an Aug. Koenemann, locker, lasur-kobaltblau, grossblumig, einfach, 150—160	—.50	4.50	40.—
Arnold Böcklin, tief enzianblau, 130—150	—.50	4.50	40.—
Belladonna Capri, einfach himmelblau, 120	—.50	—	—
» **grandiflorum**, grossblumig, hellblau, 80—100	—.50	4.50	40.—
» **Lamartine**, tief dunkelblau, einfach, 100, VII	—.50	4.50	40.—
» **Moerheimi**, reinweiss, 120—150	—.50	4.50	—
» **Mr. J. S. Brunton**, himmelblau mit weissem Auge, 90—120	—.50	4.50	40.—
» **Persimmon**, rein himmelblau, grossblumig, 100—120	—.50	4.50	40.—
Berghimmel, himmelblau mit weisser Mitte, 150—200 **NEU!**	1.—	—	—
Blue Boy, rein tiefblau mit weissem Auge, einfach, 100—150	—.60	5.40	—
Fön, rötlich dunkelblau mit schwarzem Auge, straff, 150—200 **NEU!**	4.—	36.—	—
Fr. Nagels, dunkel violettblau mit weisser Mitte, gefüllt, 150—180	—.50	4.50	40.—
Gletscherwasser, eisblau, stark verzweigt, 150 **NEU!**	2.50	—	—
Golden Gown, gross, einfach, rahmgelb, 100 **NEU!**	5.—	—	—
Havelland, kornblumenblau mit Amethyst und schneeweissem Auge, 150 **NEU!**	1.—	9.—	—
King of Delphinium, ultramarinblau mit Weinrot und weisser Mitte, halbgefüllt, 120—150	—.60	5.40	—
Kirchenfenster, tief dunkelblau, rotviolett gefüllt, Auge weiss, 150 **NEU!**	3.—	27.—	—
Lady Eleanor, himmelblau, gefüllt, lange Rispe, 100—120 **NEU!**	1.50	—	—
Lady May, rein malvenfarbig, gross, einfach, 100—120 **NEU!**	1.50	—	—
Leuchtturm, hellgrünblau mit moosgrünem Auge, 150 **NEU!**	1.50	—	—
Lize, einfach leuchtend hellblau mit weisser Mitte, 180	—.50	—	—
Mirabeau, gefüllt, leuchtend blau, Mitte rötlich, locker, 200	—.50	4.50	40.—
Nachthorn, pflaumenblau, frühe Riesenrispen, 150—200 **NEU!**	2.—	18.—	—
Purpurritter, dunkelenzian, purpurviolett gefüllt, Auge weiss, 150 **NEU!**	1.50	—	—
Tropennacht, tiefdunkel enzianblau mit Rot, Auge gross, weiss, 120 bis 150 **NEU!**	4.—	—	—
van Veens Triumph, zart lilarosa, Einzelblume sehr gross, 160	—.70	6.30	—
Violet Robinson, violettblau mit weissem Auge, gross, 100 **NEU!**	3.—	—	—

> **Delphinium cultorum**
> **aus obigen Sorten meiner Wahl** . . . . **10 Stück M. 4.—**
> **100 » » 35.—**

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
tatsienense, ○ △ Lebhaft blau, 50, VI—VIII.	—.60	5.40	48.—
Desmodium, siehe unter „Laubhölzer".			
Dianthus — Nelke — Caryophyllacee.			
alpinus, ◑ △ # [K] Glänzendgrün, rot, 5—10, VI—VIII.	—.60	5.40	—
arenarius, ○ △ ■ # Grasgrün, rasig, rosa, 15—25, VII—IX. **Duft!**	—.40	3.60	—
caesius (D. glaucus, D. gratianopolitanus), Pfingstnelke, ○ △ # **m. Tb.** Blaugrau, rosa, 5—20, V—VII.	—.80	7.20	64.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Dianthus (Fortsetzung):			
caesius arvernensis, ○ △ # . . . . **m. Tb.** Graugrün, rosa, 15—20, VI—VII.	—.50	4.50	40.—
» **splendens**, ○ △ . . . . **m. Tb.** Dunkelgrün, feurig purpurrosa, 10—15, VI—VII.	—.60	5.40	—
carthusianorum, Karthäusernelke, ○ △ ✕ . . . . Dichte Büschel, grasartig, leuchtendrot, straff gestielt, 40—50, VII.	—.50	—	—
cruentus, ○ △ # ✕ . . . . Glühend blutrote Blütenköpfe, 30—60, VII.	—.50	—	—
deltoides, Heidenelke, ○ △ # . . . . Graugrün, lockerrasig, rosa, 20, VI—VII.	—.30	2.70	—
» **albus**, ○ △ # . . . . Weiss, sonst wie die Art, 20, VI—VII.	—.40	—	—
» **splendens**, ○ △ . . . . **m. Tb.** Laub schwarzgrün, Blüten dunkelkarmin, 20—25, VI—VII.	—.50	—	—
frigidus (D. caesius frigidus), ○ △ ■ . . . . **m. Tb.** Sehr zierlich, karminrosa, 15, VI.	—.50	—	—
graniticus (D. hirtus graniticus), ○ △ [K] . . . . Rot, 10—40, VI—VIII.	—.50	—	—
Knappii, ○ △ ✕ . . . . Wenigblütige Köpfe, gelb, 40, VI.	—.50	4.50	—
microlepis, ○ ♎ # . . . . **m. Tb.** Dicht polsterig, Laub linealisch, fein gesägt, purpurrot, 10, VI—VII.	1 —	—	—
Musalae, ○ △ # [K] . . . . **m. Tb.** Tiefrosa, 2—5, VI.	1.—	—	—
nitidus, △ # [K] . . . . Rosa, scharf gezahnt, 15—40, VII—VIII.	—.50	—	—
plumarius, Federnelke, ○ △ ⁞ # ✕ **Duft! in den Sorten:**			
Diamant, gefüllt, weiss, V—VI	—.40	—	—
Marktkönigin, reinweiss, helles Silberlaub, VI	—.40	3.60	—
Roter Vorbote, karminrot, V	—.40	3.60	32.—
suavis, Duftnelke, ○ △ ♎ # . . . . **m. Tb.** Weiss, reichblühend, 20—25, V—VIII.	—.50	4.50	—
Dictamnus — Diptam — Rutacee.			
Fraxinella (D. albus), Brennender Busch ◑ ⊥ ✕ ≌ + ... Aromatische Pflanze, rote, traubige Blütenstände, 50—75, V—VII.	—.50	4.50	40.—
Dielytra (Dicentra) — Zweisporn — Fumariacee.			
eximia, ◑ △ . . . . Niedrig, blassblaugrünes Laub, schmale Blüten, tiefrosa, 30, ab VI bis Herbst.	—.40	—	—
spectabilis, Tränendes Herz, ◑ ⊐ . . . . Wirkungsvolle Schmuckstaude mit lebhaft rosa Blüten in leicht überhängender Traube. Gut zum Treiben! 50—100, V—VII.	—.70	6.—	50.—
Digitalis — Fingerhut — Scrophulariacee.			
grandiflora (D. ambigua) ◑ ▭ +! . . . . Weitglockig, hellgelb, 80—100, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
lutea ◑ ⊐ +! . . . . Zitronengelb, 60—80, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
purpurea ⊙ ◑ ▭ +! . . . . Hellpurpurn, weissgefleckt, 100—150, VII—VIII.	—.30	2.70	—
» **alba**, ⊙ ◑ ▭ +! . . . . Weisse Form, sonst wie die Art, 100—150, VII—VIII.	—.30	2.70	—
Dioscorea — Yamwurz — Dioscoreacee.			
balcanica, ◑ ⚓ . . . . Neue Art aus Nordalbanien.	—.60	—	—
quinqueloba, ○ ● ⚓ ≌ . . . . Windend, schön herzförmig belaubt, Blüte unscheinbar, grünlich, 100, VI—VII.	—.60	—	—
villosa, ⚓ △ . . . . Blätter spitz, herzeiförmig, Blüten grünlich, 80, VI—VII.	—.60	—	—
Dodecatheon — Göttergabe — Götterblume — Primulacee.			
Meadia album, ◑ ● △ ≌ . . . . Weissblühende Götterblume, 30—50, V—VI.	—.60	—	—
» **Hybriden**, ● △ ≌ . . . . Tiefgrüne Blattrosetten, cyclamenähnliche Blüten, violettrosa bis rot, 30—50, V—VI.	—.50	4.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Dondia, siehe Hacquetia.			
Doronicum — Gemswurz — Komposite.			
caucasicum, ○ ◑ ▭ ✂ ✿ ✾ . . . . Laub frischgrün, Strahlenblüten lebhaft goldgelb, 25—30, IV—V.	—.50	4.50	—
Columnae (D. cordifolium), gelbe Frühlingsmargerite, ○ ◑ ▭ ✂ ✿ ✾ Anspruchlose Art, gelb, zierlich, 40—50, V—VI.	—.40	3.60	32.—
Dorycnium — Backenklee — Leguminose.			
herbaceum, ♄ ○ △ . . . . **m. Tb.** Verholzend, kleeartig, liegend, weisslichrosa, 20—30, VI—VII.	—.60	5.40	—
suffruticosum, Backenklee, ♄ ○ △ . . . . **m. Tb.** Niederliegend, seidig behaart, weissliche Blütenköpfe, 40, IX—X.	—.60	—	—
Draba — Hungerblümchen — Crucifere.			
aizoides, ○ △ # . . . . **m. Tb.** Rosettig, Blütentrauben gelb, 5—10, III—VI.	—.50	—	—
armata, ○ △ # . . . . Gelb, 10, VI.	—.50	—	—
imbricata, ○ △ # . . . . Zierlichste Rosetten, Blüten gelb, 5, IV.	—.50	4.50	—
natolica argaea, ○ △ # . . . . **m. Tb.** Stark weichhaarig, 5—10.	—.50	—	—
olympica, ○ △ # . . . . Dachziegelige Blätter, tiefgelb, 5—10, VI.	—.50	—	—
Dracocephalum — Drachenkopf — Labiate.			
Ruyschiana, ○ △ ▭ . . . . Ganzrandig, rötlichblau, 30—50, VI—VII.	—.40	3.60	—
sibiricum, siehe Nepeta.			
virginicum, siehe Physostegia.			
Dryas — Silberwurz, Bergnymphe — Rosacee.			
Drummondi, ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Laub graugrün, gelbliche Blüte, 5—15, VI.	—.80	—	—
octopetala, ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Glänzendgrüne Polster, Blüten weiss, Fruchtstände zierend, 10, V—IX.	—.70	6.30	56.—
» **lanata,** ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Kleinblättrig, leicht behaarte Form, 5—15, VI—IX.	—.70	6.30	—
» **minor,** ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Dichtlaubig, zierlich, 5, VI—VIII.	—.70	6.30	—
» **vestita,** ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Schmallaubig, weissfilzig, 5, V—X.	—.70	6.30	—
Suendermanni (D. octopetala × Drummondi), ♄ ○ △ # . . . **m. Tb.** Üppig, Knospe gelblich, später weiss, 10—20, VI—VIII.	—.70	6.30	56.—
Echinacea, siehe Rudbeckia.			
Echinops — Kugeldistel — Komposite.			
humilis, ∞ ▭ ✂ . . . . Trockenblume Dunkelblau, kugelrund, 80, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
Ritro, ∞ ▭ ✂ . . . . Trockenblume Üppig, hellblau, 100, VI—VII.	—.50	4.50	40.—
Edraianthus (Wahlenbergia) — Krugglocke — Campanulacee.			
bosniacus, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Knäuelblütig, blau, 10—15, VI—VII.	—.60	—	—
dalmaticus, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Linealspatelig, weiss gewimpert, blauviolett, geschlitzt, 15, V—VII.	—.60	5.40	—
Kitaibelii, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Schmallinealisch, blauviolett, 10—20, V—VII.	—.60	—	—
pumilio, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Silbergraue Polster, blauviolett, 10, VI.	—.60	5.40	—
serbicus, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Grossblumig, blauviolett, 15—20, VI.	—.60	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Epimedium — Elfenblume — Berberidacee.			
alpinum, ● △ . . . . . Rot mit Gelb, 20—30, IV—V.	—.50	4.50	—
» **rubrum,** ● △ . . . . . Ganz rot, 20—30, IV—V.	—.50	4.50	40.—
discolor, ● △ # . . . . . Rotgelb, gut über dem Laub, 20—30, IV—V.	—.80	7.20	—
lilacinum, ● △ . . . . . Niedrig, hellila, gut über dem Laub, 15—25, IV—V.	—.60	5.40	—
macranthum violaceum, ● △ # . . . . . Grossspornig, opalblau, 30—40, V.	—.80	7.20	—
musschianum, ● △ . . . . . Üppig, weisslich, 40, V—VI.	—.50	4.50	40.—
niveum, ● △ . . . . . Niedrig, reinweiss, gut über dem Laub, 15—20, V—VI.	—.60	5.40	48.—
Perralderianum, ● △ # . . . . . Derblaubig, scharf sägezähnig, schwefelgelb, 20—40, IV—V.	—.80	—	—
rubrum, ● △ . . . . . Rot, Laub gröber als bei E. alpinum, 20—40, IV—V.	—.50	4.50	40.—
violaceum, ● △ # . . . . . Niedrig, veilchenblau, grossspornig, gut über dem Laub, 15—20, V—VI.	1.20	—	—
Eranthis — Winterling — Ranunculacee.			
cilicica, ◑ △ . . . . . **Topf mit Knöllchen** Fein zerteilte Kelchblätter, dunkelgelb, 8—10, II—III.	—.50	—	—
hiemalis, ◑ △ . . . . . **Topf mit Knöllchen** Grüne Blattrosette, gelb, 10—15, II—III.	—.50	—	—
Eremurus — Kleopatranadel — Lilienschweif — Liliacee. Beste Pflanzzeit: September-Oktober.			
altaicus (Asphodelus altaicus), ○ ▭ ⊡ ∧ . . . . . Hellgelbe Blütenähren, 60—80, VI.	1.—	—	—
Bungei (E. stenophyllus Bungei) ○ ⊥ ⊡ ∧ . . . . . Schmallaubig, kanariengelb, 150, VII.	2.—	18.—	—
» **intermedius,** ○ ⊥ ⊡ ∧ . . . . . Zierlich, hellorange, 150, VII.	2.—	18.—	—
» **perfectus,** ○ ⊥ ⊡ ∧ . . . . . Dunkelorange, 150, VII.	3.—	—	—
himalaicus, ○ ⊥ ⊡ ∧ . . . . . Wüchsig, hart, weiss, 150—200, V—VI.	2.—	18.—	—
him-rob (E. robustus superbus), ○ ⊥ ⊡ ∧ . . . . . Gartenhybride mit langem, schmalem, rosa Blütenstand, bis 200, V—VI.	2.50	—	—
robustus, ○ ⊥ ⊡ ∧ . . . . . Hellrosa, bis 250, V—VI.	2.50	22.50	—
spectabilis, ○ ▭ . . . . . Grünlichgelb, 100, V—VI.	1.—	9.—	—
Erigeron — Feinstrahl — Komposite.			
aurantiacus, ○ △ . . . . . Altgold, 30—40, VII.	—.50	4.50	40.—
flagellaris, ○ △ ‖ . . . . . Weiss bis rosa, wuchert, niederliegend, VI—VII.	—.50	4.50	—
hybridus Quakeress, ○ ▭ ✂ . . . . . Reichblühend, mittelgross, matt-rosalila, 50—80, VI bis Herbst.	—.40	3.60	32.—
» **Sommerneuschnee,** ○ ▭ ✂ . . . . . Weiss, zartrosa verblühend, 50—70, VI—IX.	—.60	5.40	—
macranthus superbus, ○ ▭ ✂ . . . . . Straff, tiefblau, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
speciosus semiplenus, ○ ▭ ✂ . . . . . Gefüllt wirkend, blau, 50—70, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Erinus — Leberbalsam — Scrophulariacee.			
alpinus, albus, ◑ △ ≌ . . . . . Weiss, 10—15, V—VI.	—.40	—	—
Eriophyllum — Wollblatt — Wüstengoldaster — Komposite.			
caespitosum (Bahia lanata) ○○ △ # . . . . . Grauweisse Polster, hellgelb, 15—25, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Erodium — Reiherschnabel — Geraniacee.			
chamaedryoides rosea, ◑ △ . . . . **m. Tb.** Spätblühend, rasig, zartrosa, 5—10, VII—X.	—.50	4.50	40.—
Eryngium — Edeldistel — Umbellifere.			
alpinum, Alpen-Edeldistel, ▭ ✕ ❄ . . . . Sehr zierende Blütenköpfe, blau, 60—80, VI—VIII.	—.50	4.50	—
Bourgatii, ○ ▭ ✕ . . . . Hübsch blau, 50, VII—IX.	—.60	—	—
coeruleum (E. caucasicum), ○ ▭ ✕ . . . . Kornblumenblau, stechend, 60—100, VII—VIII.	—.50	4.50	—
giganteum (E. asperifolium), ⊙ ∞ ▭ ✕ . . . . Walzige Blütenköpfe, silbrig, 50—75, VI—VIII. Trockenblume.	—.40	3.60	—
hybridum Juwel (E. Zabelii Juwel), ○ ▭ ✕ . . . . Ganze Pflanze stahlblau, 50—70, VI—VIII. Trockenblume.	—.60	5.40	—
planum, ○ ▭ ✕ . . . . Kleinköpfig, stahlblau, 150, VII—VIII. Trockenblume.	—.40	3.60	32.—
sanguisorba, ○ ◑ . . . . **NEU!** Laub ähnlich E. yuccaefolium, aber schmäler, spärlicher gezähnt und dunkler, Blüte in länglichen Köpfen wie Sanguisorba, 80, VII—VIII.	1.20	11.—	—
yuccaefolium (E. aquaticum) ○ ◑ ≌ . . . . Schön belaubt, Köpfe weisslichgrün, 70—100, VI—IX.	—.80	7.20	64.—
Erysimum — Schotendotter — Crucifere.			
Kotschianum, ○ △ . . . . **m. Tb.** Blaugrüne Rasen, Blüten hellgoldgelb, 10, V—VI.	—.80	—	—
pumilum, ○ △ . . . . Goldgelb, 15—20, V—VII.	—.50	—	—
Erythronium — Schosswurz — Liliacee.			
Dens canis, Hundszahn, ● △ . . . . Knollig, Laub gefleckt, lilapurpurn, 10—15, III—IV.	—.50	4.50	40.—
Eupatorium — Wasserdost — Komposite.			
cannabinum plenum, Kunigundenkraut, ○ ⊥ ≌ . . . . Leuchtend purpurrosa, straff, 150, VIII—IX.	—.40	3.60	—
maculatum, ○ ⊥ ≌ . . . . Blätter quirlständig, rosenrot, 150—250, VII—IX.	—.50	—	—
purpureum, ○ ⊥ ≌ . . . . Blätter quirlig, weinrot-purpurn, 100, VII—VIII.	—.60	—	—
Euphorbia — Wolfsmilch — Euphorbiacee.			
biglandulosa (E. rigida) ∞ △ # . . . . **m. Tb.** Aufrecht, ähnlich E. myrsinites, 20—40, V—VI.	—.60	5.40	—
Cyparissias, ∞ △ . . . . Grün, feinlaubig, gelb, 30—40, VI—VII.	—.40	—	—
myrsinites, ∞ △ ‖ # . . . . **m. Tb.** Schindelartig, blaugrün, gelblich, 20—40, V—VI.	—.60	5.40	48.—
polychroma, ∞ △ ▭ . . . . Dichtbuschig, gelbblühend, 50, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
Fritillaria — Kaiserkrone — Liliacee.			
imperialis „Krone auf Krone" ○ ◑ ▭ . . . . Weinrot, 60—80, III—IV.	1.—	—	—
» **rubra,** ○ ◑ ▭ . . . . Rot, 50—70, III—IV.	1.—	—	—
Meleagris, „Kiebitzei", Schachbrettblume, ○ ◑ △ . . . . Grasartiges Laub, eigrosse, nickende Blüten, gesprenkelt, 30—50, V.	—.40	3.60	—
» **alba,** ○ ◑ △ ▭ . . . . Nickend, reinweiss, 30—50, V.	—.40	3.60	—
Fuchsia — Freiland-Fuchsie. — Onagracee.			
corallina, △ ∧ . . . . **m. Tb.** Breitblättrig, reichblühend, überhängend, grossblumig karmesinrot, 50, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
gracilis, △ ∧ . . . . **m. Tb.** Hellgrün, zierlich belaubt, kleinblütig, scharlach, 50—80, VII—IX	—.50	4.50	40.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fuchsia (Fortsetzung):			
procumbens, Ampelpflanze, △ ∧ . . . . **m. Tb.** Kleinlaubig, flach, kleinblütig, grünlichgelb mit Blau, 5, VI—IX.	—.80	7.20	64.—
Riccartoniana, △ ∧ . . . . **m. Tb.** Reichblühend, kleinlaubig, dunkelgrün, kleinblütig, scharlachrot, 50—80, VII—IX.	—.70	6.30	—
Funkia (Hosta) — Trichterlilie — Liliacee. ○ ◑ ● ≌			
Fortunei (F. jap. Fortunei), ⊥ . . . . Breitblättrig, graugrün, weisslichlila Blüte.	—.50	4.50	—
» **robusta** (F. jap. Fortunei robusta), ⊥ . . . . Breitblättrig, blaugrau, robust.	—.50	4.50	40.—
» **variegata** (F. jap. Fortunei variegata). . . . . Hell-dunkel und graugrün gezeichnet, Blüte fast weiss.	—.60	5.40	—
lancifolia albo-marginata (F. jap. spathulata albo-marg.), ✕ . . . . Weiss gerandet, Blüte spät, schön dunkellila. Wuchert.	—.40	3.60	32.—
» **augustifolia** (F. jap. lanceolata), :‖: ✕ . . . . Schmallanzettlich, grünes Laub, Blüte spät, dunkellila.	—.40	3.60	32.—
» **minor alba** (F. jap. alba), :‖: ✕ . . . . Grünblättrig, weissblühend, niedrig.	—.40	3.60	—
» **tardiflora** (F. jap. maculata), :‖: ✕ ℅ . . . . Schön grünlaubig, sehr spätblühend, dunkel.	—.40	3.60	32.—
» **undulata medio-picta** (F. jap. undul. medio-picta), :‖: ℅ . . . . Weissbunte, schön gewellte Form für Topftreiberei.	—.40	3.60	32.—
» **undulata variegata** (F. jap. variegata), :‖: ℅ . . . . Weissbuntes Laub, üppig.	—.40	3.60	32.—
ovata, ⊥ . . . . Olivgrün, breit eiförmig, dunkel blühend.	—.50	4.50	—
» **albo-marginata** (F. jap. albo-marginata), ⊥ . . . . Schön weissgerandet, mittelgrosses Laub.	—.50	4.50	—
» **albo-marginata lutescens**, ⊥ . . . . Weiss- und gelbbunt.	—.60	5.40	—
» **aurea** (F. jap. aurea), ⊥ . . . . Gelber Austrieb, später grün werdend.	—.50	4.50	—
» **aurea maculata** (F. jap. aurea maculata), ⊥ . . . . Grün- und gelbbunt.	—.40	3.60	32.—
Sieboldiana gigantea (F. jap. gigantea), ⊥ . . . . Grosses, spitzes, lebhaftgrünes Laub.	—.50	4.50	40.—

Funkia, aus obigen schönsten Sorten meiner Wahl
10 St. M. 3.—, 100 St. M. 27.—, 1000 St. M. 250.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Galanthus — Schneeglöckchen — Amaryllidacee.			
plicatus, ○ △ . . . . Knöllchen Üppiges, gekieltes Laub, grossblumig, früh, 15—20, II—IV.	—	1.—	9.—
Galax — Bronzeblatt — Diapensiacee.			
aphylla (Blandfordia cordata), ●● # ≌ . . . . Laub herzförmig, mit kleinen, dichtbesetzten, weissen Blütenähren auf nackten Schäften, 20—30, V—VI.	5.—	—	—
Galeobdolon — Waldnessel — Labiate.			
luteum (Lamium Galeobdolon), Goldnessel, ● △ . . . . Blüten gelb, Laub leicht gefleckt, 20—30, V—VI.	—.50	4.50	—
Galium — Labkraut — Rubiacee.			
cinereum, ○ △ . . . . **m. Tb.** Nadelförmig, hellgraugrün, weiss in Rispen, 10—20, VI—VIII.	—.50	—	—
olympicum, ○ △ . . . . **m. Tb.** Pfriemliches Laub, weiss, 3—10, VI.	—.50	—	—
Galtonia — Riesenhyazinthe — Liliacee.			
candicans (Hyacinthus candicans), Kap-Hyazinthe, ⊙ ▭ ✕ . . . . . Grosse, weisse, häng. Glocken an langem stark. Schaft, bis 150, VII—VIII.	—.30	2.70	24.—
Gentiana — Enzian — Gentianacee.			
acaulis (G. Gentianella), Alpen-Enzian, ○ ◑ △ ≌ [K] . . . . Dunkelgrüne Blattrosette, f. Lehmboden, tiefblau grossblum., 10, IV—VI.	—.70	6.30	56.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Gentiana (Fortsetzung):			
asclepiadea, Schwalbenwurz, ◑ ▭ . . . . Blau, blattwinkelständig, 30—70, VI—IX.	—.70	6.30	—
» **alba,** Würgerenzian, ◑ ▭ . . . . Weiss, blattwinkelständig, 30—70, VI—IX.	—.70	—	—
Clusii (G. acaulis Clusii) ○ ◑ △ ≌ [K] . . . . Ähnlich G. acaulis, wüchsiger, kobaltblau, 15, IV—VI.	—.80	7.20	—
cruciata, Kreuzenzian, ○ △ . . . . Tief azurblau, aussen blaugrau, 15—50, VII—VIII.	—.70	6.30	—
dahurica, ○ ◑ △ . . . . Tief dunkelblau, 25—40, VI—VIII.	—.70	6.30	56.—
decumbens, ○ ◑ △ . . . . Lichtblauer, lockerer Blütenquirl, 10—25, VI.	—.60	5.40	—
Farreri (G. ornata *Hort.*) ◑ △ **NEU!** . . . . **m. Tb.** Gross, prächt. methylblau, aussen purpurn u. hell gestreift, 15—25, VIII-X.	1.50	—	—
lutea, Gold-Enzian, ○ ▭ ≌ + ... Laub hellgrün, breitelliptisch, gelb, quirlständig, 50—100, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
pannonica, ○ △ . . . . Trübpurpurn, dunkelgepunktet, Röhre gelblich, bis 50, VII.	—.70	6.30	—
Purdomii, ◑ △ . . . . Laub dunkelgrün, tiefblau, 15—20, VII—VIII.	—.80	—	—
septemfida cordifolia, ○ ◑ △ . . . . Laub dunkel, kornblumenblau, 20—30, VII—VIII.	—.60	5.40	48.—
» **lagodechiana,** echt, ○ ◑ △ . . . . Laub hellgrün, blau, niederliegend, 20—30, VII—IX.	—.70	6.30	—
tibetica, ○ ◑ △ . . . . Grossblättrig, robust, weisslich, klein, 40—50, VI—VII.	—.60	5.40	48.—
Geranium — Storchschnabel — Geraniacee.			
armenum, ○ △ ▭ . . . . Grossblumig, karminrot, 50—70, VI—VIII.	—.60	—	—
Endressi, ○ △ . . . . Zart rosa, purpurn geadert, 30—50, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
grandiflorum, ○ △ ▭ . . . . Tief violettblau, grossblumig und reichblühend, 30, V—VII.	—.40	3.60	—
macrorrhizum, ○ ▭ . . . . Groblaubig, rot, doldenartig, 40—60, V—VI.	—.40	3.60	—
platypetalum, ○ ▭ . . . . Leuchtend hellblau mit Purpur, grossblumig, 60, VI.	—.50	4.50	—
pratense album, ○ ▭ . . . . Beste weisse Form, 50, VI—VIII.	—.40	3.60	—
sanguineum, ○ △ . . . . Niederliegend, Laub dunkel, dunkelkarmin, reichblüh., 15—20, V—VIII.	—.40	3.60	—
» **album,** ○ △ . . . . Weisse Form, 20—25, V—VIII.	—.40	3.60	—
Geum — Nelkenwurz, Erdwurz — Rosacee.			
Borisii, ○ △ ⊐ ✂ . . . . Leuchtend mennigrot, Dauerblüher, 40, V—IX.	—.40	3.60	32.—
coccineum hybridum atrosanguineum, ○ ▭ . . . . Grobes, erdbeerartiges Laub, dunkelrot, 60—70, VII.	—.40	3.60	—
» **maximum,** ○ △ ▭ ✂ . . . . Grosses Laub, Blüte rot, gross, 50, V—VIII.	—.50	4.50	—
montanum, ◑ △ ≌ ☘ . . . . Goldgelb, Laub rosettig, Fruchtstände zierend, 20—30, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
Rossii, ◑ △ ≌ . . . . Laub feingefiedert, schwefelgelb, 15—20, V.	—.60	5.40	—
speciosum, ◑ ▭ . . . . Laub rosettig, gelb, 30—40, VI.	—.50	—	—
Gillenia — Baumannswurzel — Rosacee.			
trifoliata, Dreiblattspiere, ○ ◑ ⊥ ✂ . . . . Laub bräunlich, straff, weisslich rosa in lockeren Rispen, 100—120, VI—VII.	—.50	4.50	40.—
Glechoma — Gundermann — Labiate.			
hederacea (Nepeta Glechoma), ● ⊥ △ ⚘ . . . . Schnellwachsender Kriecher, lilarot, 10, V.	—.30	2.70	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Globularia — Kugelblume — **Globulariacee.**			
cordifolia alba, ♄ ○ △ ♎ # . . . . **m. Tb.** Niederliegend, weiss, 5—10, V—VI.	—.70	6.30	—
Glossocomia, siehe Codonopsis.			
Gnaphalium, siehe Leontopodium.			
Gunnera — Peru-Rhabarber — **Halorrhagidacee.**			
magellanica, ◑ △ Λ . . . . Kleinblättrig, rasig, 10—20, VI—VII.	1.—	9.—	—
manicata, ○ ⊥ ≅ Λ . . . . Wuchtiges Laub, lockerer Wuchs, prächtige Blütenkolben, 150—300, VII.	4.—	—	—
scabra (G. chilensis), Nesselschirm ○ ⊥ ≅ Λ . . . . Rauh, gedrungen wachsend, Blüte im Laub, 150—200, VII.	4.—	—	—
Gymnandra, siehe Lagotis.			
Gypsophila — Gipskraut — **Caryophyllacee.**			
aretioides, ∞ ‖ ♎ . . . . **m. Tb.** Kugelpolster, starr, hart, weisslila, 3—5, VI.	—.70	—	—
» **caucasica,** ∞ ‖ ♎ . . . . **m. Tb.** Blaugrün, sehr klein, weisslila, 3, VI.	—.70	6.30	—
curvifolia, ∞ △ ‖ . . . . **m. Tb.** Rot, 10—15, VI.	—.80	—	—
hybrida Rosenschleier . . . . **NEU! m. Tb.** Dichte Wolke schön weiss-rosa Blüten, 25—35, VII—IX.	—.80	7.20	—
libanotica, ○ △ ■ # 𐂷 . . . . Weisses Sternpolster, 20—30, VI.	—.40	3.60	32.—
nana, ○ △ ‖ . . . . **m. Tb.** Lockerrasig, Blüten gross, rosa, 10, VII—VIII.	—.80	—	—
paniculata, Schleierkraut, ○ ⊥ ▭ ✗ . . . . Graues, feines Laub, weisse Blütenschleier, auch als Trockenblume, 100, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
» **Bristol Fairy,** ○ ⊥ ▭ ✗ . . . . Wuchs kräftig, reinweiss, dicht gefüllt, doppelt so gross wie plena, 100, VII—IX.	—.80	—	—
» **plena,** ○ ⊥ ▭ ✗ . . . . Dichtgefüllt, weiss, auch Trockenblume, 100, VII—IX.	—.80	7.20	—
repens monstrosa, ○ △ # 𐂷 . . . . Kriechend, weiss, grossblumig, 25—30, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
» **rosea,** ○ △ # 𐂷 . . . . Feinlaubig, rosa Teppich, 15—20, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
Suendermannii (G. repens × transsilvanica), ○ △ # 𐂷 . . . . Weisse Rispen, 15—20, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Haberlea — (Tertiärzeitrelikt) — **Gesneriacee.**			
rhodopensis, ◑ △ ‖ # . . . . Schöne Blattrosetten, hellblauviolett, 5, V—VI.	1.20	11.—	—
Hacquetia — Schaftdolde — **Umbellifere.**			
Epipactis (Dondia Epipactis), ● ■ . . . . Grundblätter handförmig, Blüten gelbgrün, 10—20, III—IV.	—.70	—	—
Harpalium — Sonnenrose — **Komposite.**			
rigidum Daniel Dewar (Helianthus scaberrimus) ○ ▭ ✗ je 5 Keime Wüchsig, reichblühend, dunkel goldgelb, 150, VII—X. Wuchert!	—.40	3.60	—
Hedera, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Hedysarum, siehe unter „Laubhölzer".			
Helenium — Sonnenbraut — **Komposite.**			
autumnale aurantiacum, ○ ▭ ✗ . . . . Ganze Blüte goldgelb, gross, 60, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
» **Crimson Beauty,** ○ ▭ ✗ . . . . **ECHT!** Auffallend, kupfrig, 40—50, VII—IX.	—.80	—	—
» **Gartensonne,** ○ ▭ ✗ . . . . Goldgelb mit samtbrauner Mitte, 120—150, VIII—X.	—.50	4.50	—
» **praecox Baronin von Linden,** ○ ▭ ✗ . . . . Dunkelbraun mit Bronze, gross, 80—100, VII—IX.	—.50	4.50	40.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Helenium (Fortsetzung):			
Ⓜ **autumnale praecox Hessei,** ○ □ ✕ . . . . **NEU!** Straff, reingelb, dichte Blütenstände, 100—120, VII—IX.	—.80	7.20	—
» **pumilum magnificum,** ○ □ ✕ . . . . Ganze Blüte hellgelb, 60, VII—IX.	—.40	3.60	—
» **Riverton Gem,** Goldlack-Helenium, ○ □ ✕ . . . . Goldlackrot, 120—150, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
Ⓜ **Bigelowi superbum.** ○ □ ✕ . . . . **NEU!** Goldgelb mit schwarzer Mitte, grossblumig, reichblühend, windfest, 40—60, VII—IX.	—.50	4.50	40.—
grandicephalum Julisonne, ○ □ ✕ . . . . Mitte kugelig, schwarzbraun, dunkelgelb, 80—100, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Hoopesii, ○ □ ✕ . . . . Gut belaubt, orangegelb, früh, 60—80, V—VI.	—.40	3.60	32.—
hybridum Moerheim Beauty, ○ □ ✕ . . . . Feurigrotbraun, 60—80, VI—VIII.	1.—	—	—
Helianthemum — Sonnenröschen — Cistacee ♄.			
amabile Blutströpfchen, ○ △ ✲ . . . . Neu! **m. Tb.** Reichblühend, gross, rot, einfach, 30, V—VI.	—.60	5.40	—
aurantiacum plenum, ○ △ :‖: . . . . **m. Tb.** Gefüllt, orangefarben, 15, V—VII.	—.50	4.50	40.—
chamaecistus, ○ △ :‖: ✲ ♎ . . . . **m. Tb.** Laub grün, gelb, einfach, 10—15, V—VI.	—.40	3.60	32.—
formosum, siehe Cistus unter „Laubhölzer".			
hirtum, ○ △ :‖: ✲ . . . . **m. Tb.** Laub graugrün, oval, schön dunkelrosa mit Lachsschein, einfach, 15—20, VI—VII.	—.40	3.60	—
hybridum amabile plenum (H. Rubin), ○ △ :‖: . . . . . . **m. Tb.** Laub dunkelgrün, Blüten gefüllt scharlachrot, 20—30, V—IX.	—.40	3.60	32.—
» **Golden Queen,** ○ △ :‖: ✲ . . . . **m. Tb.** Grossblumig, einfach goldgelb, 30—40, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
» **sulfureum plenum** (H. Gelbe Perle), ○ △ :‖: . . . . **m. Tb.** Lebhaft gelbe, dichtgefüllte Blumen, 15—20, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
» **Watergate Orange,** ○ △ :‖: # ✲ . . . . **m. Tb.** Laub silbrig, einfach orange, 20—30, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
mutabile album plenum, ○ △ :‖: . . . . **m. Tb.** Gefüllt, weiss, 15, V—VII.	—.50	4.50	—
polifolium, ○ △ :‖: ✲ . . . . **m. Tb.** Einfach weiss, 40, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
» **mutabile atrosanguineum,** ○ △ :‖: # ✲ . . . . **m. Tb.** Laub silbrig, blutrot, einfach, 20—40, ab Ende V.	—.40	3.60	32.—
roseum, ○ △ :‖: ✲ . . . . **m. Tb.** Einfach rosa, Laub grob, glänzendgrün, 20, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
serpyllifolium, ○ △ ♎ ✲ . . . . **m. Tb.** Thymusblättrig, einfach gelb, 10, VI—VII.	—.50	4.50	—

Helianthemum, in schönsten Sorten meiner Wahl
10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

Helianthus scaberrimus, siehe Harpalium.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Helichrysum — Strohblume — Komposite.			
bellidifolium, ○○ △ ⋀ . . . . **m. Tb.** Laub silbrig, weiss, einzeln, 10, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
Heliopsis — Sonnenauge — Komposite.			
scabra plena zinniaeflora, ○ □ ✕ . . . . Gefüllt gelb, straffstielig, dauerhaft, 60—80, VII—IX.	—.40	3.60	—
Heliospermum, siehe Silene.			
Helleborus — Nieswurz — Ranunculacee.			
corsicus, ● # . . . . Laub wertvoll, dickblättrig, Blüte grünlich, gelblichweiss, 40—50, XI—III.	1.20	—	—
foetidus, ◑ # . . . . Ästig, Blüten grün mit Rot, 40—60, III—IV.	—.70	—	—
hybridus, gemischt, ● # ✕ . . . . Schönes Farbenspiel, weiss bis blutrot, 50, II—III.	—.80	7.20	—
niger grandiflorus, Christrose, Schneerose, ●● △ □ # ✕ ✲ . . . Grossblumig, reinweiss, 15—30, XII—III.	—.70	6.30	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Helonias — Sumpfnelke — Liliacee.			
bullata, ◑ ⌗ ≅ . . . . . Tiefgrünes Laub, dichte, rosa Blütenähre auf nacktem Schaft, 50—70, V—VI.	1.—	—	—
Heloniopsis — (Sugerokia) — Liliacee.			
japonica, ◑ ● △ ⌗ . . . . . Laub rosettig, lanzettlich, rosa, 15—20, IV.	—.60	5.40	—
Hemerocallis — Taglilie — Liliacee. ○ ◑ ▭ ✕ ≅			
fulva . . . . . Blumen gross, weit geöffnet, braunrot, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» plena . . . . . Gefüllt, ziegelorangerot, 75—85, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
» variegata . . . . . Buntblättrig, 120, VII—VIII.	—.40	—	—
hybrida Apricot . . . . . Aprikosenfarbig, 50—70, V—VII.	—.40	3.60	32.—
» Aureola . . . . . Hellgoldgelb, früh, 60—80, V—VII.	—.40	—	—
» Dr. Regel (H. Middendorffii) . . . . . Zierlich belaubt, tief orangegelb, 70, V—VI und Herbst.	—.50	4.50	—
» Gold Dust . . . . . Sehr reichblühend, dunkelgelb, 150, VI—VII.	—.40	3.60	—
» luteola . . . . . Rein zitronengelb, 70, VII.	—.50	4.50	—
» Margaret Perry . . . . . Neu! Leuchtend orange bis scharlach, 90, VI—VIII.	1.25	—	—
» Queen of May . . . . . Orangegelb, 90, V—VI.	—.50	4.50	—
» Sovereign . . . . . Robust, straff, hell orangegelb, 90, V—VI.	—.40	3.60	—
Sieboldi (H. Dumortieri) . . . . . Satt kadmiumgelb, aussen bräunlich, 40—50, V—VI.	—.40	3.60	—
Hepatica — Leberblümchen — Ranunculacee.			
angulosa, ● △ . . . . . Hellblau, 10—15, IV.	—.60	5.40	—
» coerulea, ● △ . . . . . Dunkel himmelblau, 15, IV.	—.60	—	—
» rosea, ● △ . . . . . Rosa, 15, IV.	1.—	—	—
triloba coerulea, ● △ . . . . . Blau, 10—15, III—IV.	—.50	4.50	40.—
» rubra, ● △ . . . . . Rot, 10—15, III—IV.	—.60	5.40	48.—
Herniaria — Bruchkraut — Caryophyllacee.			
glabra, ○ △ ■ . . . . . Grün, mit winzigen, gelbgrünen Blüten in Knäueln, 5, VI—IX.	—.30	2.70	—
Heuchera — Granatrispe, Purpurglöckchen — Saxifragacee.			
americana purpurea, ● ▭ ✕ 🐝 . . . . . Rosa, 40—60, V—VI.	—.50	—	—
brizoides gracillima, ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Zierlich, rosa Rispen, 40—60, V—VI.	—.50	4.50	—
» gracillima superba, ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Dunkelrosa, wüchsig, 60—80, V—VI.	—.60	5.40	—
» Poësie, ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Reichblühend, zartrosa, 60—80, V—VI.	—.50	4.50	—
hybrida Clocheton, ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Grossblumig, leicht karminrosa, 40, V.	—.60	—	—
» Grenade, ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Reichblühend, rot mit Karmin, zierlich, 40, V.	—.60	—	—
» Plejade, ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Grossglockig, dunkelgranatrot, leuchtend, 50—60, V.	—.60	—	—
» Radium, ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Dicht, hell und lebhaft karmin, 40, VI.	—.60	—	—
tiarelloides, ◑ ▭ ✕ . . . . . Sternblütchen, hellrosa, 50—60, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
» alba ◑ ▭ ✕ 🐝 . . . . . Form mit zierlichen, weissen Blütensternchen, 50—60, V—VI.	—.60	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hieracium — Habichtskraut — Komposite.			
aurantiacum, ○ △ ⚘, zum Verwildern! . . . . Grünblättrig, orange, 50, VII—IX.	—.30	2.70	—
» **lanatum**, ○ △ . . . . Laub zottig behaart, gelb, 40, VI—VII.	—.40	—	—
rubrum, ○ △ ⚘ . . . . Blüten einzeln, dunkelorange, wird nicht lästig, 20—30, VI—VIII.	—.30	2.70	—
villosum, ○ △ . . . . Silberweiss, zottigwollig, Blüten gelb, 1—3köpfig, 20—25, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
Hosta, siehe Funkia.			
Houstonia — Tausendsternchen — Rubiacee.			
serpyllifolia, ◑ ● △ ■ . . . . Zierliche Blütenpolster, himmelblau, 5—10, V.	—.25	2.25	20.—
Humulus — Hopfen — Urticacee.			
lupulus aureus, ○ ⚓ . . . . **m. Tb.** Gelblaubiger Schlinger, 200—300, VII.	1.—	—	—
Hutchinsia — Gemskresse — Crucifere.			
Auerswaldi, ○ △ # ■ . . . . Dichtrasig, blendendweiss, 3—5, IV—V.	—.40	—	—
Hyacinthus (Muscari) — Trauben- oder Bisamhyazinthe — Liliacee.			
botryoides, Perlhyazinthe, ○ ◑ △ . . . . 1000 St. M. 24.— Knöllchen Blau, 15, IV—V.	—	—.30	2.70
» **albus**, ○ ◑ △ . . . . Knöllchen Weiss, 15, IV—V.	—	—.50	4.—
candicans, siehe Galtonia.			
comosus, ○ ◑ △ . . . . Blau, 40—60, VI—VII.	—.40	3.60	—
racemosus, ○ ◑ △ . . . . Dunkelblau, duftend, 20—30, V—VI.	—.40	3.60	—
Hylomecon (Stylophorum) — Waldmohn — Papaveracee.			
japonica (H. vernalis), ● △ . . . . Goldgelb, 20—25, IV—VI. Frisch humoser Standort.	1.—	9.—	—
Hypericum — Hartheu — Hypericacee.			
polyphyllum, ○ △ # . . . . **m. Tb.** Goldgelb, 10—15, ab V.	—.40	3.60	32.—
Ⓐ » **grandiflorum**, ○ △ # . . . . **NEU!** **m. Tb.** Laub blau, grossblumig, gelb, Knospen kupfrig, 10—15, ab V.	—.70	6.30	56.—
reptans, ◑ △ # ∧ . . . . **m. Tb.** Kleinblättrig, kriechend, gelb, 5—10, VI—VII.	—.50	4.50	—
Hyssopus — Ysop — Labiate.			
officinalis, ♄ ○ △ + ... Aromatisches Laub, blaue Rispen, 40—60, VIII.	—.50	—	—
Iberis — Schleifenblume — Crucifere ♄.			
corifolia, ○ ◑ △ ⫶ # . . . . Weiss, nicht verblauend, 20—30, VI.	—.40	3.60	—
saxatilis, ○ △ # . . . . Weiss, Laub fein, 15—20, V.	—.50	4.50	—
sempervirens Little Gem (Weisser Zwerg), ○ △ ♎ ⫶ # . . . . . . Sehr niedrig, zierlich, weiss, 15, V.	—.40	3.60	32.—
» **Schneeflocke**, ○ △ ⫶ # . . . . Reichblühend, grossblumig, blendend weiss, 20—40, V.	—.40	3.60	32.—
Incarvillea — Freiland-Gloxinie — Bignoniacee.			
Delavayi, ○ △ ▭ ✂ . . . . Stattliche, gefiederte Belaubung, tief rosenrot, verzweigt, 50—75, V—VI.	—.40	3.60	32.—
grandiflora, ○ △ ▭ . . . . Grundständige Blattrosette, hellkarminrot, 10—15, V.	—.30	2.70	24.—
» **brevipes**, ○ △ ▭ . . . . Üppiges Laub, hellkarmin, lebhaft, 15—25, V.	—.60	5.40	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Inula — Alant — Komposite.			
ensifolia, ○ △ . . . . Kugeliger Busch, klargelb, 20—30, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Helenium, ○ ⊥ ▭ . . . . Laub gross, herzförmig, gelb, 100—200, VIII.	—.60	—	—
montana, ○ △ ▭ ✕ . . . . Gelb, 20—40, VII.	—.40	3.60	—
Royleana, ○ ⊥ ▭ . . . . Ovale Grundblätter, Strahlenblüte einzeln, gross, gelb, 50, VI—IX.	—.50	4.50	—
Iris — Schwertlilie — Iridaceae.			
chrysographes, Hybriden, ○ ✕ ≅ . . . . Laub grasartig, samtigpurpur mit Gold, 50—70, VI.	—.50	4.50	—
cristata, ○ △ ■ ≅ . . . . Einblütig, zart amethystblau mit Weiss und Orange, 5—10, IV—V.	—.80	7.20	—
ensata, ○ ▭ ✕ ≅ . . . . Lebhaft violett, dunkel geadert, Schlund hell, 50—75, VI.	—.40	3.60	—
foetidissima variegata, ○ △ # . . . . Laub weissbunt, blau, 75, VI.	1.—	9.—	—
Forrestii, △ ▭ ✕ ≅ . . . . Tracht wie I. sibirica, Blüten lebhaft gelb, 50, V—VI.	—.50	—	—
germanica-Hybriden in nachfolgenden Sorten: ∞ ▭ ✕			
D. = Dom, H. = Hängeblätter.			
Ambassadeur, violett, D. heller, 60, VI.	—.60	—	—
aurea, D. kanariengelb, H. gelb, zart geadert, 80, VI.	—.40	—	—
Eckesachs, lavendelblau, gross, 75, V	—.50	4.50	—
Eldorado, D. feurig kupfrig orange, H. heliotrop und purpurviolett, in weinroten Rand übergehend, 80, VI.	—.60	—	—
Florentine, reinweiss, 60, V.	—.40	—	—
Folkwang, D. rosa, H. weinrot mit braungelber Aderung, 50—70, VI.	—.60	—	—
Fontarabie, gross, dunkelpurpur mit Lila, 40, VI.	—.60	—	—
Gajus, D. reingelb, H. weissgrundig, dunkelpurpur geadert, zart gelb umrandet, 50, VI.	—.40	3.60	—
Hortense, D. hell schwefelgelb, H. weisslich gelb, bräunlich geadert, 60—80, V—VI.	—.40	—	—
Kharput, gross, dunkelviolett, 50, V—VI.	—.50	—	—
Lent A. Williamson, D. rötlichviolett, H. dunkel samtviolett, 100, VI.	—.60	5.40	—
Lohengrin, hellblau mit Hellviolett, kräftiges Laub, 70, VI.	—.60	—	—
Loreley, D. hellgelb, H. rahmfarben mit Purpurblau, 40, V	—.60	5.40	—
Madame Chéreau, milchweiss, azurblau gerandet, 90, VI.	—.40	3.60	—
major, D. ultramarinblau, H. dunkler, 80, V	—.50	—	—
odoratissima, hell-lichtblau, 100, VI.	—.50	4.50	—
Pfauenauge, D. kupfrig gelb, H. mit lila Fleck, 80, V	—.50	—	—
Prinzess Victoria Luise, D. gelb, H. lila-mauve mit gelbem Rand, 60—70, VI.	—.40	3.60	—
Prosper Langier, D. hell schokoladefarbig, goldig getönt, H. schwärzlich blutrot mit gelblichem Rand, 60, VI.	—.60	—	—
Purple King, dunkelpurpur, 50—70, VI.	—.50	—	—
Queen of May, rosalila, 50—70, V—VI.	—.50	4.50	—
Reine des Belges, weissgrundig mit dunkellila Aderung, 60, VI. . .	—.40	—	—
Rheingauperle, zartrosa, D. heller, 70, V—VI.	—.60	—	—
Rheinnixe, D. reinweiss, H. tief veilchenblau mit weissem Rand, 100, V—VI.	—.40	3.60	—
Rheintraube, D. rein lavendelblau, H. purpurviolett, 80, V—VI. . . .	—.60	—	—
Riese von Cönnern, Laub hell, lavendelblau, gross, 80, VI.	—.60	—	—
Tom Tit, tief dunkelpurpur lilablau, 50—70, V—VI.	—.50	—	—

> **Iris germanica,** in Sorten meiner Wahl
> 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
hexagona, ○ ≅ . . . . Dunkelblau, 60, VI.	—.40	3.60	—
» **Lamancei,** ○ ≅ . . . . Lilablau, 60, VI.	—.40	3.60	—
interregna in nachfolgenden Sorten: ○ ▭ ✕			
Brunette, elfenbein mit gelbem, rot geadertem Grund, 40, V.	—.40	—	—
Charmant, hell lavendelblau, 50, V.	—.40	3.60	—
Dorothea, hell cattleyenfarbig im Grunde dunkler, 50, V.	—.40	3.60	—
Freya, perlfarbig, violett geflammt, 40, V.	—.40	—	—
Gerda, D. schwefelgelb, H. etwas heller, 40, V.	—.40	3.60	—
Prince Victor, D. purpurblau, H. etwas dunkler, 50, V.	—.40	3.60	—
Royal, blau, 40, V.	—.40	—	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Iris (Fortsetzung):			
Kaempferi-Hybriden, Japan-Iris ○ ▭ ≌ ⚔ in nachfolgenden Sorten:			
Andrassi, rötlich violett, weiss geadert, Rand dunkler, Mitte gelb, gross, gewellt, 70, VII	—.80	—	—
lilacina, lavendellila mit langem gelbem Mittelfleck, reichblüh., 70, VII	—.80	7.20	—
Montblanc, weiss, 3petalig, schlank, 70, VII	—.80	—	—
Sämlings-Hybriden, helle und dunkle Farben gemischt, ohne Namen	—.60	5.40	48.—
lacustris, ○ △ ≌	—.80	7.20	—
Blau, ähnlich I. cristata, in allen Teilen kleiner, 10, V—VI.			
orientalis (*Thbg.*, nicht *Miller*), ○ ▭ ⚔ ≌	—.40	3.60	32.—
Buschig, feinlaubig, blau, kleinblumig, 80—120, VI.			
» **Snow Queen,** ○ ▭ ⚔ ≌	—.40	3.60	32.—
Reinweisse Form, 80—120, VI.			
pallida argenteo-variegata, ○ ⊥ ∧	1.—	—	—
Weissbuntes Laub, hellila Blume, 80, V.			
(R) **pumila,** Steppen-Iris, ○ △	—.30	2.70	24.—
Auf der Halbinsel Krim am natürlichen Standort gesammelt. Ganz niedrige Naturhybriden, Farbtöne von Blau, Violett, Gelb und Braun, 10—20, V—VI.			
» **hybrida coerulea,** ○ △ ⁞	—.40	3.60	32.—
Lichtblau, 15, IV—V.			
» **hybrida cyanea,** ○ △ ⁞	—.25	2.25	18.—
Dunkelviolett, 15, IV—V.			
» **hybrida Die Braut,** ○ △ ⁞	—.40	3.60	—
Reinweiss, 15, IV—V.			
» **hybrida eburnea,** ○ △ ⁞ ⚔	—.40	—	—
Reinweiss, 20—25, IV—V.			
» **hybrida florida,** ○ △ ⚔ ⁞	—.40	—	—
Gelb mit Oliv, 20—25, IV—V.			
sibirica coerulea, ○ ≌ ⚔	—.40	3.60	—
Laub grasartig, blau, 60—70, VI.			
» **Phosphorflamme,** ○ ≌ ⚔ . . . **Neu!**	1.—	9.—	—
Tief dunkelblau mit hell phosphorblauer Zunge, 70, VI.			
transsylvanica, ○ ≌ ⚔	—.40	3.60	—
Gelb, 80—120, VI—VII.			
Jeffersonia — Berberidacee.			
dubia, ◑ △ #	1.—	—	—
Laub metallisch glänzend, wellig, lichtblau, 20—30, V.			
Kirengeshoma — Wachsglocke — Saxifragacee.			
palmata, ● ≌ . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Laub grob, handförmig, gelb, 50—70, VIII—IX.			
Kniphofia, siehe Tritoma.			
Lagotis — Scrophulariacee.			
stolonifera (Gymnandra), ○ ◑ △	—.70	—	—
Laub grundständig, Blüten blau, 30, VI.			
Lamium, siehe Galeobdolon.			
Lathyrus — Wicke, Platterbse — Papilionacee.			
latifolius roseus, ○ ⊥ ⚔	—.60	—	—
Kräftig gestielt, rosa, geruchlos, 120—150, VI—VIII.			
» **Weisse Perle,** ○ ⊥ ⚔	—.60	5.40	—
Grossblumig, reinweiss, geruchlos, 120—150, VI—VIII.			
lathyroides und **vernus,** siehe unter „Orobus".			
Lavandula — Lavendel — Labiate.			
spica, ♄ △ ▭ ♜ # +	—.40	3.60	32.—
Mit zahlreichen, lavendelblauen Ähren, 60, VII—VIII. Duft!			
Leontopodium — Edelweiss — Komposite.			
alpinum (Gnaphalium Leontopodium), Alpen-Edelweiss, ○ △ [K]	—.40	3.60	32.—
In ungedüngtem Boden besonders schön weisse Blütensterne, 15, VI—VII.			
himalaicum, ○ △ [K]	—.40	—	—
In allen Teilen gröber als das Alpen-Edelweiss, 15—25, VIII.			
sibiricum, ○ △ [K]	—.40	3.60	—
Üppige Form mit grossen Blumen, 20, VII.			
» **altaicum,** ○ △ [K]	—.40	—	—
Auffallend grosse Sterne, 20, VII			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Leptinella, siehe Cotula.			
Leucanthemum — Margerite — Komposite.			
maximum Esther Read, ○ ▭ ✕ . . . . Neuheit! Vollkommen dicht gefüllt, gross, reinweiss, 70, VII—VIII.	1.50	—	—
» **Etoile d'Anvers** (Stern von Antwerpen), ○ ▭ ✕ . . . . Sehr grossblumig, mit kleiner, gelber Mitte, 100, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Gruppenstolz**, ○ ▭ ✕ . . . . Sehr gross, edel, reichblühend, 70, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Hildegard von Grüter**, ○ ▭ ✕ . . . . Grossblumig, reichblühend, straff gestielt, 70, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Mayfield Giant**, ○ ▭ ✕ . . . . Riesengross, stark gestielt, 80, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Niobe**, ○ ▭ ✕ . . . . Gross, reinweiss, leicht gewellt, 80, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **Sanssouci**, ○ ▭ ✕ . . . . Grossblumig, hoch, aber doch windfest, 80, VII—VIII.	—.60	5.40	48.—
uliginosum (Chrysanthemum serotinum), ○ ▭ ✕ . . . . Mittelscheibe hochgewölbt, weiss, 150—200, IX—X.	—.40	3.60	32.—
» **stellatum**, ○ ▭ ✕ . . . . Weiss, 120, IX—X.	—.40	3.60	—
Leucojum — Knotenblume — Amaryllidacee.			
aestivum, ○ △ . . . . Grosse, breite, weisse Glocke, 30—50, V—VI.	—.50	4.50	—
vernum, Märzbecher, ◑ △ . . . . Breite, weisse Glocken mit grünen Spitzen, 15, III—IV.	—.40	3.60	—
Lewisia — Bitterwurz — Portulaccacee.			
Howellii, ○ ◑ △ . . . . m. Tb. Blattrosetten zierlich gewellt, Blüten rot, weiss bordiert, 20, V—VI.	1.—	—	—
Leana, ○ ◑ △ . . . . m. Tb. Blattrosetten linealisch schmal, Blüten weiss, rosa gestreift, klein, 15, V—VI.	1.—	—	—
umbellata, siehe Calandrinia.			
Liatris — Prachtscharte — Komposite.			
pycnostachya, ○ △ ▭ ✕ . . . . Leuchtend purpurrosa, 100, VIII—IX.	—.40	3.60	32.—
spicata (Serratula spicata), ○ △ ▭ ✕ . . . . Violettpurpurne Blütenspiesse, 30—50, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Ligularia, siehe Senecio.			
Lilium — Lilie — Liliacee.			
auratum, Goldbandlilie, ◑ ≌ Fuss beschattet . . . . Riesenblumig, weiss mit schokoladefarbenen Punkten und gelben Bändern, 100—150, VII—VIII.	2.—	—	—
» **platyphyllum** ◑ ≌ Fuss beschattet! . . . . Riesenblumig breitblättrig, sonst wie die Art. 150, VII—VIII.	3.—	27.—	—
formosanum alpinum, ○ ◑ △ ✂ . . . . Lange, weisse Kelche, duftend, 40—60, VII—VIII.	1.20	11.—	—
giganteum (L. cordifolium), ◑ ≌ ∧ . . . . Herzblättrige Riesenlilie, mit zahlreichen, langen, weissen Kelchen, 200—250, VII—VIII.	6.—	—	—
Hansoni, Gold-Türkenbund, ○ ◑ ▭ ✕ ✂ . . . . Tiefgoldgelbe, mittelgrosse Lilie, Laub quirlig, 100—120, VI.	1.20	11.—	100.—
Henryi, ○ ◑ ✕ . . . . Grossblumig, orangerot, 200, VIII—IX.	1.50	13.50	—
longiflorum giganteum ○ △ ▭ ✕ ✂ . . . . Wüchsig, Blatt breit, Blüte grösser als die Art, weiss. 100, VII.	1.50	13.50	—
» **nobile**, ○ △ ▭ ✕ ✂ . . . . Wüchsig, Blatt breit, lederartig, Blüte reinweiss, meist zu 12, 80, VII.	1.50	—	—
Marhan (L. Martagon × L. Hansoni), ◑ . . . . Vielblumig, hellorange, braunrot getuscht, bis 150, VII.	2.50	22.50	—
Martagon, Echter Türkenbund, ○ ◑ △ ▭ ✕ ≌ . . . . Einheimische Art mit fleischfarbenen, braungefleckten Blüten, 80, VI—VII.	—.80	7.20	—
Michauxianum (L. carolinianum), ◑ ≌ . . . . Leuchtend orangescharlach, 60—80, VII.	1.—	—	—
pardalinum, Leopard-Lilie (L. californicum), ○ ≌ . . . . Orangegelb mit roten Punkten, 60, VI—VIII.	1.—	—	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lilium (Fortsetzung):			
pardalinum Red Giant, ○ ≌ . . . . Scharlachorange, 60, VI—VIII.	1.—	—	—
philippinense formosanum, ○ ◑ ✕ ✂ . . . . Lange Trichterblüten, klar weiss, aussen weinrot gestreift, 100—150, VII.	1.20	11.—	—
pyrenaicum, ○ △ ▭ ✕ . . . . Kleinblumig gelb, dunkel gepunktet, 60—120, V—VI.	1.50	—	—
regale, Königslilie, ○ ◑ ✕ ✂ . . . . Zierliches Laub, marmorweiss, aussen weinrosa, 100—150, VII—VIII.	—.80	7.20	64.—
speciosum rubrum, ○ ◑ ✕ . . . . Grosse, rote Blumen, nach den Spitzen zu heller, schwarzrot gefleckt, 80—100, IX—X.	1.50	13.50	—
superbum, Amerikanische Türkenbundlilie (Martagon-Klasse), ◑ ✕ ≌ Vielblumig, orangerot, zurückgerollt, 150—200, VII—VIII.	—.60	5.50	50.—
tenuifolium, ○ △ ▭ ✕ ∧ . . . . Schmale, dichtgestellte Blätter, Blüten zinnoberrot, 80, VI.	1.50	13.50	—
tigrinum, Tigerlilie, ○ ◑ ▭ ✕ . . . . Gelblichmennigrot, 80—150, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
» **Fortunei giganteum,** ○ ◓ ▭ ✕ . . . . Höher, grösser und reichblühender, 150—200, VIII.	—.60	5.50	50.—
» **plenum,** ○ ◑ ▭ ✕ . . . . Mit feinem Lachsschimmer, gefülltblühend, 80—100, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
umbellatum incomparabile, ○ ◑ △ . . . . Dunkelorange mit Blutrot, 50—80, VI—VII.	1.50	13.50	—
Willmottiae, ○ △ ▭ ✕ . . . . Zwiebel klein, Blüten leuchtend orange, reichblühend, 70—150, VII—VIII.	2.50	—	—
Limonium, siehe Statice.			
Linaria — Leinkraut — Scrophulariacee.			
acutiloba, ● △ ■ . . . . Zierlich, rasig, lila, 5—10, V—VIII.	—.25	—	—
hepaticaefolia, ● △ ■ . . . . Dichtrasig, weisslich, 10—20, VI—VIII.	—.25	2.25	—
origanifolia (Chaenorrhinum), ○ △ ♎ [K] . . . . **m. Tb.** Traube lockerblütig, lilablau mit Schwefelgelb, 15—25, V—X.	—.50	—	—
pallida, Mauerflachs, Abruzzen-Frauenflachs, ◑ △ ■ . . . . Blauviolett, 10—15, V bis Frost.	—.30	2.70	—
repens alba ● △ . . . . Weiss, klein-, aber reichblütig, 20—30, VI—IX.	—.50	—	—
Linosyris, siehe Aster Linosyris.			
Linum — Lein — Linacee.			
alpinum, ○ △ . . . . Weisslich blau, 30, VII.	—.50	—	—
capitatum, ○ △ ‖ . . . . Rosettig, Blütenstand kopfig, gelb, 20—40, VI—VII.	—.50	—	—
flavum, ♄ ○ △ . . . . Goldgelb, 20—30, VII.	—.50	4.50	—
» **compactum nanum** ○ △ . . . . Zwergform, reichblütig, sonst wie die Art.	—.60	—	—
narbonnense, ○ △ ▭ . . . . Straff, himmelblau, grossblumig, 50, V—VIII.	—.50	4.50	40.—
salsoloides, ◑ △ . . . . **m. Tb.** Niederliegend, weiß, rötlich geadert, 5—10, V—VII.	1.—	—	—
Lithospermum — Steinsame — Boraginacee.			
officinale, ○ ▭ . . . . Weiss, 80—100, VII—VIII.	—.50	—	—
prostratum (L. fruticosum), ♄ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Purpurviolett, 10—30, V—X.	—.70	6.30	56.—
purpureum coeruleum, ○ △ # . . . . Starkwachsend, für Böschungen, blau, 80—150, VI.	—.50	4.50	—
Lobelia — Lobelia — Lobeliacee.			
cardinalis, ○ △ ≌ . . . . **Echt!** Blüten fein gesägt, schmal, Blüten lebhaft kardinalrot, 40—80, VII—IX.	2.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lunaria — Mondviole — Crucifere.			
rediviva, Silberblatt ● △ ✕ . . . . . Laub herzförmig, Blüten lila, duftend, silberige Samenscheidewände, Judas-Silberlinge, 30—60, V—VII.	—.50	4.50	—
Lupinus — Lupine — Papilionacee.			
polyphyllus, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . . Typ blaupurpurn, Blätter fingerig zerteilt, 100, V—VIII.	—.50	4.50	—
» **albus**, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . . Weisse Rispen, 100, V—VII.	—.50	4.50	40.—
» **Blauer König**, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . . Langrispig, bayrisch blau, sehr lebhaft, 100—120, V—VI.	—.60	5.40	—
» **Rosalind**, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . . Sehr schön feurigrosa, sehr feine Färbung, 80, V—VI.	—.60	5.40	48.—
» **Ruby King**, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . . Karminpurpur, dunkelste, 80, V—VII.	—.60	5.40	—
» **englische Hybriden**, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . . Vielfarbige Mischung, 80—100, V—VII.	—.40	3.—	25.—
Lychnis — Lichtnelke — Caryophyllacee.			
chalcedonica, „Brennende Liebe", ○ △ ▭ ✕ . . . . . Scharlachrote Blütenköpfe, 50—100, VII.	—.40	3.60	32.—
Viscaria lilacina, ○ # ✕ . . . . . Immergrüne Blattrosetten, im Herbst purpurrot, Blüte fliederfarben, 30, V—VI.	1.—	—	—
Lycoris — Lycoris — Amaryllidacee.			
squamigera (Amaryllis Hallii), ○ △ ▭ ∧ . . . . . Zwiebel kugelig, Laub schmal, trocknet Ende Juni ein, Blüte dann lilarosa, angenehm duftend. 50, VII—VIII.	2.—	—	—
Lysichitum — Offenscheide — Aracee.			
camtschatcense, ○ ◑ ≌ ∧ ⊥ . . . . . Laub gross, stengellos, Calla-artig, gelbe Scheide, 50—70, V—VI.	3.—	—	—
Lysimachia — Felberich — Primulacee.			
nummularia, Münzkraut, ◑ ● ≌ 𝌆 . . . . . Kriechend, grossblumig, goldgelb, 5—10, V—VII, Wuchert!	—.30	2.70	—
vulgaris, ○ △ ▭ ≌ 𝌆 . . . . . Gelbe Rispe, 40—60, VII—IX.	—.30	2.70	—
Lythrum — Weiderich — Lythracee.			
alatum, (L. roseum), ♄ ○ ▭ 𝌆 ≌ . . . . . Quirlige Blütenstände in aufrechter Ähre, sattkarmin, 100—150, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Malva — Malve — Malvacee.			
alcea, ○ ▭ ✕ . . . . . Reichverzweigt, zartrosa, 60—80, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
Mazus — Warzenschlund — Scrophulariacee.			
pumilio, ● △ ■ ∧ . . . . . Rasig, bläulich, 8—10, ab IV.	—.30	2.70	—
Meconopsis — Scheinmohn — Papaveracee.			
cambrica (Papaver cambricum), ○ ◑ △ ▭ . . . . . Laub gefiedert, hellgelb, 30—80, ab VI.	—.50	4.50	—
Megasea (Bergenia) — Riesensteinbrech — Saxifragacee.			
cordifolia, ◑ △ # ≌ 𝌆 . . . . . Breite, herzförmige Blätter, hellrosenrot in Dolden, bis 40, IV—V.	—.50	4.50	—
pacifica, ◑ △ # ≌ 𝌆 . . . . . Kleinblättrig, rosa, 20, IV.	1.—	9.—	—
speciosa, ◑ △ # ≌ 𝌆 . . . . . Laub rundlich, rosa, bis 50, II—III.	—.50	4.50	—
Stracheyi, ◑ △ ≌ 𝌆 . . . . . Weisslich, vor dem Laub, 20—30, IV.	—.60	—	—
Melanthium — Höckerblume — Liliacee.			
virginicum, ◑ ● ≌ . . . . . Dicker Wurzelstock, Laub grasartig, Blüte rahmweiss, verästelt, 100, VII.	1.—	9.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Mentha — Minze — Labiate.			
Requieni (Menthella), ○ ◑ △ ■ ∧	—.30	2.70	—
Rasig, violett, 2—3, VII. Duft!			
Mertensia — Lungenwurz — Boraginacee.			
echioides, ○ △	—.60	5.40	—
Hellgrün belaubt, Blüten dunkel ultramarinblau, 15, VI—IX.			
primuloides, ○ △	—.50	4.50	—
Rauh behaart, prächtig enzianblau, 10—20, V—IX.			
Meum — Bärwurz - Umbellifere.			
athamanticum, ○ ≌	—.50	4.50	—
Weisse Blütendolden, Laub haarfein zerteilt, tiefgrün, 15—45, V—VI.			
Micromeria — Kleinquendel — Labiate.			
graeca, ○ △ ■ . . . . **m. Tb.**	1.—	—	—
Flaumig behaart, Blütenstände rosenrot, 5—10, VI.			
Mimulus — Gauklerblume — Scrophulariacee.			
cardinalis, ○ ▭ ≌ ∧	—.50	4.50	—
Grossblumig, rot, 30—40, ab VI.			
Lewisii, ○ △ ▭ ∧	—.60	—	—
Klebriges Laub, rosa blühend, 50, VII.			
luteus, ○ ▭ ≌	—.50	—	—
Gelb mit dunkler Schlundzeichnung, 30—40, ab VI.			
Minuartia, siehe Alsine.			
Moehringia — Moosmiere — Caryophyllacee.			
Grisebachii (Arenaria), ○ ◑ △ ⩍ . . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	—
Polsterig, weiss, 5—10, VI—VIII.			
Moltkia — Moltkie — Boraginacee.			
Doerfleri, ○ △ . . . . **Neu! m. Tb.**	1.50	—	—
Dunkelgrün, lanzettlich, leuchtend blaue Blütenbüschel, 20—40, VI—VII.			
petraea, ♄ ∞ △ ‖ . . . . **m. Tb.**	1.—	—	—
Himmelblaue Köpfchen, 20—30, VI—VII.			
Monarda — Bienenbalsam, Rotmäulchen — Labiatae.			
didyma kalmiana, Indianernessel, ○ ▭	—.50	—	—
Leuchtend generalstabsrot, 80—100, VII—VIII.			
» **salmonea,** ○ ▭	—.50	—	—
Lachsfarben, 70—90, VII—VIII.			
Morina — Kardendistel — Dipsacee.			
elegans (M. longifolia), ○ ▭ ⚔	—.60	5.40	—
Stachelig gezähntes Laub, Blüten weisslichrosa, 60—80, VI—VIII.			
Muehlenbeckia, siehe unter „Laubhölzer".			
Muscari, siehe Hyacinthus.			
Myosotis — Vergissmeinnicht — Boraginacee.			
palustris Graf Waldersee, ○ ■ ⚔ ≌	—.30	2.70	—
Früh, dunkelblau, 20—30, V—VII.			
» **Perle von Ronnenberg,** ○ ■ ⚔ ≌	—.30	2.70	—
Dunkelhimmelblau, 20—25, V—VII.			
» **semperflorens Nixenauge,** ○ ■ ⚔ ≌	—.30	—	—
Himmelblau, 20—30, V—VII.			
rupicola, ○ △	—.50	4.50	40.—
Dunkelblau, 10—15, V—VII.			
Nepeta — Nepte, Katzenkraut — Labiate.			
hederacea, siehe Glechoma.			
macrantha (Dracocephalum sibiricum), ○ ▭ ⚘	—.40	—	—
Zartblau, 60—80, VI—VII.			
Mussini, ∞ △ ⁞ ⚘	—.30	2.70	24.—
Laub silbergrau, himmelblau, 30, V—IX.			
nervosa, ○ ■ ▭ ⚘	—.40	3.60	—
Dichtährig, hellblau, 50—70, VI—VIII.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Oenothera — Nachtkerze — Onagracee.			
Fraseri, ○ □ ⚘ Straff, gelb, 40—60, VI—VII.	—.50	4.50	—
missouriensis (Oe. macrocarpa), ○ △ || Grossblumig, schwefelgelb, 30, VII—IX.	—.60	5.40	—
speciosa, ○ △ m. Tb. Grossblumig, weiss, 40, VII—IX. Duft!	—.60	5.40	—
Omphalodes — Nabelnuss — Boraginacee.			
verna, Frühlings-Vergissmeinnicht, ● △ ⚘ Blau, 20, IV—V.	—.40	—	—
» **alba**, ● △ ⚘ Weiss, 20, IV—V.	—.50	4.50	—
Ononis — Hauhechel — Papilionacee.			
fruticosa, ♄ ○ □ m. Tb. Blätter 3zählig, Blüten traubig, hellrosa mit Karmin, 60—80, VI—VIII.	—.50	—	—
spinosa, ♄ ○ □ m. Tb. Stachelig, rosa, 40—60, VII—IX.	—.50	—	—
Onosma — Lotwurz — Boraginacee.			
sericeum, ○ △ m. Tb. Dicht grauseidenhaarig, rosettig, hellgelb, 25, V—VI.	1.50	—	—
Opuntia — Freiland-Feigenkaktus — Kaktee. ∞ △ || ∧, im Winter trocken.			
arenaria m. Tb. Zierlich, gelb, rundlich kurze Glieder, dichte Rasen.	1.—	9.—	—
comanchica, Komanchen-Feigenkaktus m. Tb. Glieder gross, rund, stark bestachelt, hellgelb.	—.60	5.40	—
» **albispina** m. Tb. Weisstachlig, widerstandsfähig, hellgelb.	—.80	—	—
» **gigantea** m. Tb. Grossgliedrig und grossblumig, hellgelb.	—.80	—	—
» **lutea carneo-staminea** m. Tb. Rehfarben.	—.80	—	—
» **major** m. Tb. Sehr grosse, ovale Glieder, schön bestachelt, hellgelb.	—.80	—	—
» **pallida** m. Tb. Weisslichgelb mit grünlichem Schein.	1.20	11.—	—
» **rubra** m. Tb. Ovale, grosse Glieder, Blüten dunkelbräunlich zinnober, am Rande und aussen Karmin.	1.20	—	—
fragilis (Op. humilis) m. Tb. Kleingliedrig, hellgrün, walzenförmig, wenig bewehrt, grüngelb.	1.20	—	—
» **caespitosa** m. Tb. Sehr kleingliedrig, hellgelb, Mitte lebhaft rotbraun.	1.20	—	—
Howeyi m. Tb. Grossgliedrig, hellgelb, gross, weiss-stachlig.	1.20	—	—
mesacantha (Op. Rafinesquei) m. Tb. Ovale Glieder, schwefelgelb, reichblühend.	—.80	7.20	—
» **macrorrhiza** m. Tb. Starkwurzelig, frischgrün, oval, spärl. bestachelt, schalenförmig, gelb.	1.—	—	—
missouriensis m. Tb. Glieder eiförmig, weisse Stachelpolster, hellgelb, gegen 8 cm breit, schalenförmig.	1.—	—	—
pachyclada rosea m. Tb. Kleingliedrig, walzig, stark bestachelt, reichblühend, karminrosa.	1.20	—	—
» **Spaethiana** m. Tb. Dunkellachsfarben, im Aufbrechen sattgelb.	1.—	—	—
Rafinesquei cymochila m. Tb. Verkehrt-eiförmig, hellgelb, grünlich.	1.—	—	—
rhodantha m. Tb. Sehr hart, Glieder grau, mittelgross, lang bestachelt, seidig, karminrot.	1.20	—	—
» **brevispina** m. Tb. Kurzstachlige Form, karminrot.	1.20	—	—
» **pisciformis** m. Tb. Zart hellkarmin mit lebhaft roten Staubfäden.	1.20	11.—	—
» **Schumanniana** m. Tb. Leuchtend dunkelkarmin, regelmässig schalenförmig.	1.20	—	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Opuntia (Fortsetzung):			
spirocentra . . . . . . **m. Tb.** Weisstachlig, noch länger bestachelt als O. comanchica, gelb.	—.80	—	—
xanthostemma rubra . . . . . . **m. Tb.** Reichblühend, karminrot, Glieder länglich.	1.20	—	—
Origanum — Dost — Labiate.			
officinarum compactum, ∞ △ ♯ ✻ . . . . . . Reichblühend, rosalila, würzig, 15—25, VII—IX.	—.40	3.60	32.—
Ornithogalum — Milchstern — Liliacee.			
umbellatum, Stern von Bethlehem, Elfuhrblume, ○ ◑ △ . . . . . . Blütenstände doldig, weiss, 10—30, V. Wuchert!	—.25	2.25	—
Orobus — Waldwicke — Papilionacee. ✻			
lathyroides, ◑ △ . . . . . . Tief dunkelblau, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
luteus (O. aurantiacus), ◑ △ ▭ . . . . . . Orangegelb, dicht, 40, IV—VI.	—.60	—	—
vernus, Frühlingswaldwicke, ◑ △ ▭ . . . . . . Leuchtend karmin, 30, III—V. Auch für Topfkultur.	—.50	4.50	—
» **albus roseus,** ◑ △ ▭ . . . . . . Weiss mit Rosa, 40, III—V.	—.60	5.40	—
Orostachys — Nabelkraut — Crassulacee.			
spinosa (Umbilicus spinosus), ○ ◑ △ ⋀ . . . . . . **m. Tb.** Sempervivumartig, dichtrosettig, Ähre reichblütig, weisslichgelb, 30—40, VI—VIII.	—.80	—	—
Pachysandra — Dickanthere — Buxacee.			
terminalis, ♄ ●● ■ ♯ . . . . . . Wertvolle Bodenbedeckung, Blüten weiss, unwesentlich, bis 25, III—IV.	—.30	2.70	24.—
» **variegata,** ♄ ●● ■ ♯ . . . . . . Weissbuntes Laub, bis 25, III—IV.	—.35	3.—	27.—
Paeonia — Pfingstrose, Gichtrose — Ranunculacee.			
albiflora (P. sinensis) ○ ⊥ ▭ ✕, f = früh, m = mittelfrüh, s = spät, in nachfolgenden Sorten:			
Assmannshausen, schneeweiss, gross, locker, 80, s	1.50	—	—
Baronne James de Rotschild, dunkel- bis hellrosa, ballförmig, dichtgefüllt, 80, f	—.50	4.50	40.—
Biebrich, zart fleischfarben, 70, s	2.—	—	—
Duguesclin, karminrosa, gut gefüllt, buschig, reichblühend, 80, m . .	—.70	6.30	56.—
Duke of Wellington, rahmweiss, gefüllt, 70, f	—.80	7.20	64.—
Emma, schneeweiss mit zartem, lichtlila Anflug. 70, s	1.50	—	—
Festiva, weiss, 80, m	—.60	5.40	—
» **maxima,** weiss mit blutroten Flecken, gross, gut gefüllt, 100, f .	1.20	11.—	—
Fragrans, karminrosa, innen mit leichtem Lachsschein, Duft! Laub kräftig, dunkel, 100, s	—.60	5.40	48.—
General Bertrand, violettrosa, Mitte rahmfarbig, 120, f	—.60	5.40	—
Gretchen, elfenbeinweiss, straffgestielt, 60, m	1.50	—	—
Königswinter, lila mit Silberschein, geschlossen, 80, m	1.50	—	—
Louis van Houtte, samtig kirschrot, dicht gefüllt, 80, m	1.50	—	—
Monsieur de Chavigné, violettrosa, 80, f	—.80	7.20	—
Omer Pascha, dunkelpurpur, gross, gut gefüllt, 100, f	—.80	7.20	—
Prince Charles d'Aremberg, Rand schalenförmig, karmin, Mitte ballförmig, lilarosa, 80, s	—.60	5.40	—
Purpurea superba, dunkelpurpur, locker, halbgefüllt, Staubf. lebhaft gelb, 100, s	—.60	5.40	48.—
Rauenthal, silberlila, locker, Staubf. dunkelgolden, 80, f	2.—	15.—	—
Rosea elegans, Rand tellerartig, lilarosa, Mitte ballartig, weisslich rosalila, 100, f	—.50	4.50	40.—
Rubens, rosa mit Lachs, grosser, hoher Ball, 80, f	—.50	4.50	40.—
Soeur Mélanie, dunkelpurpur, 80 s	—.80	—	—
St. Goar, Schale lilarosa, Füllung zart fleischfarben, Staubfäden goldgelb, 80, m	1.50	—	—
Thorbecki, Knospe zartrosa, aufgeblüht zart rahmfarben, Mitte gelblich, 80 f	—.50	4.50	40.—
Victoire tricolore, dunkelrot, locker gefüllt, Staubblätter schmal, lebhaft gelb, 70, m	—.60	5.40	48.—

Paeonia albiflora, aus obigen Sorten meiner freien Wahl
10 St. M. 5.—, 100 St. M. 45.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Paeonia (Fortsetzung):			
albiflora-Sämlings-Hybriden, Mischung	—.50	4.—	—
albiflora (P. sinensis) **japanische Sorten** ○ ⊥ ▭ ✕ ✿ Prächtige Färbungen für Vasenschmuck und zu Bindezwecken in nachfolgenden Sorten:			
Gekkiuden, „Mond-Palast", mittelgross, locker, reinweiss, Mitte strahlenförmig, elfenbein, 80, m.	1.50	—	—
Ginko-nishiki, „Silberner Brokat", weiss, purpurn gestreift und geflammt, Mitte eigelb, 70, m.	1.20	11.—	—
Hinodesekai, „Aufgehende Sonne", karmin in Rosa übergehend, gross, innere Blumenblätter rosig mit Gelb geflammt, 80, f.	1.20	11.—	100.—
Hyakka-to, „Blumen bewachsener Turm", Blüte flach, purpurrosa, Staubblätter strohgelb, schmal bandförmig, ballförmig zusammengekrümmt, 80, s.	1.50	13.50	—
Kame-no-kegoromo, „Schildkrötengewand", halbgefüllt, purpurkarmin, Mitte weiss, 80, m	1.75	—	—
Karafune, „Chinesischer Dschunk", gross, weiss bis zartrosa, schalenförmig, Mitte rahmweiss, 70, f.	1.50	13.50	—
Kasane-jishi, „Doppelter Löwe", weiss, rosa angehaucht, gewellt, Staubblätter gekräuselt, lichtgelb, 80, s.	1.75	16.—	—
Kunimori, „Landwehr", dunkelkarmin, gross, lockergefüllt, Staubblätter lebhaft hellgelb, durchsetzt mit kleinen Blütenblättern, 80, m.	1.50	13.50	120.—
Meigetsuko, „Mondstrahl", blass lilarot, 100, s.	—.80	7.20	64.—
Mine-no-momiji, „Ahorn im Gebirge", seidig weiss mit feinfadenförmiger, rahmgelber Mitte, 60, f.	1.50	13.50	—
Ohirama, „Grosser Saal", mittelgross, locker, dunkelrosa, Staubblätter lockig bandartig, strohgelb, 80, s.	1.50	13.50	—
Riugegno, Flussname, sehr gross, locker, purpurlila, Staubblätter bandartig gelb und rot, 80, s.	1.75	—	—
Riuhasen, Flussname, sehr gross, matt rosaweiss, Staubblätter weiss, Spitze geflammt, 100, s.	1.75	—	—
Seioba, Frauenname, gross, fast einfach, dunkelrosa, Staubblätter bandartig, gewellt, strohgelb, 60, s.	1.50	13.50	—
Shiraginu, „Weisses Gewand", locker, rahmweiss, Staubblätter zungenförmig, schwefelgelb, 70, s.	1.20	11.—	100.—
Someganoko, „Gefleckte Hirschfarbe", mittelgross, karmin, Staubblätter bandförmig, rot und gelb, 100, s.	1.75	—	—
Tamabotan, „Perle", rahmweiss, ballförmig, dichtgefüllt, schwach rot gestreift, Knospe marmoriert, 80, s.	—.80	7.20	—
ⓢ **Tsingtau**, eigene Neuheit 1935. Reichblühende **NEUHEIT** von gesundem, straffem Wuchs. Blumen 12—15 cm Durchmesser, äussere Petalen schalenförmig ausgebreitet, lebhaft weinrosa, Mitte dicht lockig gefüllt, anfangs gelblich-rahmfarben in Reinweiss übergehend, bei voller Entfaltung mit Weinrosa durchflammt. Wertvolle Gruppenpaeonie, 80, m	2.—	18.—	—
Yamatosangai, rosa mit Weiss und Hellgelb, halbgefüllt, 80, m.	1.75	—	—
Zansetsu, „Frühlings-Schnee", reinweiss, sehr gross, einfach, 60, s.	1.50	13.50	—

Paeonia albiflora, japanische, in schönsten Sorten meiner Wahl
10 Stück Mk. 12.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
anomala, ○ ▭ Rosalila, einfach, 50, V.	—.60	5.40	—
» **alba**, ○ ▭ Weiss, einfach, 50, V.	—.70	6.30	—
arborea Moutan, Baumpaeonie, ♄ ○ ⊥ ∧ Laub blaugrün, Blüte purpurn, 50—80, V—VI.	1.20	—	—
lutea Delavayi, ♄ ○ ⊥ Stumpfrot, einfach, 80—100, VI—VII.	1.20	11.—	—
Mlokosewitschi, ○ ⊥ ▭ Dunkellaubig, einfach, schwefelgelb, 50—80, V.	1.50	13.50	—
officinalis alba plena, ○ ⊥ ▭ Weiss gefüllte Bauern-Paeonie, 80, V.	2.—	—	—
» **rosea plena**, ○ ⊥ ▭ Rosa gefüllte Bauern-Paeonie, 80, V.	1.50	—	—
» **rubra plena** ○ ⊥ ▭ Glänzend scharlachrote, gefüllte Bauernpaeonie, 80, V.	1.50	—	—
peregrina, ○ ▭ Karminpurpur, 50—60, V.	1.—	—	—
tenuifolia, ○ △ ▭ Laub sehr fein zerschlitzt, einfach glühendrot, 30—50, VI.	1.50	—	—
» **plena**, ◑ △ ▭ Laub sehr fein zerschlitzt, Blüten gefüllt, rubinrot, 30—50, VI—VII.	2.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Paeonia (Fortsetzung):			
triternata, ○ ⊥ ▭ ꝏ . . . . Blüte einfach, weisslichpurpurn, Zierfrüchte, VIII, 50, V.	1.50	13.50	—
Veitchi, ○ ⊥ ▭ . . . . Nickende, mehrblütige Blütenstände, karminrot, einfach, Laub blaugraugrün, 50, V—VI.	—.80	7.20	64.—
Wittmanniana hybrida, ○ ▭ . . . . Parkpflanzen, gelb bis rosa Töne, einfach, 50, V.	1.50	—	—
Papaver — Mohn — Papaveracee.			
alpinum, Hybriden ○ △ ▭ . . . . **m. Tb.** Laub bläulich, fenchelartig, Blüten weiss, rosa u. orange, 15—25, VI—VII	—.50	4.50	—
cambricum, siehe Meconopsis.			
nudicaule, Islandmohn, ○ △ ✕ . . . . **m. Tb.** Gelb, weiss, orange, 30—40, IV—IX.	—.40	3.60	32.—
orientale Goliath, ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Scharlachrot, 100—120, V—VI.	—.50	—	—
» **grandiflorum,** ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Rot mit Schwarz, 80, V—VI.	—.50	4.50	—
» **Lord Lambourne,** ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Gross, orange, mit tief eingeschnitt. Blumenblättern, 60—70, V—VI.	—.50	4.50	—
» **Mrs. Perry,** ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Lachs, 80—100, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **Prinzess Victoria Luise,** ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Zart lachsrosa, dauerhaft, 80—100, VI—VII.	—.50	—	—
» **Sturmfackel,** ○ ⊥ ▭ ✕ . . . . Geradstielig, feurigrot, windfest, 30—40, VI—VII.	—.80	—	—
Paradiesea, siehe Anthericum.			
Paronychia — Mauerraute — Caryophyllacee.			
nivea, ○ △ ■ # . . . . **m. Tb.** Laub filzigwollig, weiss, 5, V—VII.	—.40	3.60	32.—
serpyllifolia, ○ △ ■ # . . . . **m. Tb.** Dicht angepresst, Blätter rundlich, grau, Blüte unscheinbar, 5, V—VII.	—.40	3.60	32.—
Parrya — Cheiranthus, Hesperis — Crucifere.			
Menziesi, ○ △ . . . . **m. Tb.** Grundblätter lanzettlich, Doldentrauben hellpurpurrosa, 20, V.	—.50	—	—
Peltiphyllum, siehe Saxifraga.			
Pentstemon (Pentastemon) — Bartfaden — Scrophulariacee.			
arizonicus, ○ △ . . . . Laub schmal, stark gezähnt, hellpurpurn, langröhrig, 30, VI—VII.	—.50	—	—
glaucus (P. glaber stenosepalus), ○ △ ▭ . . . . Laub fast ganzrandig, violettpurpurn, 20—30, VI.	—.40	3.60	—
Gordoni splendens, ○ ▭ . . . . Dunkellaubig, blauviolett, 30—50, VI.	—.40	—	—
hybridus Andenken an Fr. Hahn, ○ ▭ ✕ ∧ # . . . . . **m. Tb.** Laub hellgrün, violettkirschrot, 60—80, ab VI.	—.60	5.40	—
» **Andenken an Purpus,** ○ ◡ ✕ # . . . . **m. Tb.** Sehr winterhart, lachsrosarot, 60—80, ab VII.	—.80	—	—
Jamesi, ○ △ . . . . **m. Tb.** Laub graugrün, weisslich, 30, V.	—.50	—	—
Scouleri (P. fruticosus) ♄ ○ △ ‖ . . . . **m. Tb.** Violettrosa, 30, VI.	—.60	—	—
Phalangium, siehe Anthericum.			
Phlomis — Brandkraut — Labiate.			
fruticosa, ♄ ○ ▭ . . . . Laub unterseits weissfilzig, sonst gelbfilzig, Blüten in Quirlen, gelb, 100, VI—VII.	—.50	—	—
Samia, Filzkraut, ○ ⊥ ▭ ✻ . . . . Blüten quirlartig, gelb, 80, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
Phlox — Flammenblume — Polemoniacee.			
decussata (Phlox paniculata) ○ ⊥ ▭ ✕, VII—IX, in nachfolg. Sorten:			
Admirator, scharlachorange, m. karmin blutrotem Auge, 60	—.60	5.40	48.—
Albert Leo Schlageter, scharlach mit orange Schein, 80	—.60	5.40	48.—
A. Weiss, veilchenblau, früh, 60	—.40	—	—
Biedermeier, weiss mit Auge, gross, 80—100. . . . . **NEU!**	1.—	—	—
Carmen, leuchtend karmin, dicht, spät, 50	—.50	4.50	40.—

Phlox (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Coquelicot, orangemohnrot, leuchtend, früh, 80	—.40	3.60	—
Embrasement, kupfrig lachsfarben mit purpurner Mitte, 100	—.40	3.60	32.—
Europa, weiss mit karmin Auge, 100	—.40	3.60	—
Eva Foerster, feurig lachsrot mit Weiss, gross, früh, 80 . . . . **NEU!**	1.—	9.—	—
Feuerbrand, leuchtend orangescharlach, 60	—.60	—	—
Feuerreiter, erdbeerrot, 100 . . . . **NEU!**	1.—	—	—
Frau Anton Buchner, weiss, Laub dunkelgrün, 80	—.40	3.60	—
Frithjof, tief lilarosa, wuchtig, 100	—.40	3.60	—
Georg Stipp, lachsrot mit Auge, gesundes Laub, 100	—.50	4.50	40.—
Hindenburg, karmesinrot, dunkleres Auge, 80	—.50	—	—
Imperator, dunkelkarminrot, noch dunkleres Auge, 70	—.50	4.50	—
Juliglut, glühend kirschrot, früh, 80 . . . . **NEU!**	1.—	—	—
Junius, gross, lachsrot, sehr früh, 80 . . . . **NEU!**	1.—	—	—
Kapitän König, lachsrosa mit blutroter Mitte, 60	—.50	4.50	40.—
Le Mahdi, tief dunkelblau, 70	—.50	—	—
Loki, lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge, spät, 60	—.40	3.60	32.—
Mrs. Milly van Hoboken, rein zartrosa, ohne Auge, 70	—.40	3.60	32.—
nana coerulea, violettblau, lebhaft, 50	—.40	3.60	32.—
Nordlicht, karminrosa mit dunklem Auge, 100	—.40	3.60	—
Paul Hoffmann, magentarot, straff, Laub und Stiel dunkel, 100	—.50	4.50	40.—
Septemberglut, lachskarmin, von grosser Leuchtkraft, 100	—.50	4.50	40.—
Septemberschnee, reinweiss, spät, 100 . . . . **NEU!**	1.—	—	—
Spätrot, warm zinnoberrot, 100 . . . . **NEU!**	2.—	—	—
Südlicht, lachskarmin, dunkles Auge, früh, 80 . . . . **NEU!**	1.—	9.—	—
Thor, lachsrot mit blutroter Mitte, 100	—.40	3.60	—
U-Deutschland, scharlach, reichverzweigte Dolde, 70	—.50	4.50	—
Wala, schneeweiss, Laub hellgrün, 60	—.50	4.50	—
Wanadis, lilablau mit karminviolettem Auge, 70	—.40	3.60	—
Wennschon-dennschon, purpurviolett mit hellem Stern, 80-100. **NEU!**	1.—	9.—	—
William Ramsay, tief violettpurpur, 100	—.40	3.60	—
Württembergia, karminrosa mit hellerer Mitte, 70	—.50	4.50	—

Phlox decussata, aus obigen Sorten nach meiner freien Wahl 10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Douglasi, ○ △ ♎ # Lilapurpurn, 10, IV—V.	—.50	4.50	—
» **hybrida,** ○ △ ♎ # Reichblühend, lilarot, 5, IV—V.	—.50	4.50	40.—
maculata hybrida Alpha, ○ ▭ ✂ Langrispig, leuchtend rosa, 80, VI.	—.50	—	—
» **hybrida Schneelawine,** ○ ▭ ✂ Weisse Rispen, 80, VI.	—.50	—	—
paniculata, siehe Phlox decussata			
setacea atropurpurea (Phl. subulata atropurpurea), ○ △ ♎ # Tief dunkelrosa, 20, V.	—.50	4.50	40.—
» **Daisy Hill,** ○ △ ♎ # Karminpurpur, 15—20, V.	—.50	4.50	40.—
» **Leuchtstern,** ○ △ ♎ # . . . . **NEU!** Karminrosa, Laub dicht pfriemlich, 10—15, V.	—.80	7.20	—
» **Maischnee,** ○ △ ♎ # Weiss, runde, volle Blüte, 10—15, V.	—.50	4.50	—
» **Moerheimi,** ○ △ ♎ # Karminrosa, sternartig, 15—20, V.	—.40	3.60	—
» **nivalis,** ○ △ ♎ # Schneeweiss, 5—10, V.	—.40	3.60	—
» **Schneewittchen,** ○ △ ♎ # Weiss, 10, IV—V.	—.50	4.50	40.—
» **Vivid,** ○ △ ♎ # **Echt!** Lachsfarben, 10, V. schwachwüchsig!	1.50	—	—
stellaria, ○ △ ♎ # Blass zartblau, 20, V.	—.40	3.60	32.—
subulata, siehe Phlox setacea.			
suffruticosa Gryp, ○ ▭ ✂ Weiss mit rosa Auge, 70, VI—VII.	—.40	3.60	—
» **Magnificense,** ○ ▭ ✂ Purpurkarmin, 70, VI—VII	—.40	3.60	—

Phuopsis, siehe Crucianella.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Physalis — Lampionpflanze — Solanacee.			
Alkekengi, ○ □ ✕ ⚘ Hüllkelche rot, VI—VII, Fruchtzierde IX—X. Für Trockensträusse.	—.40	3.60	—
Franchetii, ○ □ ✕ ⚘ Sehr gut fruchtend, gross, rot, 80—100, VIII—IX.	—.40	3.60	—
Physostegia — Drachenkopfblume — Labiate.			
virginica imbricata, Etagen-Erika (Dracocephalum), ○ □ ✕ Violett, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
» **rosea,** ○ □ ✕ Rosa, 80—100, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
» **Vivid,** ○ □ ✕ **Neu!** Gedrungener Wuchs, weinrot, 60—80, VII—IX.	1.20	—	—
Phyteuma — Teufelskralle — Campanulacee.			
Charmelii, ○ △ **m. Tb.** Reich beblättert, Blütenköpfe kugelig, blau, 10—20, VII—VIII.	1.—	—	—
Phytolacca — Kermesbeere — Phytolaccacee.			
acinosa, ● □ ⊥ Früchte blauschwarz, Parkpflanze, rosa, 100, VIII—IX.	—.50	4.50	—
Plantago — Wegerich — Plantaginacee.			
alpina, ○ △ ‖ ⌂ Lineal-lanzettlich, grün, 10, VII—VIII.	—.50	—	—
argentea, ○○ △ Langblättrig, seidig-silberig, 30—40, VI—VII.	—.40	—	—
nivalis, ○○ △ ∧ **m. Tb.** Weisswollig, rosettig, Blüte braunrot, 5—10, IV—V.	—.80	7.20	—
Platycodon — Ballonblume — Campanulacee.			
Mariesi albus, ○ ◑ □ ✕ Weiss, aussen bläulich, 50—60, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **macranthus,** ○ ◑ □ ✕ Mit grösseren Blüten als die Art, 50—60, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **majus,** ○ ◑ □ ✕ Tiefblau, 50—60, VII—VIII.	—.40	3.60	—
Plumbago, siehe Ceratostigma.			
Podalyria, siehe Baptisia.			
Podophyllum — Fussblatt — Berberidacee.			
Emodi, Mai-Apfel, Alraune, ● ⚘ ≌ Laub gross, rot marmoriert, Blüte weiss, Frucht eigross, rot, 40—60, V.	1.—	9.—	—
Polemonium — Sperrkraut — Polemoniacee.			
coeruleum, Himmelsleiter, ○ □ ✲ Himmelblau, 50—70, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
reptans, ○ △ Blassblau, 20—25, V—VI.	—.60	5.40	—
Polygonatum, siehe Convallaria.			
Polygonum — Knöterich — Polygonacee.			
affine, ● △ # Kriechend, Blätter lanzettlich, Ähren leuchtend rosa, 15—20, VIII—X.	—.50	4.50	40.—
alpinum, ○ △ ✲ Wuchert, weiss, 50—100, V—VII. Duft!	—.40	3.60	32.—
Bistorta, Otternzunge, Wiesenknöterich, ○ ◑ ✲ Rötlichweiss, bis 100, V—VII und VIII—IX. Wildfutter!	—.30	2.50	20.—
cilinode, ○ ◑ ⊥ Blüten weisslich, bis 400, VII—VIII.	—.40	3.60	—
romanum, ○ △ ■ Niederliegend, kleinblättrig, rosa, 10—20, VI—VII.	—.40	—	—
sachalinense, Wucherknöterich, Riesenknöterich, ○ ◑ ⊥ ≌ Sehr üppig, Laub gross, Rispen weiss, bis 200, IX—X. Wuchert!	—.60	—	—
vaccinifolium, Heidelbeerknöterich, ○ △ ∧ ✲ **m. Tb.** Leuchtend rosa, 10—20, VIII—X.	—.50	4.50	40.—
Weyrichi, ○ ◑ ⊥ ✲ ≌ Grünlichweiss, 150, IX.	—.60	—	—

Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen“.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Potentilla — Fingerkraut — Rosacee.			
atrosanguinea, ○ ▭	—.50	4.50	—
Dankbarer Blüher, dunkelblutrot. 60, VI—VII.			
» **Gibsons Scarlet, Scharlachfingerkraut,** ○ ▭	—.80	—	—
Halbgefüllt, 60—80, ab VI.			
caulescens, ○ △	—.60	—	—
Rosa, 10—20, VI—VIII.			
chrysocraspeda, ○ △	—.50	4.50	—
Goldgelb, 10, VI.			
» **aurantiaca,** ○ △ **Neu!**	—.80	—	—
Warm orangegelb, 6—10, V—VI.			
hybrida plena Arlequin, ○ ⊐	—.50	4.50	—
Scharlach mit Goldgelb, 40—60, VI—VII.			
» **plena M. Hawkins,** ○ ▭	—.50	4.50	—
Feurig orange mit Hellgelb, 30—50, VI—VIII.			
» **sulfurea plena,** ○ ⊐	—.50	4.50	—
Gefüllt, dunkel bräunlichgelb, 40—60, VI—VIII.			
insignis, ○ △	—.50	4.50	—
Rotblühend, Laub silbrig, 20—25, VI.			
nepalensis Willmottiae, ○ △	—.50	4.50	—
Weinrot, 25—40, V—VIII.			
nevadensis, ○ △	—.60	—	—
Seidig, gelb, 10—15, VI—VII.			
pyrenaica, ○ △	—.50	4.50	—
Goldgelb, 15—20, VI.			
recta, ○ △	—.50	—	—
Blätter 5—7zählig, Blüten heller oder dunkler gelb, 20—50, VI—VII.			
Tommasinii, ○ △	—.50	4.50	—
Silbrig, hellgelb, 10—15, VI.			
Poterium, siehe Sanguisorba.			
Primula — Primel — Primulacee.			
acaulis alba plena, ◑ △ ≌	—.60	—	—
Ganz niedrig, weiss gefüllt, 8—15, III—IV.			
» **Croussei plena,** ◑ △ ≌	—.60	—	—
Rosapurpurn, gefüllt, 5—10, IV—VI.			
Auricula-Hybriden (Pr. pubescens), Gartenaurikel, ○ ◑ △ ⁞⁞ #	—.40	3.60	—
Lebhafte Farbmischung, grossblumig, 10—20, V—VI.			
Beesiana, ◑ △ ▭ ≌	—.50	4.50	—
Etagenprimel, samtigpurpur, 40—80, VI—VII.			
Bullesiana (Pr. Bulleyana × Beesiana) ◑ △ ▭ ≌	—.50	4.50	40.—
Lebhaftes Farbenspiel in Rot, Orange u. Gelb, Etagenprimel, 40—80, VI-VII.			
Bulleyana, ◑ △ ▭ ≌	—.50	4.50	40.—
Etagenprimel, orangerot getönt, 40—70, VI—VII.			
Clusiana, ◑ △	—.60	5.—	40.—
Purpurrosa, 5—10, IV—V.			
Cockburniana, ◑ △ ▭ ≌ ∧	—.50	—	—
Etagenprimel, kupfrig orange, 20—40, VII—VIII, schwachwüchsig.			
denticulata alba, Kopfprimel, ○ ◑ △ ⊐	—.50	4.50	40.—
Weiss, 20—30, III—IV.			
» **cashmeriana,** ○ ◑ △ ⊐	—.50	4.50	—
Gelb bestäubt, purpurlila, 20—30, III—V.			
» **grandiflora,** ○ ◑ △ ▭	—.40	3.60	32.—
Lila Töne, 20—30, III—V.			
elatior (Vom wilden Standort!), ○ ◑ △	—.50	4.50	—
Dolden gelb bis schwefelgelb, geruchlos, bis 30, IV—V.			
Florindae (Pr. sikkimensis Florindae) ◑ ▭ ≌	—.60	—	—
Gelb, 60—80, VI—VIII.			
frondosa, ◑ △ ≌	—.50	4.50	—
Weissmehlig, lilarosa, 4—10, IV—V.			
Helenae, Kissenprimel, ◑ △	—.60	5.—	40.—
Tief purpurviolett, 5—10, ab III.			
Neue Kissenprimeln in nachfolgenden Sorten:			
Gartenglück, mattrosa mit Lachsschein	—.50	4.50	—
Garteninspektor Sander, rotviolett	—.50	4.50	—
Gloria, leuchtend magentarot mit gelber Mitte	—.60	5.40	—
Lebensfreude, matt lachsrosa	—.50	4.50	—
Ostergruss, amarantrot, sehr grossblumig	—.60	—	—
Schneekissen, weiss	—.60	5.40	48.—
Tuchers Varietät, violett	—.60	5.40	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Primula (Fortsetzung):			
hybrida Red Hugh (Pr. Cockburniana×pulverulenta), ◑ △ ▭ ≌ . . Etagenprimel, grosses Laub, scharlachrot, 40–60, VI–VII.	–.75	—	—
japonica, ◑ ● △ ▭ ≌ . . . . . Karminpurpur, feurig, 20—40, V—VII.	—.50	4.50	40.–
» **purpurea,** ◑ ● ⌴ ≌ . . . . . Etagenprimel, dunkelkarmin, 30—60, V—VIII.	—.50	4.50	40.–
Juliae, Kaukasusprimel ● △ ■ . . . . . Lebhaft dunkelviolett, 5, IV–V.	—.50	4.50	—
luteola, ◑ △ ⌴ . . . . . Laub nicht mehlig, vielblütige Dolde, schwefelgelb, 15, V.	—.60	—	—
marginata, ◑ △ . . . . . Laub zierlich gerändert, lavendelblau, 5—10, IV.	—.70	—	—
microdonta alpicola, ◑ △ ≌ . . . . . Stark duftend, hellgelb, innen bemehlt, 20–30, VI—VII.	—.70	6.30	—
minima, ○ △ ⚖ ≌ . . . . . Winzige Polster, Blüten sitzend, rot, bis 5, V—VIII.	—.80	—	—
Mooreana, ◑ ● △ . . . . . Üppige Kopfprimel, purpurn, 20—40, VII–VIII.	—.50	—	—
pulverulenta, ○ △ ▭ . . . . . Weissmehlig, Blüten lachs mit orange Stern, 40—60, VI—VII.	—.60	5.40	48.–
rosea grandiflora, Rosenprimel, ◑ ≌ ✂ . . . . . Feurig rosarot, 10—20, III–V. Für Topftreiberei!	—.40	3.60	32.–
saxatilis, ◑ △ . . . . . Rosaviolett, 10—15, IV—V.	—.50	4.50	—
secundiflora, ◑ △ . . . . . Blätter unterseits goldig, Dolden auf üppigem Schaft stumpf sattpurpurn, 20, VI.	—.60	—	—
Spaethiana (P. Juliae×acaulis) ○ △ . . . . . **Neu!** Leuchtend hell-lilarosa, reichblühend, 10, III—IV.	—.80	—	—
spectabilis, ◑ △ ≌ . . . . . Lila, rosettig, 10—15, VI.	—.50	4.50	—
Veitchi, ◑ △ ▭ . . . . . Satt karmin mit orange Stern, 20, V—VI.	—.70	6.30	—
veris elatior hybrida, bunte Gartenprimel, ○ ◑ △ ⫶ . . . . . Lebhaftes Farbenspiel, 20—30, IV—V, gelbe auch wohlriechend.	—.30	2.70	24.—
» **elatior grandiflora atrocoerulea,** ○ ◑ △ ⫶ . . . . . Dunkelblau, grossblumig, 10—15, IV—V.	—.50	4.50	40.–
vittata, ○ ◑ △ . . . . . Buschig, Dolden tiefpurpurrot, angenehm duftend, 30, VI.	—.80	—	—
Wardii (Pr. sibirica chinensis), ◑ △ . . . . . Rosa, Duft!, 20—25, V—VI.	—.50	4.50	40.–
Wulfeniana, ○ △ . . . . . Laub steif, blaugrün, lila, 5—10, V—VII.	—.60	—	—

Primula, aus obigen Sorten nach meiner Wahl 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.-

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pterocephalus — Federköpfchen — Dipsacee.			
Parnassi (Scabiosa pterocephala), ○ △ . . . . . **m. Tb.** Rasig, rosa, 10—20, ab VI.	—.60	—	—
Ptilotrichum, siehe Alyssum.			
Pulmonaria — Lungenkraut — Boraginacee. ✿			
angustifolia azurea, ◑ ● △ ⫶ ⊐ . . . . . Blau, 15—30, IV.	—.40	3.60	—
officinalis, ● △ ▭ . . . . . Rötlich, 20—30, V.	—.40	—	—
saccharata variegata, ● △ ⊐ . . . . . Weissgefleckte Blätter, Blütentrauben rotviolett, 10—30, III—IV.	—.40	3.60	—
Pulsatilla, siehe Anemone.			
Pyrethrum — Insektenpulverpflanze — Komposite.			
millefoliatum, ○ ⊐ ✂ . . . . . Laub silbrig, gelbe Knöpfe, 30—50, VI—VII.	—.50	4.50	—
roseum hybridum, bunte Margeriten ○ ▭ ✂. 40—70, V—VI und nach Rückschnitt VIII—IX in nachfolgenden Sorten:			
Blutfink, einfach, weinrot	—.60	5.40	—
Dr. Bosch, einfach, lachsrosa	—.80	7.20	64.—
Hamlet, einfach, rein rosa	—.50	4.50	40.—
James Kelway, einfach, dunkelsamtrot	—.60	5.40	48.—
Yvonne Cayeux, gefüllt, rahmweiss, Mitte gelblich	—.60	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ramondia — Felsenteller — Gesneriacee.			
Nathaliae, ● △ ♯ ≌, steile Nordlage! Blattrosetten flach, wenig behaart, blühwillig, blauviolett, 5, VI—VII.	1.50	—	—
pyrenaica (R. Myconi), ● △ ♯ ≌, steile Nordlage! Rosetten gewellt, stark behaart, dunkelblauviolett, 10—15, VI—VII.	—.60	5.40	48.—
Ranunculus — Hahnenfuss — Ranunculaceae.			
gramineus, ◑ △ Laub grasartig, gelb, einfach, 20—30, V.	—.40	3.60	—
speciosus plenus, ○ ◑ △ Reichverzweigt, gelb, gefüllt, 20—30, V—VI.	—.40	—	—
Raoulia — Raoulie — Komposite.			
australis, Schafpflanze, ○ △ ■ ∧ **m. Tb.** Weissblaue Polster mit goldgelben Blütchen, 2—5, VII.	1.—	9.—	—
glabra, ○ △ ■ ∧ **m. Tb.** Lockerrasig, hellgelbgrün, weissliche Blütchen, 5, VII.	1.—	—	—
subsericea, ○ △ ■ ∧ **m. Tb.** Graugrüne Polster, 2—5, VII.	1.—	9.—	—
Rodgersia — Schaublatt — Saxifragacee.			
pinnata alba, ● ⊥ ≌ Laub fingrig, Blütenstand reinweiss, 80, VII.	—.80	7.20	—
» **superba,** ● ⊥ ≌ Austrieb rot, Blüten rosa, Früchte tiefrot, 100, VII.	1.20	—	—
podophylla, ● ⊥ ≌ Laub gelappt, Blüte grünlich weiss, 60—80, VII.	1.—	9.—	—
tabularis, ● ⊥ ≌ Blatt tafelförmig, Blüte unscheinbar, 60—80.	1.50	—	—
Rosularia — Umbilicus — Crassulaceae.			
pallida (Umbilicus chrysanthus), ○ △ ∧ Flaumig, Blüte gross, gelblichweiss, 15, VIII.	—.50	—	—
Pestalozzae, ○ ◑ △ ‖ ∧ Blaue Rosetten, Blumenkrone rosa, 20—40, V—VI.	—.60	5.40	—
Sempervivum, ○ △ ‖ ∧ Rosette grün, leuchtend rosakarmin, 20—40, VII.	—.60	—	—
Rudbeckia — Sonnenhut — Komposite.			
flava, ○ △ ▭ ✕ Gelb, 30—50, VI—VII.	—.40	3.60	—
maxima, ○ ⊐ ✕ Laub bläulich, Strahlenblüten und Köpfe gross, gelb, 100—200, VI—VIII.	—.50	—	—
occidentalis, ○ ⊐ ✕ ≌ Hellgelb, 100—150, VII—VIII.	—.40	3.60	—
purpurea, (Echinacea purpurea) ○ ▭ ✕ ⊥ Purpurrosa, 60—100 VII—IX.	—.40	3.60	32.—
» **Abendsonne,** ○ ▭ ✕ ⊥ Völlig kreisrund geschlossene Blüten, tief weinrot, 80, VII.	1.—	—	—
speciosa (R. Neumanni), ○ △ ⊐ ✕ Orangegelb, 20—40, VIII bis Frost.	—.40	3.50	30.—
Ruscus — Mäusedorn — Liliacee.			
aculeatus, ♄ ● △ ♯ ∧ Stechend, kleinblättrig, 20—60.	1.—	9.—	—
» **hermaphroditus,** ♄ ● △ ♯ ∧ Schönlaubig und willig und lange Beeren tragend, 40—70.	1.20	11.—	—
racemosus (Danaë racemosa), Traubendorn, ♄ ● ♯ ∧ Bambusartig, frischgrün, Blüten weiss, Beeren rot, 60—100, VI—VII.	—.70	6.—	55.—
Ruta — Raute — Rutacee.			
graveolens, ♄ ○ ⊥ ⊐ + Laub fein, gelb, Duft! 80—100, VII—IX.	—.50	4.50	—

Sagina, siehe Spergula.

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Salvia — Salbei — Labiate.			
azurea grandiflora, ○ ◑ ▭ . . . . Blaue Rispen, 100—120, VIII—X.	—.60	5.40	—
glutinosa, ● ▭ ⊥ . . . . Hellgelb, 80—100, VII—VIII.	—.40	—	—
Jurisici, ○ ▭ . . . . Graues Laub, blau, 30—50, VI—VIII.	—.50	4.50	—
nemorosa virgata, ○ ▭ . . . . Violettpurpurn, 60—100, VI—IX.	—.50	4.50	—
officinalis, ♄ ○ ▭ + ... Graufilzig, Blüten violett, 80—100, VI—VII.	—.50	4.50	—
ringens ○ △ ⌐ . . . . **m. Tb.** Laub fiederschnittig, tiefblau, sehr gross, 40—60, VII—IX.	—.50	4.50	—
Sambucus Ebulus, siehe unter „Laubhölzer".			
Sanguinaria — Blutkraut — Papaveracee.			
canadensis plena, ● △ . . . . Weiss gefüllt, 15, V.	3.50	—	—
Sanguisorba — Wiesenknopf — Rosacee.			
obtusa (Poterium obtusum), ○ ⊥ ▭ ≌ . . . . Rot, 100—150, VII—IX.	—.40	3.60	—
tenuifolia (Poterium), ○ ⊥ ▭ ≌ . . . . Rosa, 100—150, VII—IX.	—.40	—	—
» **alba,** ○ ⊥ ▭ ≌ . . . . Weiss, 100—150, VII—IX.	—.40	—	—
Santolina — Heiligenblume — Komposite.			
lindavica, ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Laub silbrig, hellgelb, 30, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
pinnata, ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Grünlaubig, weiss, 30—40, VII—VIII.	—.50	4.50	—
tomentosa, ♄ ○ △ # . . . . **m. Tb.** Dichte, silbergraue Form, gelb, 50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Saponaria — Seifenkraut — Caryophyllacee.			
caespitosa, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Dicht polsterig, lebhaft rosa, 2—3, Blüte bis 10, VII—VIII.	—.50	—	—
ocymoides, ○ △ ♎ . . . . **m. Tb.** Kriechend, rosenrot, 10—20, ab VI.	—.40	3.60	—
officinalis plena, ○ ▭ ✕ . . . . Rosa, gefüllt, 70—100, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Wiemannii, ○ △ . . . . **m. Tb.** Blassrosa, 10—15, VI—VII.	—.80	—	—
Satureja — Quendel — Labiate.			
montana, Bergminze, ♄ ○ △ + ... Weisslich, 30—50, ab VI, würziger Duft.	—.50	4.50	—
Saxifraga — Steinbrech — Saxifragaceae.			
Aizoon, Trauben-Steinbrech, ○ △ ♎ # . . . . Silbrig, rosettig, weiss, 20—30, V—VII.	—.30	2.70	24.—
» **lutea,** ○ △ ♎ # . . . . Krustig, milchweiss, 20, V—VII.	—.40	3.60	32.—
» **marginata,** ○ △ ♎ # . . . . Krustig, weiss, 15—25, V—VII.	—.40	3.60	32.—
» **rosea,** ○ △ ♎ # . . . . **m. Tb.** Kleine Rosette, rosa, krustig, 10—15, V—VI.	—.60	—	—
Andrewsi, ○ ◑ △ :‖: # . . . . Frischgrüne Rosetten, weiss, 20—40, VI—VII.	—.20	1.80	15.—
apiculata (S. Rocheliana × sancta) ○ △ :‖: . . . . **m. Tb.** Glänzend hellgrün, Blüten gross, primelgelb, 10, III—IV.	—.70	6.30	—
Arco-Valleyi (S. lilacina × marg. Rocheliana), ○ ◑ △ # . . . **m. Tb.** Grossblumig, rosa, 5, IV.	—.70	—	—
Arendsi Juwel, ◑ △ ♎ # . . . . Purpurrot, dunkelste, spät, 15, VI.	—.60	—	—
» **magnifica,** ◑ △ ♎ # . . . . Grossblumig, zarthellrosa, 15—25, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
» **Purpurmantel,** ◑ △ ♎ # . . . . Dichtpolsterig, satt karminpurpurn, 20, IV—VI.	—.40	3.60	32.—

Saxifraga (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Arendsi rosea superba, ◑ △ ♎ # . . . . Dichtpolsterig, karminrosa, reichblühend, 20, IV—VI.	—.40	3.60	32.—
» **Schneeteppich,** ◑ △ ♎ # . . . . Grossblumig, schneeweiss, 15, IV—V.	—.50	4.50	—
» **Schöne von Ronsdorf,** ◑ △ ♎ # . . . . Von langer Blühdauer, dunkelkarmin, 15, V—VII.	—.40	3.60	—
» **Schwefelblüte,** ◑ △ ♎ # . . . . Hellschwefelgelb, 10—15, V—VI.	—.60	5.40	—
» **Triumph,** ◑ △ ♎ # . . . . Sehr gut beständig dunkelrot, 10—15, V—VI.	—.60	5.40	—
aspera, ○ ◑ △ # . . . . Moosartig, weiss, 10—15, V.	—.30	2.70	—
Burseriana grandiflora, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Weiss, 5—10, III.	1.—	—	—
carinthiaca, ○ △ # . . . . Laub silberig, weiss, 20—25, V—VI.	—.40	3.60	—
controversa, ○ ◑ △ # . . . . Moosartig, weiss, 10—15, V.	—.30	2.70	—
Desoulavayi, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Graugrün, gelb, 5—10, IV.	—.80	7.20	—
diversifolia, ● △ # ≌ . . . . Hellgelb, 15—20, VI.	—.80	—	—
Faldonside, ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Schwefelgelb, 10, IV.	1.—	—	—
Fortunei, ○ △ ♎ . . . . Ähnlich S. sarmentosa, Laub nierenförmig, weiss, 30, V—VII.	2.—	—	—
geranioides, ○ △ . . . . Lockerrasig, nierenförmig, weiss, 25, VI.	—.80	—	—
Geuderi, ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Krustig, hellgelb, 10, IV.	—.80	—	—
granulata plena, ◑ △ . . . . Topf mit Knöllchen Weiss gefüllt, zieht ein, 15—20, IV—V.	—.50	4.50	—
granulata×decipiens, ○ △ . . . . Knöllchen bildend, weiss, 15, V.	—.60	—	—
Haagii, ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Gutwüchsig, dunkelgelb, 10, IV.	—.60	5.40	—
Haworthi, ○ ◑ △ # . . . . Weiss, 10—20, V—VI, Winterfarbe!	—.40	3.60	—
Heinrichii, ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Bläuliche Rosetten, gelb, Stengel rot, 10, IV.	1.—	—	—
Hostii, ○ △ # . . . . Rosettig, silberig, weiss, 30—50, V—VI.	—.40	3.60	32.—
hybrida Mrs. Leng, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Gelb, 10, III.	—.70	6.30	—
juniperifolia, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Gelb, Laub grün, pfriemlich, 10—15, V.	—.70	—	—
Kellereri, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Gross, rosenrot, 8—10, III—IV.	1.—	—	—
Kyrillii, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Blaugrau, krustig, weiss, 5—10, III.	—.70	—	—
lingulata, ○ △ ‖ # . . . . Weiss, langblättrig, 20—30, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **Alberti,** ○ △ ‖ # . . . . Stumpfblättrig, weiss, 20, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **lantoscana,** ○ △ ‖ # . . . . Laub kürzer, weniger krustig, weiss, 25—30, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **longifolia,** ○ △ ‖ # . . . . **m. Tb.** Rosettiger, weiss, 30—40, VI—VII.	1.50	—	—
» **major,** ○ △ ‖ # . . . . Dichte Polster, weiss, 30—40, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **superba,** ○ △ ‖ # . . . . Beste Form mit grossen, dichten Blütenständen, 30—50, VI.	—.60	—	—
marginata cariophylla, ○ △ # . . . . **m. Tb.** Silberig, weiss, 10—15, IV.	—.60	5.40	—
ochroleuca, ◑ △ ♎ # . . . . **m. Tb.** Einzeln, schwefelgelb, Mitte eigelb, krustig, graugrüne Polster 10—15, III.	—.80	7.20	64.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Saxifraga (Fortsetzung):			
oppositifolia Vaccariniana, ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Laub grün, niederliegend, Bl. rot, 5, V—VI.	1.—	—	—
peltata (Peltiphyllum) ○ ◑ ⊥ ≅ . . . . Grosslaubig, rosa, 60—80, IV—V, Laub als Vogeltränke!	—.80	7.20	—
pennsylvanica, ○ ⊥ ≅ # . . . . Grosslaubig, grünlich, 60—80, V.	—.60	5.40	—
Petraschii, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Silberig, weiss, 5—10, IV.	—.60	—	—
pseudo-Borisii, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Bläulich, krustig, gelb, 5, III.	—.60	5.40	48.—
pseudo-Kotschyi, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Blaugrün, gelb, 5, III.	—.60	5.40	—
rotundifolia, ◑ △ ≅ . . . . Weiss, 20—30, VI—VII.	—.50	4.50	—
rubella (S. Burseriana × lilacina), ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Lebhaft rosenrot, 5, III—IV.	—.80	—	—
Salomonii, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Crême, 5, IV.	—.60	—	—
sancta, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Zitronengelb, 5—10, III—IV.	—.60	5.40	—
umbrosa, Porzellan-Steinbrech, ○ ◑ △ ⁞⁞ # . . . . Rosettig, weiss, rot punktiert, 25, VI.	—.20	1.80	15.—
» **variegata,** ○ ◑ △ ⁞⁞ # . . . . Gelbbunte Rosetten, sonst wie die Art.	—.20	1.80	15.—

Saxifraga, in besten Sorten meiner Wahl
10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—
Saxifraga, in nur krustigen Sorten meiner Wahl
10 St. M. 5.—

Scabiosa — Grindkraut — Dipsacee.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alata, siehe Cephalaria.			
australis, ○ ▭ zum Verwildern! . . . . Wuchernd, blassblau, 40—70, V—VII.	—.40	3.60	—
caucasica, Witwenblume, ○ ▭ ✂ . . . . Rötlichblau, 50, VI—IX.	—.40	3.60	32.—
» **alba,** ○ ▭ ✂ . . . . Weiss, 50, VI—VIII.	—.50	4.50	—
» **Prachtkerl,** ○ ▭ ✂ . . . . **Neu!** Wüchsig, leuchtend blau, groß, straff gestielt, 50—60, VI—X.	1.50	—	—
graminifolia, ○ △ . . . . Laub silberig, lilablau, 20—30, VII—VIII.	—.60	—	—
pterocephala, siehe Pterocephalus.			
vestina (Sc. vestita), ○ △ . . . . Grünes, schmales Laub, blau, 15—25, VI—VIII.	—.70	6.30	—

Schivereckia — Alyssum — Crucifere.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Bornmuelleri, ○ △ . . . . Weiss, 10—20, V—VI.	—.40	3.60	—
podolica, ○ △ . . . . Üppig, gröber, 10—20, V—VI.	—.40	3.60	—

Scilla, siehe Camassia.

Scleranthus — Knäuelkraut — Caryophyllacee.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
biflorus, ○○ △ ■ . . . . Zwergig, grünrasig, kleine, weisse Blütensternchen, 3—5, VII.	—.60	5.40	—

Scutellaria — Helmkraut — Labiate.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alpina, ○ △ . . . . Purpurn, 10—20, VI—VIII.	—.40	—	—
» **alba,** ○ △ . . . . Weiss, 10—20, VI—VIII.	—.40	—	—
baicalensis (S. macrantha) ○ △ . . . . Blätter ganzrandig, Blüten reinblau, bis 60, VII.	—.50	—	—
canescens, ○○ ⊥ ▭ ✂ . . . . Hellblau, 60—80, VI—IX. Fruchtstände für Trockenbinderei.	—.40	3.60	32.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sedum — Mauerpfeffer — Crassulacee.			
acre, ○ △ ■ # Gelb, 5, IV—V.	—.20	1.80	15.—
» **majus**, ○ △ ■ # Groblaubig, gelb, 10, IV—V.	—.30	2.70	24.—
Aizoon, ○ △ Gelborange, 30, V—VI.	—.40	—	—
album, ○ △ ■ # Weiss, Winterlaub rötlich, 10—15, VI.	—.20	1.80	15.—
» **micranthum chloroticum**, ○ △ ■ # Laub klein, grün, pfriemlich, weiss, 5—10, VI.	—.20	1.80	—
» **murale**, ○ △ ■ # Dunkellaubig, weiss, 10—15, VI.	—.25	2.—	18.—
altissimum, ○ △ **m. Tb.** Rosettig, weisslich, 10—20, VI.	—.40	—	—
amplexicaule, ○ △ **m. Tb.** Grünlaubig, gelb, im Sommer nach der Blüte wie abgestorben, 10-15, VI-VII.	—.40	3.60	—
anacampseros, ○ △ # Laub bläulich, purpurn, niederliegend, 10—15, VI.	—.40	—	—
anglicum, ○ △ ■ # Weisslich, 5—10, IV—V.	—.20	1.50	—
anopetalum, ○ △ # Laub dunkelgrün, schwefelgelb, 20—25, V—VI.	—.40	3.60	—
brevifolium, ○ △ ∧ # **m. Tb.** Weissmehlig, gelb, 10, V—VI.	—.60	5.40	—
crassipes, ○ △ Aufrecht, bräunlich, 30—40, VI.	—.40	3.60	—
cyaneum (S. Ewersii homophyllum), ○ △ ■ **m. Tb.** Sehr gedrungen wachsend, zierlich, blau, 5, VI.	—.50	4.50	—
dasyphyllum, ○ △ ■ ∧ # **m. Tb.** Dicht, weissblau, weiss, 5—10, V—VI.	—.40	3.60	—
» **Suendermanni**, ○ △ ■ ∧ # **m. Tb.** Dichtrasig, bläulich, weiss, 5—10, V—VI.	—.40	3.60	—
elongatum, ○ △ Straff, dunkelrotbraun, 40, VI—VII.	—.40	3.60	—
eupatorioides, ○ ≌ □ Breitlaubig, gelb, 60—70, VI—VII.	—.50	—	—
Ewersi, ○ △ ■ Laub bläulich, rosarot, 10—15, VIII—IX.	—.30	2.70	—
Fabaria, ○ △ Dickes, breites Laub, rosa Dolden, 20—30, VII—VIII.	—.40	3.60	—
» **Brillant**, ○ △ Dunkelrote Dolden, 20—30, VII—VIII.	—.50	4.50	—
gracile, ○ △ ■ # Weiss, 5—10, V—VI.	—.30	2.70	—
gypsicolum, ○ △ # **m. Tb.** Graugrün, pfriemlich, weissliche Blüten, 5—10, VII.	—.40	—	—
Hartmanni, ○ △ # Laub bläulich, weiss, 15, VI—VII.	—.60	5.40	—
kamtschaticum, ○ △ Laub grob, grün, Blüten gelb, 15—20, VI—VII.	—.30	2.70	24.—
» **variegatum**, ○ △ Laub weissbunt, 15—20, VI—VIII.	—.40	3.60	—
Kirilowi (S. Rhodiola linifolium) ○ △ Knollig, aufrecht, linealisch, hellgrün, Doldenrispe grüngelb. Zieht ein! 30—50, V—VI,	—.50	—	—
» **rubrum** (S. linifolium rubrum) ○ △ Scharlachrote Blüten. Zieht ein! 30—50, V—VI.	—.50	—	—
Lydium, ○ ◑ △ ■ # Laub grün, rötlichweiss, 5—10, V—VI.	—.20	1.80	15.—
» **glaucum**, ○ ◑ △ ■ # Laub blau, weisslich, 5—10, V—VI.	—.40	3.60	—
maximum atropurpureum, ○ △ Blätter und Stengel dunkelrot, Blüte grünlichweiss, 30—60, VIII—IX.	—.50	—	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sedum (Fortsetzung):			
Middendorffianum diffusum, ○ △ ■ # . . . . . Laub lanzettlich, gelbe Blüten, 20—25, VII.	—.40	3.60	—
» **oregonum**, ○ △ # . . . . . **m. Tb.** Laub kurz, dick, hellgrün, gelb, 10—15, V—VI.	—.30	2.70	—
» **rubrum**, ○ △ # . . . . . **m. Tb.** Laub rot, mit schöner Winterfärbung, gelb, 10—15, V—VI.	—.30	2.70	—
populifolium, ○ △ . . . . . Pappelblättrig, rosa, 20—25, VII—VIII.	—.40	—	—
reflexum typicum „Tripmadam", ○ △ # . . . . . Blätter stielrund, locker, 10—20, VI—VII.	—.30	2.70	—
rupestre (S. pruinatum, S. elegans), Blautannensedum, ○ △ ■ # . . . Graublau, goldgelb, 15—25, VII.	—.40	3.60	—
sarmentosum, ◑ △ ‖ ■ # . . . . . **m. Tb.** Laub hellgrün, blassgelb, niederliegend, 5—10, VI—VII.	—.40	—	—
Sieboldi, ○ △ ‖ Ampelpflanze . . . . . **m. Tb.** Laub schön, blaugrau, rosa, 20, VI—VII. . . . . . für Topf wertvoll!	—.40	3.60	—
spathulifolium purpureum, ○ △ ■ # . . . . . **m. Tb.** Laub rot, Blüte gelb, schöne Winterfarbe, 10—15, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
spectabile (S. purpurascens), ○ ♒ . . . . . Rosa, 30—50, VII	—.30	—	—
spurium, ○ △ ■ :‖: ▭ . . . . . Rosa, 10—15, VII—VIII.	—.25	2.25	—
» **album**, ○ △ ■ :‖: ▭ . . . . . Weiss, 10—15, VII—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **album superbum**, ○ △ ■ :‖: ▭ . . . . . NEU! Reinweiss, grossblumig, 15—20, VII.	—.80	7.20	—
» **atropurpureum**, ○ △ ■ :‖: ▭ . . . . . Rot, 10—15, VII—VIII.	—.25	2.25	20.—
» **coccineum Purpurteppich**, ○ △ ■ :‖: ▭ # . . . . . NEU! Laub und Blüten rot, 10—15, VII—VIII.	—.80	7.20	—
» **roseum superbum**, ○ △ ■ :‖: ▭ . . . . . NEU! Reinrosa, grossblumig, 15—20, VII.	—.80	7.20	—
» **salmoneum**, ○ △ ■ :‖: ▭ . . . . . NEU! Leuchtend rot mit lachs Schein, 15—20, VII.	—.80	7.20	—
» **splendidissimum**, ○ △ ■ :‖: ▭ . . . . . NEU! Schön dunkelrot, 15—20, VII.	—.80	—	—
Tartarinowii, ○ △ . . . . . **m. Tb.** Rosa, 10—15, VIII—IX.	—.50	—	—
tenellum (S. Lydium tenellum), ○ △ ■ # . . . . . Weisslichrosa, 5—10, V—VI.	—.50	4.50	—

Sedum, aus obigen Sorten nach meiner Wahl
10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 25.—

Sempervivum — Hauslauch, Hauswurz — Crassulaceae. ○ △ ‖

R = Rosette, Bl. = Blüte.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
arachnoideum Spinnwebenhauswurz . . . . . R. klein, übersponnen, Bl. rosenrot.	—.30	2.70	—
» **tomentosum** . . . . . R. mittelgross, weiss übersponnen, Bl. rot.	—.40	3.60	—
atropurpureum . . . . . R. gross, purpurrot, Bl. gelblich.	—.20	1.80	15.—
atroviolaceum . . . . . R. gross, violettrot, Bl. gelb.	—.50	4.50	—
Boissieri (Form von S. tectorum) . . . . . R. mittelgross, Bl. rot.	—.50	—	—
Borisii . . . . . R. mittelgross, stark behaart, dichtpolsterig, Bl. gelb.	—.80	7.20	—
Boutignyanum (S. alpinum) (Form von S. tectorum) . . . . . R. klein, Bl. gelb.	—.40	3.60	—
Braunii . . . . . R. mittelgross, braun, Bl. rot.	—.40	—	—
calcaratum . . . . . R. gross, grün, Bl. gelblich.	—.20	1.80	15.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sempervivum (Fortsetzung):			
calcareum (Form von S. tectorum)	—.30	2.70	—
R. mittelgross, Spitzen rot, Bl. gelblich.			
Chavinii	—.50	—	—
R. mittelgross, Bl. gelb.			
fimbriatum	—.40	3.60	—
R. mittelgross, Bl. rosa.			
Funcki	—.30	2.70	24.—
R. klein, Bl. rötlich, gross.			
glaucum (Form von S. tectorum)	—.25	2.—	18.—
R. gross, blaugrün, Bl. hellrot.			
globiferum (S. hirtum)	—.25	2.—	—
R. klein, kugelig, Bl. gelb.			
hybridum Alpha	—.30	2.70	24.—
R. mittelgross, weissbehaarte Mitte, Bl. rosa.			
» **Beta**	—.40	3.60	—
R. mittelgross, bräunlich, Bl. dunkelrosa.			
Kosaninii	—.60	5.40	48.—
R. mittelgross, behaart, Bl. weisslich. Sehr wüchsig.			
Laggeri	—.30	2.70	24.—
R. mittelgross, bräunlich, Bl. rosenrot.			
montanum, Bergdonnerbart	—.40	3.60	—
R. mittelgross, starke Ausläufer, Bl. rosenrot.			
patens	—.80	7.20	—
R. gross, rotbraun, Bl. rot.			
pumilum	—.40	3.60	—
R. klein, grün, Bl. hellrosa.			
Requienii (Form von S. tectorum)	—.30	2.70	—
R. klein, Bl. rosa.			
robustum	—.60	5.40	—
R. extragross, grün, Spitzen braun, Bl. rosenrot.			
roseum	—.30	2.70	—
R. klein, im Winter schön rot, Bl. rosa.			
rubicundum	—.30	2.70	—
R. mittelgross, Spitzen rotbraun, Bl. rosenrot.			
» **giganteum**	—.50	4.50	40.—
R. gross, Spitzen rotbraun, Bl. rot.			
sabaudum	1.—	—	—
R. mittelgross, Bl. rosa.			
Schnittspahnii	—.30	2.70	24.—
R. mittelgross, kugelig, Bl. rosa.			
soboliferum	—.25	2.—	15.—
R. klein, kugelig, Bl. spärlich.			
spinulosum	—.50	4.50	—
R. sehr klein, rötlich, Bl. rot.			
tectorum, Dachhauswurz	—.25	2.—	15.—
R. mittelgross bis gross, grün, Bl. graurosa.			
triste (Form von S. tectorum)	—.60	5.40	—
R. gross, rotbraun, Bl. dunkelrosa.			
valesiacum	—.60	5.40	—
R. mittelgross, wollig, Bl. gelb.			
Verlotii	—.40	3.60	—
R. klein, Bl. rosa.			
violaceum	—.60	5.40	48.—
R. mittelgross, Bl. gelb.			

Sempervivum, aus obigen Sorten nach meiner Wahl
10 St. M. 3.–, 100 St. M. 25.–

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Senecio — Kreuzkraut, Goldkerze — Komposite.			
abrotanifolius ○ △ ▭	—.40	—	—
Laub farnartig, dunkelgrün, Blüte safrangelb, 30—40, VII—IX.			
caloxanthus, ○ △ ≌	—.70	—	—
Laub pfeilartig, gelb, 20—25, VI—VII.			
Clivorum (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✕ ❀ ≌	—.50	4.50	—
Starkwachsend, Laub herzförmig, orangegelb, breit schirmartig, 100—120, VII—VIII.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Senecio (Fortsetzung):			
Clivorum Orange Queen, ○ ⊥ ▭ ✂ ❀ ≌ . . . . Buschig, dunkelorange, 100—120, VII—VIII.	—.60	—	—
„ „ **Othello,** ○ ⊥ ▭ ✂ ❀ ≌ . . . . Laub dunkelpurpur, tieforange, 120—150, VII—VIII.	—.60	5.50	50.—
„ **subcrenatus** ○ ⊥ ▭ ✂ ❀ ≌ . . . . Laub rundlich, mehr gekerbt. Blütenblätter stumpf, goldgelb, 100, VIII.	—.70	—	—
Hessei (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✂ ≌ ❀ . . . . **NEU!** Durch Kreuzbefruchtung von S. Clivorum, Veitchianus und Wilsonianus entstanden. Laub bis 1 m hoch, Blattform dreieckig, Blütenstände langgestreckt, ähnlich S. Veitchianus oder Wilsonianus, jedoch breiter, da die Einzelblumen größer sind, diese mehr an S. Clivorum erinnernd, etwa 8 cm Durchmesser. Farbe schön leuchtend orangegelb. Höhe der stattlichen Blütenschäfte gegen 2 m, am oberen Ende mehr stumpf auslaufend. Die Blütenschäfte sind abgeschnitten lange haltbar und bei ihrem angenehmen Duft als wirkungsvolles Dekorationsmaterial zu betrachten. 150—200, VII—VIII. *Siehe Bildtafel!*	1.20	11.—	100.—
japonicus (Ligularia japonica, Erythrochaete palmatifida), ○ ⊥ ▭ ✂ ≌ ❀ Laub gelappt, orangegelb, 100—150, VII—VIII.	—.60	—	—
palmatilobus (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✂ ≌ ❀ . . . . **NEU!** Dekorationsstaude mit schön zerteilten Blättern und lebhaft gelben Blütenständen. Ihre frühe Blüte macht die Neuheit im Sortiment der Senecien besonders wertvoll. Das von Erythrochaete ererbte Laub wirkt ebenfalls sehr zierend und bringt auch hierdurch willkommene Abwechslung in die Senecio-Gruppen. 120—150, VI—VII.	2.—	18.—	—
stenocephalus globosus, ○ ⊥ ▭ ✂ ≌ ❀ . . . . Laub herzförmig, Blüte gelb, 80—100, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Veitchianus (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✂ ≌ ❀ . . . . Laub gross, tiefgrün, goldgelb, 150, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Wilsonianus (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✂ ≌ ❀ . . . . Hoch, gelbe, schmale, spitze Rispe, 150—180, VIII.	—.80	7.20	—
Serratula, siehe Liatris.			
Sidalcea — Doppelmalve — Malvacee. ❀			
candida Hybriden, ○ ▭ ✂ . . . . Gemischt, in rosa und roten Tönen, 80—120, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
hybrida Mrs. Lindbergh, ○ ▭ ✂ . . . . **NEU!** Dunkelrubinrot, 50, VII—VIII.	—.50	—	—
oregona Rosy Gem, ○ ▭ ✂ . . . . Tiefrot, 100—120, VII—VIII.	—.40	3.60	32.—
Silene — Leimkraut — Caryophyllacee.			
alpestris, ○ △ ‖ . . . . Laub schmal, frischgrün, weisse Sternchen, 10, V—VI.	—.40	3.60	—
„ **plena,** ◑ △ ‖ . . . . Weiss, gefüllt, 10—15, V—VI.	—.60	5.40	—
maritima alba plena, ○ △ ‖ . . . . **m. Tb.** Niederliegend, graugrün, weiss, gefüllt, 15—25, ab VI.	—.50	4.50	—
pusilla (Heliospermum pusillum) ○ △ ‖ . . . . **m. Tb.** Weiss, 10—15, V—VI.	—.40	—	—
Schafta, ○ △ . . . . **m. Tb.** Leuchtend rosa, 10—15, V—VI.	—.40	3.60	—
Sisyrinchium — Binsenlilie — Iridacee.			
angustifolium (S. Bermudianum), ○ ◑ △ . . . . Hellviolett, 10—20, V—VI.	—.40	—	—
Smilacina — Falscher Salomonssiegel — Liliacee.			
racemosa, ●● ▭ . . . . Laub grün, übergebogen, weisse Kopfdolden, 40—60, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Soldanella — Alpenglöckchen — Primulacee.			
alpina, ●● △ # ≌ [K] . . . . Lilarosa, 5, III—IV.	—.50	4.50	40.—
Solidago — Goldrute — Komposite. ○ ◑			
aspera (S. rugosa), ⊥ ▭ ✂ ❀ . . . . Gelb, langfederig, 150—180, IX—X.	—.40	3.60	32.—
brachystachya, △ ⁞ ❀ . . . . Goldgelb, 20—30, VII—IX.	—.40	3.60	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Solidago (Fortsetzung):			
canadense, ○ ▭ ≌ ✽	—.50	—	—
Grosse, lockere Rispen, goldgelb, 100—150, VII—VIII.			
elliptica, △ ⚔ ✽	—.40	3.60	—
Goldgelb, breitwachsend, 40—60, VIII—IX.			
hybrida Frühgold, ⊥ ▭ ⚔ ✽	—.40	3.60	32.—
Gelb, langfederig, straff, 100—120, VIII.			
» **Goldstrahl,** ⊥ ✽	—.40	3.60	32.—
Straff, ohne Ausläufer, dichtblütig, goldgelb, 70—90, VIII—IX.			
mollis, ▭ ✽	—.50	4.50	—
Laub grau, gelb, 50—70, VIII—IX.			
multiradiata (S. virgaurea arctica), △ ■ ✽	—.40	3.60	—
Gelb, locker, 15—25, VII—VIII.			
rigida, ⊔ ⚔ ✽	—.50	—	—
Rauhhaarig, flache, gelbe Doldenrispe, 40—60, VIII—X.			
Shortii, Königsgoldrute, ⊥ ▭ ⚔ ✽	—.40	3.50	30.—
Straff, Rispe federig, 100—150, IX—X.			
virgaurea nana, △ ♙ ✽	—.40	3.50	30.—
Straff, gelb, 30—50, VIII—IX. Windfest!			
Spergula — Knebel, Mastkraut — Caryophyllacee.			
pilifera (Sagina subulata), ○ △ ■ # ✽	—.20	1.50	10.—
Grün, weisse Blütensternchen, 3, VI—VIII.			
» **aurea,** ∞ △ ■ # ✽	—.30	2.50	20.—
Goldgelbes Laub, weiss, 3, VI—VIII.			
Spiraea — Spierstaude — Rosacee.			
Alpine Zwerg-Sträucher, siehe unter „Laubhölzer".			
Aruncus (Aruncus silvester), Prinzenfeder, ♂ ○ ◑ ⊥ ▭ ≌	1.—	9.—	—
Grosse, lockere, weisse Blütenstände, 80—120, VII—VIII.			
» **Kneiffi,** ○ ◑ ⊥ ▭ ≌	1.50	—	—
Laub dunkelgrün, sehr schön gefiedert, grosse, lockere Blütenstände, zierlich, weiss, 60—80, VI—VII.			
filipendula, „Mädesüss", ○ ▭ ≌	—.40	3.60	—
Doldig, reich verzweigt, gelblichweiss, 50—75, VI.			
» **plena,** ○ ◑ △ ≌	—.40	3.60	32.—
Schön grüne Grundrosette, weiss gefüllt, 20—40, VII—VIII.			
Humboldtii, Prinzenfeder, ♀ ○ ◑ ⊥ ▭ ≌	—.80	7.20	64.—
Laub hellgrün, weiss, 80—120, VII—VIII.			
lobata, ◑ ⊥ ⊔ ≌	—.40	—	—
Grosslaubig, rosa, 70—100, VII—VIII.			
» **hybrida,** ◑ ⊥ ▭ ≌	—.50	4.50	—
Gedrungen, lebhaft rosa, 60—80, VII—VIII.			
palmata, ◑ ⊥ ▭ ≌	—.80	—	—
Leuchtend rosarot, 75, VI—VII.			
» **elegans,** ◑ ⊥ ▭ ≌	—.40	3.60	—
Reich verzweigt, locker, leicht rosa, 80—100, VI—VII.			
Ulmaria plena, ◑ ⊥ ▭ ≌	—.40	3.60	32.—
Laub sattgrün, blendend weiss, gefüllt, 100—120, VII—VIII.			
venusta L'Innocence, ◑ ⊥ ▭ ≌	—.40	3.60	—
Laub dunkelgrün, blassrosa, 100—120, VII—VIII.			
» **magnifica,** ◑ ⊥ ▭ ≌	—.50	—	—
Groblaubig, rosa, 100—150, VII—VIII.			
Stachys — Ziest — Labiate. Siehe auch Betonica.			
lanata, ○ △ :‖:	—.30	2.50	20.—
Weisswollig, purpurn, 20—40, VI—VIII.			
Statice — Strandflieder — Plumbaginacee.			
Alle Arten für Trockensträusse verwendbar.			
Armeria, siehe Armeria maritima.			
glumacea, siehe Acantholimon.			
Gmelinii, ○ △ # ⚔ ≌	—.50	4.50	40.—
Dunkelblau, derblaubig, 40—60, VII—VIII.			
latifolia, ○ △ ⚔ ≌	—.40	3.60	—
Rosalila, 40—60, VII—VIII.			
montana, siehe Arenaria alpina.			
serbica, ○ △	—.60	—	—
Gewellte Grundblätter, lila, 15—20, VII.			
tatarica, ○ △ # ⚔ ≌	—.50	4.50	—
Weiss oder rosa, schirmartig, 20—30, VII—VIII.			

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Stenanthium — Federwolke — Liliacee.			
robustum, ◑ ⊥ ▭ ≌ An kräftigem Schaft, weiss, überhängend, stattlich, 150, VII—IX.	1.20	11.—	—
Stylophorum, siehe Hylomecon.			
Succisa, siehe Cephalaria.			
Sugerokia, siehe Heloniopsis.			
Symphyandra — Steinglocke — Campanulacee.			
armena, ○ △ Laub hellgrün, lilablau, 25, VII—VIII.	—.50	—	—
Synthyris — Frühlingsschelle — Scrophulariacee.			
reniformis, ● △ ❀ Violett, früh, 15—25, IV.	—.50	4.50	40.—
Telekia, siehe Buphthalmum.			
Teucrium — Gamander — Labiate.			
cinereum, ꝏ △ ▬ [K] **m. Tb.** Dicht, weissflaumhaarig, Blüten weiss, 5—10, VIII—X.	—.80	—	—
Thalictrum — Wiesenraute — Ranunculacee.			
aquilegifolium, ○ ◑ ▭ Dunkellila, 80—100, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **album,** ○ ◑ ▭ Weiss, 80—100, VI—VII.	—.50	4.50	—
» **compactum album,** ○ ◑ ▭ Reinweiss, niedrig, 50—70, VI—VII.	—.60	—	—
» **roseum,** ○ ◑ ▭ Rosa, 80—100, VI—VII.	—.60	—	—
Cornuti (Th. coronatum) ○ ◑ ▭ ≌ ❀ Gelblichweiss, 100—150, VI—VII.	—.40	—	—
dipterocarpum, Tibet-Amstel, ◑ ▭ ❀ ≌ Zierlich, dunkelpurpur, 150—180, VII—IX.	—.70	6.30	56.—
flavum, ◑ ⊥ ▭ ❀ ≌ Schwefelgelb, Laub grün, 150—200, VII—VIII.	—.50	—	—
glaucum, ◑ ⊥ ▭ ❀ ≌ Sattgelb, Laub blau, 150—200, VII—VIII.	—.50	—	—
minus adiantifolium, ○ ◑ △ ≌ Kleinlaubig, grau, zierlich, 20—40, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Thymus — Thymian — Labiate.			
azoricus, ○ △ ⩍ # Kugelig, rosa, 5, VII—VIII.	—.50	4.50	—
citriodorus, ○ △ # + Verholzende Staude, Laub nach Zitronen duftend, 30, VII.	—.50	4.50	—
» **albo-marginatus,** ○ △ # **m. Tb.** Weissbunt, 20, VII. Duft!	—.60	5.40	—
» **aureo-variegatus,** ○ △ # **m. Tb.** Gelbbuntblättrige Form, ebenfalls stark nach Zitronen riechend 30, VII.	—.50	4.50	—
lanuginosus, ○ △ ▬ # Blaugrau, silberig, rosa, 5, VII. Duft!	—.30	2.70	24.—
Serpyllum albus, ○ △ ▬ # ❀ Hellgrün, weiss, 5—10, VII. Duft!	—.30	2.70	24.—
» **carneus,** ○ △ ▬ # ❀ Fleischfarbig lila, 5—10, VII. Duft!	—.30	2.70	24.—
» **coccineus,** ○ △ ▬ # ❀ Karminrot, 5—10, VII. Duft!	—.30	2.70	24.—
Zygis gracilis, ○ △ **m. Tb.** Locker, weiss, 15—25, VII.	—.50	—	—
Tiarella — Schaumblüte — Saxifragacee.			
cordifolia, ● △ ▬ Frischgrüner Kriecher, weisser Blütenschleier, 20—30, IV—V.	—.40	3.60	32.—
Tolmiea — Saxifragacee.			
Menziesii (Leptaxis) ◑ ● ▬ Heuchera-ähnlich, kriechend, interessante Brutknospen, Blüte grünlichgelb, 20—40, VI—VII.	—.30	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Townsendia — Townsendie — Komposite.			
Wilcoxiana, ∞ △ ‖ . . . . . . **m. Tb.** Violett, 3—5, IV—V.	1.—	—	—
Tradescantia — Dreimasterblume — Commelinacee.			
virginiana, „Jeden Morgen neu", ○ □ ≌ . . . . . . Laub, lang, lineal, Blumen leuchtend himmelblau, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
» **alba**, ○ □ ≌ . . . . . . Reinweiss, 40—60, VI—VIII.	—.40	3.60	32.—
» **I. C. Weguelin**, ○ □ ≌ . . . . . . **Neu!** Sehr schön reines Blau, 60—80, V—IX.	—.70	—	—
» **Leonora**, ○ □ ≌ . . . . . . **Neu!** Grossblumig, schön tiefviolett, 40—60, VI—VIII.	1.—	—	—
Tricyrtis — Krötenlilie, Dreihöckerblume — Liliacee.			
dilatata, ● □ . . . . . . Laub filzig, Blume weiss, violett getigert, 60—80, IX—X.	1.—	9.—	—
hirta, ◑ □ . . . . . . Behaart, eilänglich, purpurn gefleckte, weisse Blüten, 40—70, IX—XI.	1.—	—	—
macropoda, ● □ . . . . . . Gelb getigert, 60—90, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
Trifolium — Klee — Leguminose.			
pannonicum, ○ ■ ≌ . . . . . . Laub grob, grossblumig, rahmweiss, 30—60, VI—VII.	—.50	—	—
repens atropurpureum, ○ △ ■ . . . . . . **m. Tb.** Laub rotbraun, 4—5blättrig, weiss, 10—15, VI—VII.	—.40	3.60	—
Tritoma (Kniphofia) — Fackellilie, Feuerpfeil — Liliacee.			
hybrida Express, ○ □ ✕ ✿ ≌ . . . . . . Blütenschaft dicht, gelbrot, 60—80, VI—IX.	—.60	5.40	—
» **Helios**, ○ □ ✕ . . . . . . Graziöse, dünnstielige Blütenspiesse, rein chromgelb, 70, VII.	—.80	—	—
» **Luna**, ○ □ ✕ . . . . . . Grosse Blütenspiesse, primelgelb, 50—70, VII.	—.80	—	—
» **The Rocket**, ○ □ ✕ . . . . . . **Neu!** Sehr grosse, glühend rote Rispen an starken Stielen, 80, VII.	3.—	—	—
Tuckii, ○ □ ✕ . . . . . . Harte Wildart, gelbrot, 75, VI—VIII.	—.60	—	—
Trollius — Trollblume — Ranunculacee.			
asiaticus, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Dunkelorange, 40, V—VI.	—.60	5.40	—
» **Excelsior**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Feurig orangerot, 30—50, IV—V.	—.80	—	—
» **Salamander**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Mittelgross, tieforange Blüten, 50—70, V—VI.	—.60	5.40	—
europaeus, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Hell goldgelb, 50, IV—V.	—.50	4.50	40.—
» **albus**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Kleinblumig, weisslich, 25—40, V.	—.50	4.50	—
» **giganteus**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Grossblumig, dottergelb mit rötlicher Zeichnung, 50—70, IV—V.	—.60	5.40	48.—
hybridus Earliest of All („Früheste von Allen"), ○ □ ✕ ≌ . . . . Gelb, 30—50, V.	—.50	4.50	40.—
» **Goldquelle**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Goldgelb, 50—70, V.	—.60	5.40	—
» **Goliath**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Sehr grossblumig, orange Kugeln, 70—90, IV.	—.80	—	—
» **Lichtball**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Hell orangegelb, 25—40, V.	—.60	5.40	—
» **Orange Globe**, ○ □ ✕ ≌ . . . . . . Orangegelb, gross, kugelig, 60, V—VI.	—.70	6.30	—
pumilus, ○ △ ≌ . . . . . . Laub dunkelgrün, hell goldgelb, 20, V.	—.60	5.50	50.—
Tropaeolum — Kapuzinerkresse — Tropaeolacee.			
speciosum, ◑ ● ⚓ . . . . . . Laub zierlich, grün, scharlachrot, geschlitzt, 80—100, ab VII.	—.50	4.50	40.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Tulipa — Wildtulpen — Liliacee.			
Gesneriana, ○ △ ✕ . . . . Langgestielt. weinrot, 40—60, IV.	—.50	4.50	—
Schrenki, ○ △ Vom natürlichen Standort auf der Halbinsel Krim gesammelt. Leuchtend feurig scharlach, gross, 20—30, IV.	—.60	5.50	50.—
Tunica — Felsennelke — Caryophyllacee.			
Saxifraga, ○ △ . . . . Locker, zartrosa Schleier, 20—30, ab VII.	—.40	3.60	32.—
» **alba,** ○ △ . . . . **m. Tb.** Einfach weiss blühende Form, 20—30, ab VII.	—.50	4.50	—
» **robusta plena,** ○ △ . . . . **m. Tb.** Schleier lilarosa, gefüllt, 30, ab VII.	—.60	5.40	—
Umbilicus, siehe Orostachys und Rosularia.			
Uvularia — Trauerglockenblume — Liliacee.			
grandiflora (U. lanceolata), ●● ▭ . . . . Hellgelb, 40—60, IV—VI.	1.—	—	—
Valeriana — Baldrian — Valerianacee.			
rotundifolia, ○ △ . . . . Blassrötlich, 15—20, V—VI.	—.40	3.60	—
Veratrum — Germer — Liliacee.			
nigrum, ◑ ▭ ≅ + ... Hellgelb mit Rot, 80—100, VII.	2.—	—	—
Verbascum — Königskerze — Scrophulariacee.			
pannosum, ○ ⊥ ▭ ✿ . . . . Laub weissfilzig, gelb, 150—200, VII—VIII. Zum Verwildern!	—.40	3.60	—
phoeniceum, ○ ▭ ✿ . . . . Braunviolett, 60—100, VII.	—.40	3.60	—
Vernonia — Eisenkraut — Komposite.			
arkansana (V. crinita), ○ ▭ ✕ . . . . Reiche, amarantpurpurne Blütenstände, 150—200, IX—X.	—.80	—	—
Veronica — Ehrenpreis — Scrophulariacee. ✿			
Staudenartige Veronica.			
Allionii (V. spicata alpina), ○ ◑ △ ■ # . . . . Dichte, feste Matten, blaue, kurze Ähren, 5—10, VI—VII.	—.25	2.25	20.—
amethystina (V. latifolia), ○ ▭ ✕ . . . . Blütentrauben in den Blattwinkeln, lilablau, 40—60, V.	—.40	3.60	—
elegans (V. spuria elegans), ○ ◑ △ ≅ . . . . Laub grün, rosa Blütenähren, 20—40, VII—IX.	—.40	3.60	—
filiformis, ○ △ ■ . . . . Niederliegend, kleinblättrig, Blüten blau, bis 5, V—VII.	—.30	2.50	20.—
fruticulosa, ○ ◑ △ ‖ ■ # . . . . **m. Tb.** Sattgrün, zartrosa, 8—10, V—VII.	—.50	—	—
gentianoides, ○ ◑ △ . . . . Rosettig, hellblau, 25—40, V—VII.	—.40	3.60	—
» **variegata,** ○ ◑ △ . . . . Laub weissbunt, hellblau, 25—40, V—VII.	—.40	3.60	—
Hendersoni, ○ ▭ ✕ . . . . Aufrechte Büsche, tiefblaue Blütenähren, bis 5, VII—IX.	—.80	—	—
incana, ○ △ ‖ # . . . . Laub silberweiss, dunkelblau, 20—30, VI—VII.	—.30	—	—
» **rosea,** ○ △ ‖ # . . . . **Neu!** Silbergrau, Blütenmassen in tiefrosa Rispen, 20—30, VI—VII.	1.50	—	—
latifolia Royal Blue, ○ △ ⩍ ▭ . . . . Dunkelblau, 20—30, VI—VII.	—.40	3.60	—
» **Trehanae,** ○ △ ■ . . . . Gelblaubig, Blüten dunkelblau, 15—25, VI—VII.	—.50	4.50	—
longifolia, ○ ⊔ ✕ . . . . Laub gross, frischgrün, lila, 40—60, VII—VIII.	—.40	—	—
Prenja (V. austriaca), ○ ◑ △ ▭ . . . . Laub hellgrün, klarblau, 20—35, V—VI.	—.40	3.60	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Veronica (Fortsetzung):			
prostrata, ○ ◑ △ ■ . . . . Laub dunkelgrün, tiefblau, 5, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
repens, ◑ △ ‖ ■ . . . . Laub hellgrün, weisslich-bläulich, 5, V—VI.	—.25	2.25	20.—
rhodopea, ○ ◑ △ ■ # . . . . Laub dunkelgrün, weisslich, 5—10, VII.	—.40	3.60	—
rupestris, ○ ◑ △ ‖ . . . . Kriechend, blau, 8—10, VI—VII.	—.40	3.60	32.—
» **alba,** ○ ◑ △ ‖ . . . . Blumen weiss, 8—10, VI—VII.	—.50	4.50	—
saxatilis (V. fruticans), ○ ◑ △ ‖ . . . . Laub dunkelgrün, azurblau, 8—10, V—VII.	—.40	3.60	—
sibirica japonica, ○ ◑ ▭ . . . . Blätter grün, blau, 60—80, VII—IX.	—.50	—	—
spicata (V. crassifolia), ○ ◑ △ ▭ . . . . Dichtährig, himmelblau, 20—40, VI—VIII.	—.40	—	—
Teucrium, ○ ◑ ▭ . . . . Laub hellgrün, blau, 25—40, VII.	—.40	3.60	—
Immergrüne, strauchige Neuseeländer ♄ #, neuerdings als Untergattung „Hebe" zusammengefasst.			
anomala, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Laub blaugrau, Blüten weiss, 40—60, VI—VII.	—.60	5.40	—
Armstrongi, ♄ ○ ◑ △ # ∧ . . . . **m. Tb.** Laub und Holz goldbraun, Blüten weiss, 20—40, Winter.	—.80	7.20	—
Balfouriana, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Blätter elliptisch, rotbraun, Blüten blau, bis 100, VII.	—.80	—	—
Bidwilliae lilacina, ♄ ○ ◑ △ ♎ # ∧ . . . . **m. Tb.** Dunkelgrün, Blüten lila, 10—20, VII—VIII.	—.50	—	—
Buchananii, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Laub blaugrau, 20—30.	—.60	5.40	—
cupressoides, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Cypressenartig, gelbgrün, hellblau, 30—60, VII—VIII.	—.60	5.40	—
» **glaucescens,** ♄ ○ ◑ △ # . . . . mit Ballen Cypressenartig, blaugrau, Blüten hellblau, 30—60, VII—VIII.	—.60	5.40	—
epacridea, ♄ ○ ◑ △ ♎ # ∧ . . . . **m. Tb.** Grün, feinlaubig, weiss, 10—20, VII—VIII.	—.50	—	—
glauca coerulea, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Laub blaugrau, wasserblau, 30—50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Hookeriana, ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Laub lanzettlich, grün, weiss, 20—40, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Lyallii, ♄ ○ ◑ △ ♎ # ∧ . . . . **m. Tb.** Dunkelgrün, wasserblau, 10—20, VII—VIII.	—.50	4.50	40.—
lycopodioides, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Bärlappartiges Laub, blau, 20—25, VII—VIII.	—.80	7.20	—
pinguifolia, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Laub dicklich, blaugrün, weiss, 30—50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
subalpina, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Hellgrün, weiss, 20—40, VII.	—.60	5.40	—
Traversi, ♄ ○ ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Laub lanzettlich, stumpfgrün, weisse Blütentrauben, 30—50, VII—VIII.	—.60	5.40	—
Wilcoxii, ♄ ○ ◑ △ ♎ # ∧ . . . . **m. Tb.** Laub rund, grün, 10—15, VII—VIII.	—.80	7.20	—
Vinca — Singrün — Apocynacee.			
major, ● ▭ # . . . . Grossblättrig, rankend, dunkelgrün, blau, 15—25, V—VI.	—.40	3.60	—
» **maculata,** ◑ ● ▭ # . . . . Gelbbunt, blau, 15—25, V—VI.	—.40	3.60	—
minor, ● ■ ⁞ # . . . . Kleinblättrig, blau, 10—20, V.	—.30	2.70	24.—
Viola — Veilchen — Violacee.			
cornuta Altona, ○ △ ▭ . . . . **NEU!** Sehr blühwillig, cremegelb, 10—15, ab V.	—.40	3.60	—
» **G. Wermig,** ○ ◑ △ ▭ ⁞ # ✕ . . . . Dunkelpurpur, 15—25, ab V. Duft!	—.30	2.70	24.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Viola (Fortsetzung):			
ⓐ **cornuta G. Wermig alba,** ○ ◑ △ ♎ # . . . . **NEU!** Wuchs gedrungen kugelig, beständig reinweiss, 10–15, ab V.	—.40	3.60	32.—
» **hybrida Hansa** (Perle von Vierlanden), ○ ◑ △ ♎ . . . . Marineblau mit kleinem Auge, 15—20, ab V.	—.30	2.70	24.—
» **W. H. Woodgate,** ○ ◑ △ ▭ # ✕ . . . . Kräftig, grossblumig, dunkelblau, 25—30, ab V.	—.30	2.70	24.—
cucullata grandiflora, ◑ ≌ ✕ . . . . Tiefblaues Pfingstveilchen, 5—10, V.	—.30	2.70	—
gracilis Clarence Elliot, ○ ◑ ♎ . . . . Milchweiss mit leichtlila Rand, 15—25, ab V.	—.40	3.60	32.—
» **Juwel v. Eisenach,** ○ ◑ △ # . . . . Samtig dunkelpurpur, zierlich, 10—15, ab VI.	—.50	4.50	—
» **Lord Nelson,** ○ ◑ △ # . . . . Dunkelpurpur, 10—15, V.	—.50	4.50	—
obliqua striata, ◑ △ ≌ . . . . Blauweiss gestrichelt, 10—15, IV—V.	—.30	—	—
odorata Königin Charlotte, ◑ △ ⫲ ✂ . . . . Blaues Duftveilchen, 10—20, III—IV und VIII—IX.	—.30	2.70	24.—
Waldsteinia — Ungarwurz — Rosacee.			
geoides, ● △ ▭ . . . . Groblaubig, gelbe Blüten, 20—30, VI.	—.50	4.50	—
trifoliata, ● △ ▬ . . . . Laub dunkel, kriechend, gelb, 10—15, VI.	—.40	3.60	—
Wulfenia — Kuhtritt — Scrophulariacee.			
carinthiaca, ● △ . . . . Laub hellgrün, lebhaft blaue Rispe, 20—30, VII—VIII.	—.50	4.50	—
» **alba,** ● △ . . . . Weissblühend, 20—30, VII—VIII.	—.60	5.40	48.—
cordata, siehe Synthyris reniformis.			
Yucca — Palmlilie — Liliacee.			
filamentosa, ○ ⊥ △ # . . . . mit Ballen	1.—	9.—	80.—
extra starke Pflanzen » »	1.50	13.50	120.—
Solitärpflanzen » » Laub blaugrau, mit Fäden, grosse, weisse Glocken an kräftigem Schaft, 100—150, VII—VIII.	3.—	27.—	—
» **elegantissima,** ○ ⊥ △ # . . . . mit Ballen Laub schmal, straff, Blüte wie die der Art, 80—100, VII—VIII.	2.—	—	—

Winterharte Freiland-Farne.

Kultivierte Pflanzen.

Die Verwendungsmöglichkeit der Farne ist eine gar mannigfaltige. Besonders an etwa schattigen Stellen, wo viele Blütenstauden versagen, sind die überaus vielgestaltigen Farne so recht berufen, das Pflanzenmaterial zu stellen. Farne für Schatten wie für Sonne, für feuchte Stellen wie für Mauern, als Bodenbedeckung oder Solitärpflanzung, immergrün oder die Wedel abstoßend, für lichte Unter- oder Zwischenpflanzung oder auch als freudiggrüne Einfassung: immer lassen sich passende Arten und Formen finden und überall werden gerade Farne von bester Wirkung sein und den Pflanzenliebhaber fesseln durch ihre reizvollen Wedelbildungen, den abwechslungsreichen Wuchs und die sonstigen, interessanten biologischen Eigentümlichkeiten dieser Pflanzengruppe.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 Farne in wintergrünen Sorten meiner Wahl . . . . M. 8.—
10 » » nicht wintergrünen Sorten meiner Wahl . . . . » 6.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Adiantum — Haarfarn, Venushaar — Polypodiacee.			
pedatum, ◑ ● △ ≌, 30—50	1.20	10.—	—
Aspidium — Schild-, Punktfarn — Polypodiacee.			
aculeatum proliferum (Asp. acul. setosum viviparum), ◑ #, 30—40 .	—.80	7.20	—
dilatatum, ◑ ≌, 60—80	—.60	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Aspidium (Fortsetzung):			
dryopteris, Eichenfarn, ○ ◑ ■, 10—20	—.50	—	—
erythrosorum, ◑ # ∧, 30—40	1.—	9.—	—
filix mas, Wurmfarn, ○ ◑, 50—100	—.40	3.60	—
» mas Barnesi, 80	—.80	—	—
» » bisdaedaleum cristatum pulchrum	1.—	—	—
» » daedaleum monstrosum, 60—70	1.—	—	—
» » erosum crenatum, 50—60	—.40	3.60	—
» » furcans, #, 80—100	—.80	—	—
» » furcatum, 100—120	—.50	4.50	—
» » interruptum, 60—70	—.50	—	—
» » lineare polydactilum, 60—80	—.80	7.20	—
» » paleaceum, 80—100	—.50	4.50	40.—
» » propinquum crispum, #, 30—50	—.80	—	—
» » squamulosum, #, 20—30	—.80	—	—
» » subintegrum, 60	—.60	5.40	—
⊛ Pseudomas angustatum erectum, ◑ ● #, 40—60	—.80	7.20	—
» polydactylon, ◑ ● 40—70	—.80	7.20	—
thelypteris, Wasserfarn, ○ ≌, 30—50	—.50	—	—
Asplenium — Streifenfarn — Polypodiacee.			
ruta muraria, Mauerfarn, ○ ◑ ● △ ‖ #, 5 **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Trichomanes, Mauerhaarfarn, ○ ◑ ● △ ‖ #, 5—10	—.80	7.20	—
Athyrium — Frauenfarn — Polypodiacee.			
filix foemina, ○ ≌, 40—70	—.60	5.40	—
» foemina angustatum cristatum, schmal, 40—70	1.50	—	—
» » bisdaedaleum cristatum, 50—70	1.50	—	—
» » bisfalcatum, 60—80	1.—	—	—
» » diviso-multifidum, 40—60	1.—	9.—	—
» » erosum minus, :‖:, 15—25	—.30	2.70	24.—
» » Fritzeliae, 40—60	1.—	—	—
» » gracile, 10—20	—.60	5.40	—
» » graminicon, 30—50	1.—	—	—
» » multidentatum purpureum, 80—100	1.—	—	—
» » Pseudo-Victoriae	1.50	—	—
Blechnum — Rippenfarn — Polypodiacee.			
Spicant, ○ ◑ # ≌, 30—40	—.50	4.50	40.—
Dicksonia — Wollfarn — Cyatheacee.			
punctilobula, Mattenfarn, ○ ◑ ■ :‖:, 40—70	—.30	2.70	24.—
Hypolepis — Buchtenfarn, Schuppenfarn — Polypodiacee.			
millefolium (Cheilanthes), ○ ◑ ■, 20—40	—.50	4.50	—
Onoclea — Sumpffarn — Polypodiacee.			
sensibilis, ○ ◑ ≌, 20—30	—.80	7.20	—
» interrupta, roter Austrieb, ○ ◑ ≌, 20—30	1.—	9.—	—
Osmunda — Traubenfarn — Osmundacee.			
cinnamomea, ○ ◑ ≌, 60—100	4.—	—	—
regalis, ○ ◑ ≌, 60—100	2.—	18.—	—
» cristata, ○ ◑ ≌, 60—80	4.—	—	—
Polypodium — Tüpfelfarn — Polypodiacee.			
cambricum pulcherrimum, ◑ ● △ ■ #, 20—40	—.80	7.20	—
falcatum, ◑ ● △ ■ #, 15—30	—.50	—	—
vulgare, ◑ ● △ ■ #, 15—30	—.40	3.60	—
Polystychum — Vielträubling — Polypodiacee.			
tripteron, ○ ◑ △ #, 30—50	2.—	—	—
Pteris — (Pteridium) — Polypodiacee.			
aquilina, Adlerfarn, ○ ◑, 150—200, Wuchart!	—.80	7.20	—
Scolopendrium — Hirschzunge — Polypodiacee.			
officinarum, ◑ △ [K] # ≌, 20—40	—.60	5.40	—
Selaginella — Mooskraut — Selaginellacee.			
Douglasi, ◑ ● △ ■ # ≌, 5—10	—.30	2.70	24.—
Struthiopteris — Straussfarn — Polypodiacee.			
germanica (Onoclea), Trichterfarn, ○ ◑ ≌, 60—80	—.60	5.40	—
orientalis, ○ ◑ ≌, 50—70	1.50	—	—
pennsylvanica, ○ ◑ ≌, 80—100	1.50	—	—

Stauden

Ziergräser.

Mit den Ziergräsern ist dem Gartengestalter und Pflanzenliebhaber ein noch viel zu wenig beachteter Werkstoff an die Hand gegeben. Gartenbilder von ungeahntem Reiz das ganze Jahr hindurch lassen sich gerade mit Ziergräsern schaffen. Durch ihre graziöse Form sind die höheren Arten und Formen vorzüglich zu Gehölzvorpflanzungen geeignet oder wirken als Einzelpflanzen in Rasenflächen, was besonders von den buntlaubigen gesagt werden kann. Auch im Steingarten sollten Ziergräser bei weitem mehr Verwendung finden, denn hier sorgen sie für abwechslungsreiche Bilder und gestatten bei richtiger, flächiger Anwendung prachtvolle Herausarbeitung wertvoller Einzelstauden. Selbst als Einfassungsgräser lassen sich bestimmte Formen gut verarbeiten. Auch auf den großen Winter-Zierwert der Gräser sei noch ausdrücklich hingewiesen, denn sowohl in Farbe als auch vorzüglich bei Rauhreifbildungen sind sie die Freude eines jeden naturliebenden Gartenfreundes.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 alpine Ziergräser meiner Wahl	**M. 4.50**
10 höhere, nicht wuchernde Ziergräser meiner Wahl	**M. 6.50**

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Alopecurus — Fuchsschwanz — Graminee.			
lanatus, ∞ △ ∧ gegen Nässe Silbergrau filzig, schmallanzettlich, 15	1.50	—	—
pratensis variegatus, Wiesenfuchsschwanz, ○ ⁞‖⁞ ≌ Gelbbunt, 30—50, VII.	—.60	5.40	—
Arrhenatherum — Bandgras — Graminee.			
bulbosum variegatum, Knollensilberhafer, ○ △ ■ ≌ Feines, weissbuntes Laub, 20—30.	—.30	2.70	24.—
Arundinaria — Rohrgras — Bambusacee.			
japonica (Bambusa Metake), ♄ ○ ◑ ⊥ # ≌ Grünes Laub, 60—100.	3.—	—	—
nitida (Bambusa), ♄ ○ ⊥ # ≌ Schmalblättrig, 150—200.	3.—	—	—
Arundo — Pfahlrohr — Graminee.			
Donax, ○ ⊥ ≌ ∧ Bandförmig, schilfartig, graugrün, bis 200, Rückschnitt zum Wintersanfang!	2.—	18.—	—
Asprella — Igelgras — Graminee.			
Hystrix (Hystrix patula), Flaschenbürstengras, ◑ △ ▭ Schilfartig, weissliche Ähren, bis 60, VII.	—.60	5.40	—
Avena — Hafer — Graminee.			
sempervirens Notarisii (A. candida) ○ △ Blaugraues Gras, 30—50, VIII—IX.	—.60	5.40	—
Carex — Rietgras, Segge — Cyperacee.			
acuta variegata, ○ ≌ Gelb gestreift, 40—60, VII—VIII.	—.50	4.50	—
Buchanani, ○ △ ≌ Braunblättrig, 50—70.	—.60	5.40	—
(N) » **viridis**, ○ △ ≌ Grünblättrig, 50—70.	—.60	5.40	—
Elymus — Haargras — Graminee.			
giganteus, Blauer Riesenstrandhafer, ○ ⊥ △ ≌ Riesenform von E. glaucus.	—.60	—	—
glaucifolius, Blaugras, ○ ≌ Blauweiss bereift, 100, VII—VIII. Wuchert!	—.80	7.20	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Eulalia — Miscanthus — Graminee.			
japonica (**Miscanthus sinensis**) ○ □ ≌ . . . . Schilfartiges Laub mit weisser Mittelrippe, 120—180, IX—X.	—.80	7.20	—
» **gracillima,** ○ ⊔ ≌ . . . . Schmal- und feinblättrig, grün, 100—150, IX—X.	—.80	7.20	—
» **zebrina,** Zebragras, ○ □ ≌ . . . . Grün, gelb quer gestreift, 120—180, IX—X.	—.80	7.20	—
Festuca — Schwingel — Graminee.			
alpina, ○ △ ♎ . . . . Grün, 20, VI—VII.	—.40	3.60	—
Crinum ursi, Bärenschwingel, △ ○ ■ . . . . Grün, 10—20, VI—VII.	—.40	3.60	—
glacialis, ○ △ ♎ . . . . Zierlich, graublau, 10—20, VI—VII.	—.50	4.50	—
glauca (F. ovina glauca), Blauschwingel, ○ △ :‖: . . . . Blau, 20—30, VII—VIII.	—.30	2.70	24.—
punctoria, ○ △ . . . . **m. Tb.** Stechend, fest, blaugrau, 15—20, VII—VIII.	—.80	—	—
Gymnothrix, siehe Pennisetum.			
Imperata — Eulalie — Graminee.			
sacchariflora (Miscanthus saccharifer), Silberfahnengras, ○ □ ≌ . . . Breitblättrig, schilfartig, grün, 120—180, IX—X. **Wuchert!**	—.60	5.40	48.—
Luzula — Hainsimse — Juncacee.			
nivea, ○ △ . . . . Weiss behaart, 15—25, VII.	—.50	—	—
Miscanthus, siehe Eulalia und Imperata.			
Panicum — Hirse — Graminee.			
clandestianum, Bambushirse, ○ △ ≌ . . . . Grün, fingerig, 20—40, IX—X.	—.60	—	—
virgatum, Rutenhirse, ○ □ ≌ . . . . Breit, grün, 50—80, IX—X.	—.60	—	—
Pennisetum — Gefiederähre — Graminee.			
compressum (**P. japonicum, Gymnothrix japonica**), **Lampenputzergras,** ○ □ Sattgrün, 60—90, VIII—IX.	—.80	7.20	—
Phalaris — Glanzgras — Graminee.			
arundinacea picta, ○ □ ≌ . . . . Weissbunt, 80—120, VIII—IX.	—.40	3.60	—
Poa — Rispengras — Graminee.			
caesia, ○ △ ♎ . . . . Hechtblaue, starre Polster, 10—25, VI.	—.50	—	—
Scirpus — Binse — Cyperacee.			
eriophorus, ○ ⊔ ≌ . . . . Sattgrün, schmalblättrig, 60—100, VIII—IX.	—.50	—	—
Stipa — Feder-Pfriemengras — Graminee.			
spartea, ○ △ . . . . Dichtährig, 80—100, VI—VII.	—.50	—	—
Uniola — Ährengras — Graminee.			
latifolia, Plattährengras, ○ □ ≌ . . . . Groblaubig, schön überhängende, rispige Ähren, 100—150.	—.80	7.20	—

Stauden

Laubhölzer.

Ziersträucher-Sortimente

nach meiner freien Wahl

Ziersträucher in guten Sorten . . . . 100 Stück M. 40.—
» besonders schöne Zusammenstellung, darunter auch buntblättrige 100 » » 60.—

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen

Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück,
der Hundertpreis bei 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück einer Art und Form.

B. = Blätter, Bl. = Blüten, Fr. = Früchte.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Abelia — Abelie — Caprifoliaceae.			
Engleriana *Rehd.*, ... mit Ballen Dichtverzweigter Strauch mit einzelnstehenden Bl., an Weigela erinnernd, weiss bis blassrosa. China, 2 m, VI—VII.	1.50	—	—
spathulata *Sieb. & Zucc.* . . . . **m. Tb.** Reichverzweigter Strauch, B. hellgrün, Bl. weiss mit Gelb, ziemlich gross, endständig zu zweien. Japan, 1 m, V—VII.	1.50	13.50	—
Acanthopanax — Stachel-Kraftwurz — Araliaceae.			
Henryi *Harms.* (Eleutherococcus Henryi *Oliv.*) . . . . Baumartiger Strauch mit derbstachligem Stamm, B. 5zählig gefingert, Bl. grünlichweiss, Frucht schwarz. China, 1—3 m, VIII.	3.—	—	—
leucorrhizus fulvescens *Harms & Rehd.* . . . . Gelbgrün bezweigter Strauch, wenig bestachelt, B. 5zählig, unterseits gelbbraun behaart, Dolden lang gestielt. China, bis 3,5 m, VII.	3.—	27.—	—
Simoni *Schneid.* (Eleutherococcus Simoni *Decne.*) . . . . Strauch, bestachelt, 5zählig belaubt, dunkelgrün, stachelborstig, mit kleinen, endständigen kugeligen Blütendolden. China, Hupeh, bis 3 m, VII.	3.—	—	—
spinosus *Hort.* (Ac. Sieboldianus *Mak.*; Aralia pentaphylla *Sieb. & Zucc.*) Schönbelaubter Strauch, kräftig bestachelt, Japan, 1,5—3 m, VII.	—.60	5.50	—
Acer — Ahorn — Aceraceae.			
campestre *L.* Feldahorn, ○ ◑ ● . . . Sträucher 120—150 cm hoch Kleinlaubiger Baum od. Strauch zu Unterholz und Hecken mit quirlförmiger Aststellung, daher wertvolles Vogelschutz- und Nistgehölz. Europa, 12 m, V.	1.50	13.50	120.—
» 150—200 » »	1.75	16.—	150.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
» 10—12 » »	3.—	27.50	—
capillipes *Maxim.* . . . . 80—100 cm hoch Baumartiger Strauch mit hellgrünen B. und weiss gestreiftem Holz, Blattstiele rot, tiefrote Herbstfärbung. Winterzierde. Japan, bis 10 m, V.	2.—	—	—
carpinifolium *Sieb. & Zucc.* . . . . . Pyramiden 120—150 cm hoch Baum, interessant durch die Hainbuchen-ähnlichen B., frischgrün, für Heckenwände, Herbstfärbung herrlich braungelb. Japan, bis 10 m, V.	1.75	16.—	150.—
» 150—200 » »	2.—	18.—	—
circinatum *Pursh.* . . . . 80—100 cm hoch Strauch oder kleiner Baum, lebhaft rot und weisse Bl. und rote Fr., Herbstfärbung orangerot. Kalifornien, bis 10 m, IV—V.	1.50	13.50	—
» **aureum** *Schwer.* (A. japonicum aureum *Schwer.*) m. Ballen 20—30 cm hoch Form von langsamem Wuchs, B. sehr schön goldgelb, Fr. lachsrot.	3.—	—	—
cissifolium *K. Koch* (A. Negundo cissifol. *Sieb. & Zucc.*) 150—200 cm hoch Kleiner Baum mit dreiteiligen, hellgrünen B. an roten Stielen, rot und gelbe Herbstfärbung. Japan, bis 10 m, IV.	1.50	13.50	—
250—300 » »	2.—	18.—	—
creticum sempervirens *Pax.* (A. orientale *L.*) Δ ♯ **m. Tb.** 15—20 cm hoch Harter, immergrüner Strauch oder kleinbleibender Baum, B. klein, dreilappig. Mittelmeergebiet, bis 5 m.	2.50	—	—
dasycarpum *Ehrh.* Silberahorn . . . . 250—300 cm hoch (A. eriocarp. *Mchx.*, A. saccharinum *L.*). Breitkroniger Parkbaum m. unterseits silbergrauen, spitzlappigen B., klargelber Herbstfärbung. Für feuchte, sandige Lagen. Amerika, bis 40 m, II—III.	1.20	—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
» 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
» 14—16 » »	3.50	—	—
» 16—18 » »	4.—	—	—
» **heterophyllum** *Hort.* . . . . » 10—12 » » Form von aufrechtem Wuchs mit unregelmässig gestalteten B.	2.50	—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Acer (Fortsetzung):				
dasycarpum Jühlkei *Hort.* Form v. üppigem, straffem Wuchs, vorzügl. als Allee- u. Strassenbaum.	250—300 cm hoch	1.50	13.50	—
» **lutescens** *Späth*. Form mit leucht. gelbem Blattaustrieb und ebensolcher Herbstfärbung.	200—250 cm hoch	1.—	9.—	80.—
» **palmatum** *Grf. Schwer.* (A. dasyc. Pavia *Kirchn.*). Form mit grossen, hellgrünen, zu beiden Seiten des Mittellappens tief eingeschnittenen B.	120—150 cm hoch	1.—	—	—
» **pulverulentum** *Späth*. Form mit fein weiss oder rosa betupften B., im Herbst mit dunkelroten Blattrippen.	120—150 cm hoch	1.—	—	—
» **pyramidale** *Späth*. Form straff aufrecht wachsend, B. meist am Rande nach oben gebog.	100—150 cm hoch	1.—	9.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	3.50	—	—
	» 14—16 » »	4.—	—	—
	» 16—18 » »	4.50	—	—
» **sanguineum** *Grf. Schwer.* Form mit leuchtend roten B. an den Zweigspitzen, ältere B. von dunklem Grün.	200—250 cm hoch	1.50	—	—
» **Wieri laciniatum** *Ellw. & Barry*. Form mit zierlichen fein geschlitzten B., bildet als Einzelbaum herrliche, langzweigige Kronen.	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	—	—
	» 12—14 » »	3.50	—	—
eriocarpum, siehe A. dasycarpum.				
Ginnala *Maxim.* (A. tataricum aidzuense *Franch & Sav.*) Kleiner Baum oder Strauch mit zierlichen B. Herbstfärbung prächtig rot, rote Fruchtzierde auffallend lange haftend. Mandschurei, Japan, bis 5 m, V.	Büsche 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
	» 120—150 » »	1.25	10.—	90.—
	» 175—200 » »	1.50	12.—	100.—
Heldreichi purpuratum *Schwer.* Form des spätaustreibenden A. Heldreichi mit prachtvoll roter Blattunterseite, Herbstfärbung schön gelb.	200—250 cm hoch	1.50	—	—
japonicum *Thbg.* Japanischer Fächer-Ahorn. Baumartiger Strauch mit purpurfarbigen Trieben und mittelgrossen, 7—9lappigen, sattgrünen B. Herbstfärbung rot. Japan, 3 m, V.	70—100 cm hoch	2.50	22.50	—
	150—175 » »	3.50	—	—
» **aureum,** siehe A. circinatum aureum.				
» **Parsonsii** *Veitch*. Form grossblättrig, mit oft fast bis zum Grunde eingeschnittener Blattfläche, Herbstfärbung rot.	mit Ballen 50—70 cm hoch	2.50	22.50	—
» **Sieboldianum,** siehe A. Sieboldianum.				
laetum aureum *Hort.* (A cappadocicum aureum *Hort.*, A. colchicum aureum *Hort.*). Form des südeuropäischen, freudiggrünen Ahorn, mit rot und gelb bronzierten B.	125—150 cm hoch	3.—	—	—
» **rubrum** *Rupr.* Form im Austrieb tief gerötet, mittelgrosser Baum für enge Strassen.	200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
Lobelii *Ten.* Baum von säulenförmigem Wuchs, junge Triebe bereift, B. fünflappig, tiefgrün. **Sehr gut für enge Strassenzüge.** Italien, bis 15 m, V.	120—150 cm hoch	1.25	11.—	—
	150—200 » »	1.50	13.50	—
	200—250 » »	2.—	18 —	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
	» 8—10 » »	3.—	27.50	—
	» 10—12 » »	3.60	33.—	—
	» 12—14 » »	4.—	—	—
	» 14—16 » »	5.—	—	—
macrophyllum *Pursh*. Baum rundkronig, grossblättrig, Herbstfärbung hellorange, Fruchtstände lange hängend, gelb. Nordamerika, bis 30 m, IV—V.	150—200 cm hoch	1.50	—	—
monspessulanum, *L.* (A. trilobatum *Lam.*). Kleiner Baum oder baumartiger Strauch, B. klein, dreilappig, dunkelgrün, für trockenen Standort, sehr lange grünbleibend. Südeuropa, Kleinasien, 5—10 m, V.	Büsche 60—80 cm hoch	1.50	13.50	120.—
neglectum Annae *Grf. Schwerin*. Form beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv übergehend.	200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
	250—300 » »	2.50	22.50	—
» **elongatum** *Hort.* Form auffallend langblättrig, tief eingeschnitten, stark gewellt, Blattstiele und Adern purpurrot.	120—150 » »	1.20	—	—
Negundo argenteo-variegatum *Bonamy* (A. Negundo variegatum *Carr.*) Form des kanadischen Eschenahorns, B. weissbunt, bei überwiegen der weissen Färbung gegenüber dem Grün.	Sträucher 60—100 cm hoch	1.50	13.50	120.—
	Höhe bis zur Krone 80—100 cm	1.50	13.50	—
	» » » » 100—120 »	1.70	15.—	—
	» » » » 120—140 »	2.—	18.—	160.—

Laubhölzer

Acer (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Negundo aureo-variegatum *Booth* . . . . Sträucher 70—100 cm hoch Form mit dunkelgrünen, goldgelb gefleckten Blättern.	1.50	13.50	—
» **aureum odessanum** *Rothe* . . . . 40—60 cm hoch Form des Eschenahorns, kräftig wachsend, B. leuchtend gelb, Austrieb bronzefarbig.	2.—	—	—
nikoënse *Maxim* Nikko-Ahorn Ø . . . . 100—130 cm hoch Baum oder baumartiger Strauch mit früh austreibenden B., schön dreilappig, im Austrieb hell braunrot, später in glänzend Goldiggrün übergehend. Herbstfärbung leuchtend rot bis purpurrot. Japan, China, bis 15 m, V.	2.50	22.50	—
obtusatum *W. & K.* (A. opalus obtusatum *Henry*) . . . . 60—80 cm hoch Kleiner Baum, B. kurzlappig, breit, Bl. auffallend gelb. Südeuropa, bis 10 m, IV—V.	1.50	—	—
opulifolium *Vill.* (A. opalus) *Mill.*) . . . . 80—120 cm hoch Kleiner Baum mit dunkelgrüner, fünflappiger Belaubung, dichte, runde Kronen bildend. Südeuropa, bis 10 m, IV—V.	1.50	13.50	—
palmatum *Thbg.* (A. polymorphum *S. & Z.*) Japan. Fächerahorn ◑ ● Ø			
Kleiner Baum, B. zierlich geschlitzt, Sträucher 60—80 cm hoch	1.20	—	—
braunrot austreibend, saftig grün, Herbst- » 150—200 » »	1.50	12.—	—
färbung leuchtendrot. China, Japan, bis 8 m, VI.			
» **atrolineare** *Grf. Schw.* „Benishima" . . . mit Ballen 30—50 cm hoch B. schön dunkelrot gefärbt, bis zum Grunde geteilt, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.	3.—	—	—
» **atropurpureum** *van Houtte* „Tamabata" mit Ballen 30—40 cm hoch B. prachtvoll schwarzrot das ganze Jahr über.	2.50	22.50	—
» **atropurpureum latifolium** *Hort.* „Nomura" m. Ball. 30—40 cm hoch B. prachtvoll schwarzrot dazu besonders breitblättrig, von üppigem in die Breite gehendem Wuchs.	3.—	—	—
» **cristatum** *Grf. Schwer. & Hesse* „Shishigashira" m. Ball. 30—50 cm hoch B. schneckenförmig gewunden, schwachwüchsige Form.	3.—	—	—
» **euseptemlobum** *Grf. Schwer.* . . . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch B. sehr schön gross, Austrieb herrlich rot.	2.50	—	—
» **Friderici-Guillelmi** *Carr.* „Tojama-Nishiki" mit Ballen 30—40 cm hoch B. sehr fein und tief zerschlitzt, tiefgrün mit weisser und rosa Zeichnung.	3.—	27.—	—
» **Hessei** *Grf. Schwerin* „Oshio-beni" . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch B. sehr schön geformt und dunkelpurpurn gefärbt.	3.—	27.—	—
» **minus** *Nichols* (A. palm. ribesifolium *Hort.*) mit Ballen 30—50 cm hoch B. grün, aber kleiner als die typische Art, auch tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.	3.—	—	—
» **Nicholsoni** *Grf. Schwer.* . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch B. dunkelrot, im Sommer Blutbuchenfarbe, im Herbst mehr feurigrot	3.—	27.—	—
» **ornatum** *Carr.* „Akai-Washinoo" . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch B. mittelgross, dunkelpurpurrot, sehr fein und tief geschlitzt und gesägt.	3.—	27.—	—
» **reticulatum** *André* „Shigi-tatsu" . . . . mit Ballen 50—70 cm hoch B. mittelgross, weisslich, hellgraugrün oder weissgelblich mit auffallendem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.	3.—	—	—
» **roseo-marginatum** *v. Houtte* „Kagura" mit Ballen 30—50 cm hoch B. klein, breit dunkelrosa gerandet.	3.—	—	—
» **rubellum** *Pax.* „Washinoo" . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch B. dunkelgrün, in Form wie A. palm. ornatum.	3.—	27.—	—
» **rubrinerve** *Grf. Schwer.* . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch Blattstiele und Adern bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtendrot gefärbt.	2.50	—	—
» **rubro-latifolium** *Grf. Schwer.* . . . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch B. sehr gross, Austrieb kräftig rot, später in Grün übergehend.	2.50	—	—
» **sanguineum** *Carr.* „Chishio" . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch Austrieb kräftig blutrot, allmählich, oft fleckenweise in dunkles Oliv übergehend.	3.—	—	—
» **Schwerini** *Hesse* . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch B. ähnlich A. palm. Hessei, im Austrieb aber grün, später dunkelrot werdend.	3.—	27.—	—
» **sinuatum** *Grf. Schwerin* „Yedo-nishiki" . . mit Ballen 40—60 cm hoch	2.50	—	—
» » 100—120 » »	3.—	27.—	—
B. gross, grün, tief bis fast zum Grunde eingeschnitten.			
» **versicolor** *van Houtte* „Aoki" . . . . . . mit Ballen 50—70 cm hoch B. freudig hellgrün, mit grossen sich oft über eine ganze Lappenhälfte erstreckenden, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken.	3.—	27.—	—
» **volubile** *Grf. Schwerin* „Aobà-fuke" . . . mit Ballen 60—80 cm hoch	2.—	—	—
» » 100—120 » »	3.—	—	—
B. im Austrieb auffallend hellgrün, später über Grün nach lackglänzend Dunkelgrün wechselnd. Mittellappen oder dessen Spitze spiralförmig gedreht.			



Fraxinus Paxiana, Neueinführung!
Baum in Blüte



Fraxinus Paxiana, Neueinführung!
Einzelblütenstand



HAN Fraxinus excelsior Hessei, Neuheit!
Neue Einblattesche, Laubzweig



HAN Syringa swegiflexa, Neuheit!
Blütenstand

Acer (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
parviflorum *Franch. & Sav.* (A. crassipes *Hesse*, A. brevilobum *Grf. Schwer.*, als A. lanatum von mir aus Japan eingeführt) . . . . 150—200 cm hoch	3.—	—	—
Baum mit sehr grossen, dicklichen, dunkelgrünen B. an gelblichen Blattstielen und Zweigen. Japan, 15 m, IV—V.			
pennsylvanicum *L.* (A. striatum *Lam.*) Ø . . . . . . 150—200 cm hoch	1.50	—	—
Baum mit grossen, dreilappigen B., Herbstfärbung gelb, Holz weiss gestreift, daher auch im Winter zierend. Amerika, bis 10 m, V—VI.			
pictum *Thbg.* Mandschurischer Ahorn . . . . 150—200 cm hoch	1.—	—	—
Baum mit 5—7 lappigen B., Austrieb bräunlichrot, als grosser Alleebaum wertvoll. Mandschurei, Japan, bis 20 m, IV—V.			
» **albo-maculatum** *Dipp.* . . . . 60—80 cm hoch	1.50	—	—
Form mit tief gelappten B., am Grunde meist offen bis seicht herzförmig, weissgefleckt.			
platanoides *L.* Spitzahorn Ø . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	150.—
Baum mit spitzgelappten B. und » 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
prachtvoller gelb und roter Herbst- » 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
färbung, Wald-, Park- und Alleebaum. » 14—16 » »	3.50	33.—	300.—
Europa, bis 30 m, IV—V.			
» **cucullatum** *Nichols.* . . . . » 12—14 » »	3.—	—	—
Form mit aufgeblasen hohl geformten B.			
» **Drummondi** *Drum.* . . . . » 6—8 » »	2.—	18.—	—
Form mit graugrünen B. und scharf » 8—10 » »	2.50	22.50	—
weiss abgesetzten Rändern, Austrieb schön rosa, sehr wertvolle und konstante Form.			
» **globosum** *Hort.* Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	5.—	—	—
» » » » 200—220 » 18—20 » »	6.—	—	—
Form mit regelmässiger, dichter Kugelkrone als Vogelschutz- und Nistgehölz wertvoll, Strassenbaum für enge Strassen.			
» **integrilobum** *Zbl.* . . . . 250—300 cm hoch	1.50	—	—
Form mit grossen, ganzlappigen B.			
® » **pictum** *Hesse* . . . . Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	—	—
Form mit weiss bepuderten und marmorierten B., Austrieb schön zartrosa.			
» **Reitenbachi** *Nichols.* Ø . . . . 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
Form mit schwärzlichroten B., deren Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
Ränder nach oben gebogen sind. » 8—10 » »	3.—	27.50	—
Austrieb schön dunkelrot.			
» **rufescens** *Grf. Schwerin* . . . . . . » 10—12 » »	2.50	—	—
Form mit prächtig dunkelrotbraunem Austrieb und später dunkelgrünen B.			
» **Schwedleri** *K. Koch* Blutahorn Ø . . . . 200—250 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Form mit leuchtend blutrotem Aus- Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
trieb u. später olivgrünen B., pracht- » 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
voller Alleebaum. » 10—12 » »	4.—	36.—	—
» **undulatum** *Dieck* . . . . 250—300 cm hoch	1.50	—	—
Form mit mittelgrossen, blasig gewellten B., deren Ränder schön kraus sind.			
Pseudoplatanus *L.* Bergahorn . . . . Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
Baum mit Platanenartiger, grüner » 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
Belaubung, als hoher, breitkroniger » 14—16 » »	3.50	33.—	—
Park- und Alleebaum wertvoll für feuchten, tiefgründigen Boden. Europa, Asien, bis 30 m, V.			
» **atropurpureum** *Späth* . . . . 150—200 cm hoch	1.50	—	—
B. mit kräftiger, purpurviolett gefärbter Unterseite.			
» **cupreum** *Behnsch* . . . . 200—250 cm hoch	1.50	—	—
B. in der Jugend von hellem, reinem Kupferrot.			
» **euchlorum** *Späth* . . . . 250—300 cm hoch	2.—	—	—
Form mit oberseits dunkelgrünen B., Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.25	—	—
die sich von den hellen Unterseiten lebhaft abheben.			
» **Leopoldi** *Hort.* . Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
Form mit schön weiss, gelb und rotbunt gefärbten B., Austrieb schön rot.			
» **purpurascens** *Pax* . . . . Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Form wie die Art, jedoch die Unter- » 12—14 » »	3.—	27.50	250.—
seite der B. purpurviolett. » 14—16 » »	3.50	33.—	—
» **tricolor** *Kirchn.* . . . . 250—300 cm hoch	2.—	—	—
Form, deren B. oftmals gleichzeitig rot, grün und weissbunt sind.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Acer (Fortsetzung):			
rubrum *L.*, Rotahorn Ø . . . . 80—120 cm hoch Baum hoch- und breitkronig, B. meist fünflappig, bis 10 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits bläulichgrau, Bl. und Fr. schön rot. Herbstfärbung scharlach-orangerot. O-N-Amerika, bis 35 m, III—IV.	1.50	13.50	—
» **sanguineum** *Lav.* Ø . . . . 100—120 cm hoch Form des nordamerikanischen Rotahorns mit besonders leuchtendroter Herbstfärbung.	1.50	—	—
» **Schlesingeri** *Sarg.* Ø . . . . 100—120 cm hoch Starkwüchsige Form, B. sehr gross, Herbstfärbung prachtvoll rot.	1.50	—	—
» **tomentosum**, siehe A. tomentosum.			
» **Wageri** *Pax.* . . . . 200—250 cm hoch Form mit zierlich hängender Bezweigung und tieffünflappigen B.	2.—	—	—
rufinerve albo-limbatum *Hook. fil.* Ø . mit Ballen 80—100 cm hoch Form des japanischen, rotnervigen Ahorns mit leicht weiss-gerandeten B., Triebe bereift, Holz weiss gestreift, Herbstfärbung rötlich. Blattform ähnlich A. capillipes.	2.50	22.50	—
saccharinum, siehe A. dasycarpum.			
saccharum *Marsh.*, Zuckerahorn Ø . . . . 100—150 cm hoch Baum mit 3—5 lappigen, unterseits blaugrauen B. mit roten Stielen, Herbstfärbung goldgelb. N-Amerika, bis 40 m, IV.	2.50	—	—
Sieboldianum *Miquel* (A. japonicum Sieboldianum *Franch. & Sav.*) Ø Strauch oder kleiner Baum mit schönen, dem A. japonicum ähnlichen B., nicht ganz so tief eingeschnitten, Austrieb hellgelb, rosa gerandet, die bereits im August beginnende Herbstfärbung ist dunkel blutrot, während der Johannistrieb noch vollständig gelb ist. Japan, V.			
mit Ballen 40—60 cm hoch	1.50	13.50	120.—
» » 80—100 » »	2.—	18.—	150.—
» » 150—200 » »	2.50	22.50	200.—
spicatum *Lam.*, Gebirgsahorn Ø . . . . 125—150 cm hoch Strauch oder kleiner Baum mit dreilappigen, kleineren B. und aufrechter, gelblicher Blütenähre und den Sommer über haftenden, oft rötlichen Fr., Herbstfärbung orangescharlach. Amerika, 6—8 m, VI.	1.20	10.—	90.—
striatum, siehe A. pennsylvanicum.			
tataricum aidzuënse, siehe A. Ginnala.			
tomentosum *Desf.* (A. rubrum tomentosum *Wesm.*) . . 200—250 cm hoch Baum mit 5 lappigen B., unterseits filzig, Bl. leuchtend rot.	2.—	—	—
Trautvetteri *Medwed.* ♣ . . . . 40—60 cm hoch Baum ähnlich dem Bergahorn mit vor dem Austrieb lebhaft geröteten Knospen, grösseren, tief 5 lappigen, unterseits bleichgrünen, rotgestielten B., Fruchtflügel rot, zierend. Transkaukasien, bis 15 m, V.	2.50	—	—
triflorum *Komar.* Ø . . . . 40—60 cm hoch An A. nikoënse erinnernd, aber kleinblättriger, Herbstfärbung feurig hellrot und gelb. Mandschurei, Korea, bis 8 m.	2.—	—	—
truncatum *Bge.* . . . . 150—200 cm hoch Kleiner Baum mit tief 5 lappigen B., Blattaustrieb rot, Bl. gelblich, gross und aufrecht, Fruchtflügel auffallend kurz. China, bis 8 m, V.	2.—	—	—
Actinidia, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Adelia, siehe Forestiera.			
Aesculus — Gemeine Kastanie, Pavie — Hippocastanaceae.			
Hippocastanum *L.*, **Rosskastanie** ♣ . . . Heister 150—200 cm hoch Baum für Park, Alleen und Strasse mit 5—7 teiligen B. und grossen, aufrechtstehenden Blütenständen von bis 2 cm grossen, weissen, rot und gelb gezeichneten Einzelblüten, Fr. als Hirschfutter. Balkan, bis 25 m, V—VI.	—.80	7.—	60.—
» 200—250 » »	1.—	9.—	80.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
» 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
» 12—14 » »	3.60	33.—	300.—
» 14—16 » »	4.—	36.—	—
» 16—18 » »	4.50	40.—	—
» 18—20 » »	5.—	—	—
» 20—25 » »	6.—	—	—
» **plena** *Hort.* . . . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
» » » » » 200 » 12—14 » »	4.50	40.—	—
» » » » » 200 » 14—16 » »	5.—	45.—	—
» » » » » 250 » 20—25 » » Form mit weissgefüllten Bl., ohne Fruchtbildung.	8.—	—	—
» **pyramidalis** *Sim.-Louis*			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	—	—
» » » » » 200 » 12—14 » » Form von dicht pyramidalem Wuchs, sonst wie die Art.	4.50	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Aesculus (Fortsetzung):			
Hippocastanum umbraculifera *Rehd.*			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	—
» » » » » 200 » 12—14 » »	4.50	40.—	—
» » » » » 200 » 14—16 » »	5.—	—	—
» » » » » 200 » 16—18 » »	6.—	—	—
» » » » » 200 » 18—20 » »	7.—	—	—
» » » » » 200 » 20—25 » »	8.—	—	—
Form mit dicht kugeliger Kronenbildung, sonst wie die Art.			
macrostachya, siehe Aesc. parviflora.			
neglecta *Ldl.* (Aesc. discolor × lutea *Koehne*)			
Höhe bis zur Krone ca. 160 cm, 10—12 cm Umfang	4.—	—	—
» » » » » 160 » 12—14 » »	4.50	—	—
Baum mit 5teiligen B. und blassgelben, rötlich gezeichneten Bl. Nord-Karolina, bis 20 m, V—VI.			
parviflora *Walt.* (Aesc. macrostachya *Mchx.*)			
◑ ⊥ ✱ . . . . Sträucher 60—80 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Breiter Strauch mit 20—30 cm langen, schmalen, aufrechten Blütenrispen von weissen Bl. mit langen Staubfäden. Amerika, bis 4 m, VII—VIII.			
Pavia arguta *Hort.* (Aesc. hybrida, Aesc. octandra × Pavia) ✱ . . . . 120—150 cm hoch	2.50	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	4.—	36.—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.50	40.—	—
Baumartige Hybride mit gelben und rötlichen Bl. in 10—15 cm langen Rispen. V—VI.			
» **atrosanguinea** *Hort.* . . . . 120—150 cm hoch	2.50	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	4.—	36.—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.50	40.—	—
Form der amerikanischen, baumartigen Aesc. Pavia *L.* mit dunkelroten Bl. VI.			
rubicunda *Loisl.* (Aesc. carnea, Aesc. Hippocastanum × Pavia) ✱			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
» » » » » 200 » 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
» » » » » 250 » 18—20 » »	7.—	—	—
» » » » » 250 » 20—25 » »	8.—	—	—
Baum mit meist 5teiligen, nussartigen B., mehr runder, dichter Krone, prachtvoll roten Blütenrispen und glattschaligen Früchten, bis 15 m, V—VI.			
» **aureo-marginata** *Hort.*			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
Form mit schön gelb gerandeten B.			
» **Briotii** *Hort.* (Aesc. carnea Briotii *Nichols.*)			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
» » » » » 200 » 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
» » » » » 200 » 12—14 » »	4.80	—	—
» » » » » 250 » 14—16 » »	5.50	—	—
Form mit auffallend langen und besonders dunkelroten Blütenrispen.			
turbinata *Bl.* . . . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 12—14 cm Umfang	6.—	—	—
Baum, ähnlich Aesc. Hippocastanum, aber Blättchen breiter und grösser, unten blaugrau, einfach kerbsägig, Bl. kleiner in schmaler, aufrechter Blütenrispe von weisslichgelber Färbung, leicht rötlich gefleckt. Japan, bis 30 m, VI.			

Ailantus — Götterbaum — Simarubaceae. ✱

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
glandulosa *Desf.* (A. altissima *Swgle.*) ⚘ . . . . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Baum, auch für trockene Sandböden, sehr rasch wachsend, mit grossen Fiederblättern, grünlichen Blütenrispen und braunroten Früchten. China, bis 20 m, VI—VII.			
Vilmoriniana *Dode* (A glandulosa spinosa *Bois*) . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» 8—10 » »	2.50	—	—
» 14—16 » »	4.50	—	—
Baum mit über 1 m langen Fiederblättern, Zweige mit gelblichen, weichen, gebogenen Dornen besetzt. West-China, bis 16 m, VI—VII.			

Akebia, siehe unter „Schlingpflanzen".

Alangium, siehe Marlea.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Alnus — Erle, Else, Eller — Betulaceae.			
glutinosa *Gaertn.* Schwarzerle, Roterle . . . . . . 150—200 cm hoch	—.60	5.—	40.—
Heimischer Baum, für feuchte Lagen, B. stumpf dunkel- 200—250 » »	—.70	6.—	50.—
grün, breitrund, unterseits hellgrün. Europa, bis 25 m, III.			
incana *Willd.* Weisserle ● . . . . Heister 150—200 » »	—.60	5.—	40.—
Baum o. baumartiger Strauch mit unterseits weissgrauen B., reichen Kätzchenblüten u. sitzenden Zäpfchenfrüchten. Europa, bis 20 m, III.			
» **aurea** *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	1.50	13.50	—
Form mit gelbrotem Winterholz, gelblichen B. und langen, lachsfarbigen Blütenkätzchen. III—IV.			
» **laciniata** *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	1.20	11.—	—
Form raschwachsend, B. schön geschlitzt, sehr zierend.			
» **monstrosa** *Winkl.* △ . . . . 120—150 » »	1.—	—	—
Form von zwergartigem Wuchs, bandzweigig missgestaltet.			
macrophylla *Desf.* (A. rugosa *Spreng.*) . . . . 200—250 » »	1.20	—	—
Baum, starkwachsend, junge Triebe kantig, behaart, B. sehr gross, langoval, stumpf gesägt, oberseits sattgrün mit violetten Hauptnerven. Amerika, bis 8 m.			
rubra *Bong.* (A. oregona *Nutt.*, A. Washingtoni), Roterle 200—250 cm hoch	1.50	—	—
Sehr wüchsige Art mit kantigen Trieben, B. gross, oberseits dunkelgrün, unterseits blaugrau, leicht gelappt und doppelt gesägt. Alaska, Kalifornien, bis 20 m.			
sitchensis *Sarg.* (A. sinuata *Rydb.*) . . . . 120—150 cm hoch	1.20	11.—	—
Strauch oder kleiner Baum, mit wolligem Austrieb, B. hellgrün. Amerika, bis 12 m.			
undulata *Willd.* (A. viridis *DC* A. Alnobet. *Hartig*) Grünerle 200—250 cm hoch	1.20	—	—
Strauch mit breit eiförmigen, unterseits kahlen B., für schattige, steinige Hänge. Europa, bis 2 m, IV.			
Washingtonii, siehe A. rubra.			
Amelanchier — Felsenbirne, Traubenbirne — Rosaceae. ●			
Botryapium *de Cand.*	—.80	7.—	60.—
Strauch von dichtem Wuchs, B. rundlich, unterseits jung weissfilzig, Bl. in kurzen, aufrechten Trauben, weiss. Amerika, bis 8 m, V.			
canadensis *Med.*	1.50	—	—
Strauch oder kleiner Baum mit rotbraunem Austrieb und grossen, lockeren, weissen Blütentrauben und rotbraunen Fr., Herbstfärbung glänzend scharlachrot. Amerika, bis 10 m, V vor den B.			
cretica *de Cand.*	—.80	—	—
Strauch mit grossen, dunkelgrünen B. und rotbraunem Holz, Bl. in grossen, lockeren, weissen Trauben. Kreta, bis 1 m, V.			
laevis *Wieg.* (A. canadensis *Gray*)	1.50	13.50	—
Kleiner Baum mit in der Jugend bronzierten B. und hängenden, weissen Blütentrauben, Fr. bereift, schwarzpurpurn. Amerika, 6—8 m, V.			
spicata *Koehne*	—.80	7.—	—
Kleiner Baum o. Strauch, blüht in gedrängten weissen Trauben, 4—6 m, V.			
utahensis, *Koehne*	2.—	—	—
Strauch von langsamem, sparrigem Wuchs, Zweige rotbraun, Bl. weiß, in lockeren Ständen.			
Amorpha — Bastardindigo, Unform — Leguminosae.			
fruticosa *L.* Gemeiner Bastardindigo	—.60	5.—	45.—
Strauch mit bis 30 cm langen Fiederblättern und 15 cm langen, purpurblauen, ährigen Blütenrispen. Amerika, 4—6 m, V—VI.			
» **crispa** *Hort*	—.60	5.—	45.—
Form mit gewelltem Blattrand, sonst wie die Art.			
» **croceolanata** *Schneid.*	—.60	5.—	—
Form, deren junge Triebe und B. gelbbraunfilzig behaart sind.			
» **pendula** *Dipp.* (A. pendula *Carr.*)	—.60	—	—
Form mit hängenden Zweigen.			
Ampelopsis, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Amphirapis, siehe Microglossa.			
Amygdalus — Mandel — Rosaceae.			
nana *L.* Zwergmandel △ . . . . . Sträucher 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
Strauch, rutig oder überhängend, B. lebhaft glänzend grün, Bl. rosenrot, kurz vor oder mit dem Blattaustrieb entlang vorjähriger Triebe. Europa, Asien, bis 1,5 m, IV.			
Persica alba plena *Hort.* Zierpfirsich . . . . . . 70—100 cm hoch	2.50	—	—
Form des Pfirsichs mit weissgefüllten Blüten. 4—6 m, V.			
» **dianthiflora** *Hort.* . . . . 70—100 cm hoch	2.50	—	—
Form mit grossen, halbgefüllten, lebhaft rosa Bl.			
» **new purple leaved** *Hort.* . . . . 70—100 » »	2.50	—	—
Form mit beständig purpurfarbigem Laub. 4—6 m, V.			
» **Pollardi** *Hort.* . . . . 70—100 » »	2.50	—	—
Form sehr frühblühend mit großen, einfachen, hellrosa Bl. 4—6 m, IV.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Andrachne — Burgel — Euphorbiaceae.			
colchica *Fisch. & Mey* . . . . mit Ballen, 50—70 cm hoch und breit. Vorstrauch von dichtem, üppigem Wuchs, B. klein, blaugrün, Bl. unscheinbar grünlich. Kleinasien, bis 60 cm, IV—V.	1.—	9.—	—
Andromeda — Lavendelheide, Mannsschild — Ericaceae. ≅			
calyculata, siehe Lyonia.			
Catesbaei, siehe Leucothoë.			
floribunda *Pursh.* (Pieris floribunda *Benth. & Hook.*) ○ ◑ ♯ 20—30 cm hoch	2.—	18.—	—
Buschiger Strauch mit länglichen, immergrünen, leder- 30—40 » »	2.50	22.50	—
artigen B. und aufrechtstehenden Rispen nickender, 40—50 » » weisser Bl., Knospen bereits im Winter sehr zierend vorgebildet. Amerika, bis 1,5 m, IV—V.	3.—	27.—	—
japonica *Thbg.* Japanische Andromeda ♯ . . . . . . 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
Strauch mit schön hellgrünen, immergrünen etwas 30—40 » »	2.—	18.—	—
quirlständigen B. und prächtig weissen, überhängenden 80—100 » » Blütenrispen. Japan, bis 2 m, IV—V.	4.—	—	—
paniculata, siehe Lyonia.			
polifolia *L.* Poleiblättrige Andromeda △ ♯ . . **m. Tb.** 20—30 » » Kleinstrauch mit an Rosmarin erinnernder Belaubung und kleinen blassrosa Blütenglöckchen. Nördl. gemässigte Zone, bis 30 cm, V—VII.	1.20	11.—	—
» **angustifolia** *Ait.* Typische Wildform . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch Zweige blauer, B. lineal, schmal, unterseits weiß, Bl. weisslich. Amerika, 50, V—VII.	1.50	—	—
» **glauca** *Hort.* △ ♯ . . . . mit Ballen 20—30 cm hoch Form mit auffallend auch oberseits blauer, grösserer Belaubung.	2.50	22.50	—
speciosa *Hesse* ♯ (Andromeda speciosa nitida *Mchx.*, A. pulverulenta nuda *C. S.*, Zenobia pulverulenta nuda *Rehd.*) . . . . . . 40—60 cm hoch Form mit auch unterseits grünen, ovalen B. und langen, übergebogenen Blütenständen grosser, weisser Glocken. Amerika, bis 2 m, V—VI.	2.—	—	—
» **pulverulenta** *Mchx.* ♯ (Zenobia pulverulenta *Pollard*) 40—60 cm hoch Strauch mit blauweiss bereiften, ovalen B. und langen, übergebogenen Blütenständen großer, weißer Glocken. Amerika, bis 2 m, V—VI.	2.50	22.50	200.—
Anthyllis, siehe unter „Stauden".			
Aralia — Aralie — Araliaceae.			
chinensis mandschurica *Rehd.* (A. elata *Seem.*) . . . 80—120 cm hoch	3.—	27.50	—
(Dimorphantus mandshuricus) 150—200 » »	5.—	—	—
Baumartiger Strauch m. b. 1 m langen, gefied. B. und 200—250 » » grossen, weissen Doldentrauben. Mandschurei, Japan, Korea, bis 15 m, VIII.	8.—	—	—
pentaphylla, siehe Acanthopanax.			
Arbutus — Erdbeerbaum — Ericaceae.			
Unedo *L.* ♯ . . . . mit Ballen, 40—60 cm hoch	2.50	22.50	200.—
Baum mit glänzend dunkelgrünen B., weissen » » 60—80 » » oder rötlich angehauchten Blütenglöckchen in dichten Trauben und erdbeerartigen Fr. Südeuropa, bis 10 m, IX.	3.—	27.50	—
Arctostaphylos — Bärentraube — Ericaceae.			
uva-ursi *Spreng.* △ ♯ . . . . **m. Tb.** Niederliegender Strauch, wurzelnd, mit kleinen, ovalen B. und von feinzweigigem Wuchs, Bl. weisslich rot. Europa, Nordamerika, IV—VII.	2.—	18.—	—
Aristolochia, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Aristotelia — Fieberbeerlinde — Eleocarpaceae.			
Macqui *L'Herit.* ♯ ∧ . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch Baumartiger Strauch mit dünnlederigen, beiderseits glänzend grünen B., achselständigen, grünlichweissen Bl. und erbsengrossen, fleischigen Beeren. Chile, Kalifornien, 2 m, IV—V.	2.50	—	—
Aronia — Zwergvogelbeere — Rosacee.			
arbutifolia *Elliott.* ☙ ⊘ . . . . Strauch, laubabwerfend, B. glänzend grün, Herbstfärbung lebhaft rot und gelb, Bl. weiss bis rosa, Fr. glänzend scharlachrot. Amerika, bis 2,5 m, V.	—.60	5.—	45.—
nigra *Dipp.* (A. melanocarpa *Elliott*) ☙ ⊘ . . . . Strauch ähnlich A. arbutifolia, B. oberseits glänzend sattgrün. Herbstfärbung braunrot, Bl. reinweiss, Fr. schwarz. Nordamerika, 1 m, V.	—.60	5.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Artemisia — Beifuss, Wermut — Compositae. ♄ ∞ △			
Abrotanum *L.* Eberraute Halbstrauch mit aschgrauen, aromatischen, feinen B., endständigen, gelben Blütenköpfen mit vollkommenen Randblüten. Südeuropa, 30—100 cm, VIII—X.	—.80	7.—	—
maritima incana *Hort.* Grauer Meerstrand-Beifuss . . . . mit Ballen Form mit grossen, weissfilzigen B. und gelben Blütenköpfchen. Südostrussland, 30—60 cm, VIII—X.	1.—	—	—
procera *Willd.* Halbstrauch mit dunkelgrünen, fein zerteilten B. und gelblichgrünen Bl. Südeuropa, Kleinasien, bis 2 m, IX—X.	—.80	—	—
salina *Willd.* ♃ . . . mit Ballen Halbstrauch m. nickenden, gelb. Blütenköpfch. Europa, 30—60 cm, IX—X.	1.—	—	—
tridentata *Nutt.* . . . **m. Tb.** Strauch mit silbergrauen, stark duftenden B., einfach und nur an der Spitze 3—7 zähnig. Nordamerika, bis 2 m, VIII—IX.	1.50	13.50	—
Arundinaria, siehe unter „Ziergräser".			
Atraphaxis — Bocksweizen — Polygonacee.			
frutescens *K. Koch* (A. lanceolata *Meissn.*) ○ △ . . . **m. Tb.** Wüstenstrauch, laubabwerfend, Zweige dünn, grauweiss, B. länglich-lanzettlich, pergamentartig, kurz gestielt, Bl. zu 2—5 gebüschelt, am Ende der Zweige, weiss oder rötlichweiss. Südrussland, 60—80, VI—VIII.	2.—	—	—
Atriplex — Melde — Chenopodiaceae. ♄			
canescens *James*, Graumelde ∞ △ . . . **m. Tb.** Wüstenstrauch mit weissgrauem Holz, lanzettlichen, graugrünen B. und kleinen Bl. in Scheinähren. Amerika, bis 1,5 m, VIII.	1.50	13.50	—
portulaccoides *L.* (Obione portulaccoides *Mqu.*) . . . **m. Tb.** Halbstrauch, niederliegend oder aufsteigend, rutenförmige Zweige, B. verkehrt-eirund, ganzrandig, Bl. gelblich, in locker ährig-rispigen Knäuel. Europa, Afrika, 60—80, VII—IX.	2.—	—	—
verrucifera *Bieb.* . . . **m. Tb.** Halbstrauch, groblaubig, mehr graugrün. Bis 60, VII—IX.	1.50	—	—

Azalea — Azalee — Ericaceae. (Siehe auch „Rhododendron".)

mollis *Bl.*, gelb- und rotblühend, ⌀

mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 1.70, 10 Stück M. 15.—, 100 Stück M. 135.—
» » 40—50 » » 1 » » 2.50, 10 » » 22.50, 100 » » 200.—

Strauch, laubabwerfend, blüht gelb oder rot vor der Entfaltung des Laubes, Herbstfärbung in feurigroten Tönen. China, Japan, bis 1,5 m, V.

» **sinensis** *Hort.*, prachtvoll lachsrot, ⌀

mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
» » 40—50 » » 1 » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 » » 240.—
» » 60—70 » » 1 » » 5.—, 10 » » 45.—
» » 70—80 » » 1 » » 6.—, 10 » » 54.—, 100 Stück M. 500.—

» **Hybriden**, in ausgesucht schönsten Varietäten, ⌀

mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—, 100 Stück M. 215.—
» » 40—50 » » 1 » » 3.—, 10 » » 27.—, 100 » » 240.—
» » 50—60 » » 1 » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 290.—
» » 70—80 » » 1 » » 6.—, 10 » » 54.—, 100 » » 480.—
» » 80—100 » » 1 » » 8.—, 10 » » 70.—, 100 » » 630.—

Alphonse Lavallée, orange
Baron Edmund de Rotschild, mennigrot, gelb gefleckt
Charles François Luppis, dunkelrosa
Charles Rogier, weiss
Chevalier de Reali, hellgelb
Comte de Gomer, rosa
Comte Papadopoli, orangerot
Consul Céresole, orangerot
Consul Pêcher, dunkelrosa
Dr. Léon Vignes, lebhaft gelb
Dulcinée, lachsrot
Edison, hellrot
Esmeralda, rot
Frédéric de Mérode, feurig-karmin
Frère Orban, weissgelb
General Brialmont, rosa
General Goffinet, violett
Gloire de Belgique, hellrosa
Hendrik Concience, rosa
I. C. van Tol, rot
Mad. Arthur de Warelles, lachsrot
Mad. Caroline Legrelle d'Hanis, rosa
Mignonne, rosa
Oswald de Kerchove, rosa
Prinz Baudouin, hellrot
Souvenir de Louis v. Houtte, weiss
W. E. Gumbleton, nankinggelb

mollis × sinensis (Kostersche Hybriden), ⌀

mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.75, 10 Stück M. 24.—
» » 40—50 » » 1 » » 3.—, 10 » » 27.—

Wiederholt preisgekrönte Varietäten mit sehr grossen Blumen und glänzendem Farbenspiel

Alma Tadema, zartrosa
C. Maarschalk, orange
Dr. Reichenbach, salmorange
Emil Liebig, lachsfarbig
Franz v. d. Bom, hellorange
General Vetter, nanking
Hortulanus Witte, orangegelb
Hugo Koster, lachsfarbig
I. I. de Vink, nanking
Mrs. A. E. Endtz, dunkelgelb
N. Beets, goldgelb
Sebastopol, zartrosa
T. J. Seidel, salmorange

Azalea (Fortsetzung):

Koster's Brillant Rot, leuchtend scharlachrot, Blumen und Dolden groß und sehr schön, Wuchs kräftig. Pflanzen mit Knospen, 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 3.50, 10 Stück M. 30.—

pontica *L.* (Rhododendron flavum *G. Don*), Pontische Azalee, ∅

Strauch, laubabwerfend, gelbblühend mit der Entfaltung des Laubes, fein würzig duftend. Herbstfärbung in roten Tönen. Kleinasien, bis 1,5 m, Ende V.

mit Knospen, 40—50 cm hoch	1 Stück M. 2.50	10 Stück M. 22.50
» » 60—70 » »	1 » » 3.50	
» » 70—80 » »	1 » » 4.50	10 » » 40.—
» » 80—100 » »	1 » » 5.50	10 » » 50.—

pontica Hybriden, aus nachfolgendem Sortiment, ∅

mit Knospen, 30—40 cm hoch	1 Stück M. 2.75	10 Stück M. 24.—	100 Stück M. 215.—
» » 40—50 » »	1 » » 3.—	10 » » 27.—	100 » » 240.—
» » 50—60 » »	1 » » 3.75	10 » » 34.—	

Nachfolgende Sorten sind aus vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt

Admiral de Ruyter, blutrot
Beauté de Flandre, lachsrot
Bijou de Gentbrügge, reinweiss, gefüllt
Blood red, feurig blutrot
Bouquet de flore, aurorarot
Clotilde, weiss
Comte Egmont, lilarosa
Eugénie, orangepurpur
Fama, karmesin
㊥ **Goldlack,** goldigorange
Graf von Meran, weiss mit Rosa, gefüllt
Guelderroos, orange
Guilleaume II., orangerot
Heureuse surprise, milchweiss
Jenny Lind, nankingrosa
La surprise, lachsrosa
Louis Ainée van Houtte, zinnoberrot, gefüllt
Louis Hellebuyk, zinnober
miniata floribunda, hochrot
Neron, karmesinrot
Pallas, hellrot
Prince Hendrik des Pays-bas, dunkel blutrot
Princesse Charlotte, rosa
Rose de Flandre, rosa
rubra splendidissima, dunkelkarminrot
sinensis alba grandiflora, reinweiss
van Houttei flore pleno, lachsrot, gefüllt
Victoria, lachsrot

rustica plena Hybriden, gefülltblühende Sorten, ∅

mit Knospen 30—40 cm hoch	1 Stück M. 2.75	10 Stück M. 24.—	100 Stück M. 215.—
» » 40—50 » »	1 » » 3.—	10 » » 27.—	100 » » 240.—
» » 50—60 » »	1 » » 3.75	10 » » 34.—	
» » 60—70 » »	1 » » 5.—	10 » » 45.—	
» » 70—80 » »	1 » » 6.—	10 » » 54.—	

Kreuzungen zwischen Azalea pontica-Hybriden und Azalea mollis × sinensis (Kostersche Hybriden) ergaben wertvolle, nachstehend aufgeführte, gefüllte Sorten. Heute als Rhododendron mixtum *Wils.* bezeichnet. Bis 1,5 m. Ende V.

Aida, violettrosa
Apelles, reinweiss
Ariadne, weiss mit Rosa
Freya, aprikosenfarbig
Hora, fleischfarbig
Le Titien, rosa
Mecène, weiss
Milton, weiss
Murillo, rosa purpurn
Norma, rot
Phèbe, schwefelgelb
Phidias, gelblichweiss
Praxiteles, rot mit Nanking
Ribera, weiss
Velasquez, weiss
Virgile, weiss

Verschiedene Arten und Formen.

Azalea	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
albiflora *Ktze.* (Rhod. albiflorum *Hook.*) . . . . 40—50 cm hoch Strauch, laubabwerfend, B. dunkelgrün, Bl. weiss, 2 cm gross. Amerika, bis 2 m, VI—VII.	2.—	18.—	—
amoena *Ldl.* (Rhod. obtusum amoenum *Rehd.*), △ ♯ . . 30—40 cm hoch Strauch, halbimmergrün, Bl. lebhaft magentarot, gegen 2 cm gross. Japan, 30 cm, IV—V.	2.—	18.—	150.—
arborescens *Pursh.* (Rhod. arborescens *Torr.*) . . . . . 40—50 cm hoch Strauch, laubabwerfend, B. lebhaft grün oberseits,	2.—	18.—	—
50—60 » » blaugrau oder mattgrün unterseits, Bl. zu 3—6 nach dem Laub, weiss, rosa angehaucht, wohlriechend. Amerika, bis 3 m, VI—VII.	2.50	22.50	200.—
Arendsi *Hort. Arends,* △ ♯ . . . . 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, Kreuzung verschiedener japanischer Azaleen in schönen lila, rosa, lachs- und karminrosa Tönen. Bis 1 m, V.	2.50	22.50	—
balsaminiflora *Carr.* (Rhod. indicum balsaminaeflorum *Nichols.*, Az. **rosaeflora** *R. Dean*, Komanyo-satsuki der Japaner), △ ♯ . . . . 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, Bl. halbgefüllt lachsrot, f. wärm. Lagen. Japan, 50 cm, V.	2.—	18.—	150.—
calendulacea *Mchx.* (Rhododendron calendulaceum *Torr.*) 30—40 cm hoch Strauch, laubabwerfend, Bl. ringelblumenfarbig orangegelb bis feuerrot mit der Entfaltung der B. Amerika, bis 3 m, V.	2.75	—	—
Hatsu-giri *Hort.* (Rhod. amoenum normale *Maxim.*), △ ♯ . 20—30 cm hoch Zwergstrauch, immergrün, dicht, einfach und reichblühend, violettrot. Japan, 30 cm, V.	1.50	13.50	120.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Azalea (Fortsetzung):			
indica macrantha *Hort.* (Rh. ind. macr. *Maxim.*) △ ♯ 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, mit sehr grossen, einfachen, lachsroten Bl. Japan, 50 cm, VII.	1.50	13.50	120.—
ledifolia leucantha *Hort.* (Rhod. mucronatum *G. Don.*, Az. rosmarinifolia alba *Rehd.*, „Weisse Yodogawa") . . . 30—40 cm hoch Strauch, halbimmergrün, Bl. weiss, trichterig, glockenförmig. Japan, China. 1 m, V.	2.—	—	—
odorata hybrida Daviesii *Hort. Rehd.* (Rhod. viscosepalum Daviesii *Rehd.*) . . . . 30—40 cm hoch Strauch, laubabwerfend, B. unterseits grau, Bl. gross, 40—50 » » gelblich, später wachsweiss, wohlriechend. Beste 50—60 » » Treibsorte. Amerika, bis 3 m, VI—VII.	2.75 3.— 3.75	24.— 27.— 34.—	215.— 240.— —
procumbens, siehe Loiseleuria.			
Schlippenbachii *Ktze* (Rhod. Schlippenbachii *Maxim*) . . 40—50 cm hoch Strauch, laubabwerfend, mit auffallend breiten, grossen B. und blassrosa Bl. Korea, Japan, bis 3 m, V.	2.50	22.50	—
Tebotan (Rhododendron phoeniceum tebotan *Wils.*, Rhod. Kaempferi × rosmarinifolium, „Fuji-manyo" der Japaner) ♯ 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, Bl. gefüllt, gross, lila mit kleinen, grünen Blättchen in der Mitte der Blüte. Japan, 80 cm, V.	1.50	—	—
Vaseyi *Rehd.* (Rhododendron Vaseyi *A. Gr.*) . . . . . 40—50 cm hoch Strauch, laubabwerfend, reichblühend, lebhaft hellrosa mit rotorange Oberlippe, im Verblühen fast weiss. Amerika, bis 3 m, V—VI.	2.50	22.50	200.—
viscosa *L.* (Rhod. viscosum) . . . . 70—80 cm hoch Strauch, laubabwerfend, Bl. nach den B., klein, weiss bis blassrosa, duftend. Amerika, bis 3 m, in Kultur 1—1,5 m, VI—VII.	3.50	31.50	280.—
» **glauca stricta** *Hort.*, ... 40—50 cm hoch Form mit unterseits graublauen B., oberseits 80—100 » » blaugrün, sonst wie die Art.	2.50 5.—	20.— 45.—	— —
Azara — Flacourtiaceae.			
microphylla *Hook. fil.* △ ♯ ∧ . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch Strauch, immergrün, mit kleinen, glänzendgrünen Blättchen und unscheinbaren grünen Bl. Chile, 0,5—5 m, III—IV.	1.20	11.—	—
Benthamia, siehe Cornus.			
Benzoin, siehe Lindera.			
Berberis — Berberitze, Sauerdorn — Berberidaceae.			
actinacantha *Martius*, Strahlendornige Berberitze △ ♯ . . mit Ballen Strauch, halbimmergrün, Zweige rotbraun mit starken, mehrteiligen Dornen, B. glänzend dunkelgrün, tief buchtig, dornig gezähnt, Bl. zu 3—6, goldgelb, Früchte sehr gross, schwarzrot, schön blau bereift. Chile, bis 1,5 m, IV—V.	2.—	18.—	—
aggregata *Schneid.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. quirlig, lebhaftgrün, Bl. gelb in dichten Rispen, Fr. klein, durchscheinend gelblichweiss, schwach rot bereift. Westchina, bis 2 m, V—VI.	1.50	13.50	120.—
» **Pratti,** siehe B. Pratti.			
Aquifolium, siehe Mahonia Aquifolium.			
Beaniana *C. Schn.* . . . . Strauch, laubabwerfend, Holz anfangs rötlich, B. elliptisch-lanzettlich, bis 4 cm lang, dornig gezähnt, unterseits weisslich, Bl. in vielblütigen Rispen, Fr. purpurn. Westchina, 150, V.	1.50	—	—
brachypoda *Maxim.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. fein gesägt, Bl. gross, hellgelb, Fr. reif scharlachrot. China, bis 2,5 m, V.	1.50	—	—
Bretschneideri *Rehd.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. lebhaft gelbgrün, scharf gesägt, Bl. zu 5—7 in ca. 6 cm langen, hängenden Rispen, gelb, Fr. länglich purpurblau, weisslich bereift, Herbstfärbung orange mit Scharlach. Japan, bis 2,5 m, V.	1.50	—	—
brevipaniculata *Schneid.* . . . . Strauch, laubabwerfend, dicht belaubt, Zweige rot, Bl. hellgelb, Fr. rosa. Westchina, 1,5 m, VI.	—.80	7.—	60.—
buxifolia *Poir* (B. dulcis *Sw.*) ● △ ♯ . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, kleinblättrig, ganzrandig, Zweige rotbraun, Bl. zu 3—5, goldgelb, Fr. gross, schön blaubereift. Südamerika, bis 2 m, V.	1.—	9.—	80.—
» **nana** *C. S.* (B. dulcis nana *Hort.*) ● △ ♯ mit Ballen 30—40 cm hoch Form von zwergigem Wuchs, dicht, für Einfassungshecken, bis 50 cm, V.	—.80	7.—	60.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Berberis (Fortsetzung):			
candidula, *Schneid.* △ # . . . . mit Ballen Strauch immergrün, Holz glatt, B. scharf gezähnt, unterseits blendend weiss, Bl. langgestielt, einzeln, schön gelb. China, bis 50 cm, V—VI.	2.50	22.50	200.—
Caroli hoanghensis *Schneid.* (B. **Vernae** *Schneid.*) ꝏ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, von ausladend-überhängendem Wuchs, Zweige glänzend purpurbraun, Bl. in dichten, langen Trauben, Fr. klein, kugelig, rot. West-Szechuan, 1,5—3 m, VI.	2.—	18.—	—
Cavaleriei *Lev.* # . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, im Laub zwischen B. Gagnepaini und B. Julianae stehend, B. bis 9×3 cm gross, stark stachelzähnig gerandet, oberseits stumpfgrün, unterseits glänzend hellgrün, Austrieb rötlich.	2.—	—	—
circumserrata *Schneid.* Ø . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, mit schön ringsum stark gezähnten B., Wuchs locker und langsam, Bl. ähnlich B. diaphana, zu 1—3, gelb, Fr. ähnlich B. Tischleri, länglich gelbrot, nur 4 Kerne enthaltend. NW.-China, 100, V.	1.50	—	—
concinna *Hort.,* ꝏ Ø . . . . **Echt!** mit Ballen Strauch, laubabwerfend, ziemlich belaubt, von ausgebreitetem Wuchs, B. dunkelgrün, unterseits weisslich, derb gezähnt am Rande, Bl. in Büscheln, 4—5 blütig, Fr. rot, birnförmig, Stacheln dreiteilig. Himalaja, 80—120, V—VI.	1.50	13.50	—
Coryi, siehe B. Wilsoni subcaulialata.			
Darwini *Hook.* △ # ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, dichter Wuchs, B. steif lederartig, dunkelgrün, an der Blattspitze in drei grosse, dornartige Zähne auslaufend, Bl. in sehr schön orangegelben Trauben, Fr. blauschwarz. Chile-Patagonien, 100, V.	2.—	18.—	160.—
dictiophylla *Franch.* Ø . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, aber sehr lange sitzend, Zweige jung bläulichweiss bereift, B. hellgrün, unterseits weisslich, Bl. einzeln, schwefelgelb, Fr. korallenrot. SW.-China, 150—200, V—VI.	1.50	—	—
» **albicaulis** *Hort.,* **neu, sehr selten** Ø . . . . mit Ballen Form ähnlich der Art, jedoch Zweige dauernd stark weiss bepudert, Unterseite der B. ebenfalls. Von grosser Zierwirkung, 150—200, V—VI.	2.—	18.—	—
Dielsiana *Fedde* . . . . mit Ballen Strauch, ähnlich B. Henryana, laubabwerfend, locker verzweigt, B. schmal elliptisch, unterseits weisslich, Bl. hellgelb, Fr. spätreifend, walzenförmig, glänzend lackrot. China, 200, VI.	1.50	13.50	120.—
dulcis, siehe B. buxifolia.			
Farreri *Hort. Monac.* △ ꝏ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, kleinlaubig, hellgrün, unterseits graugrün, ganzrandig, Bl. in kurzen, dicken Trauben, Fr. dicht am Zweige sitzend, lachsfarben. Hybride, 50, VI.	1.50	13.50	—
Fendleri *Gray* ꝏ Ø . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. ziemlich gross, meist ganzrandig, mit schön roter Herbstfärbung, Bl. in 6—10 blütigen, traubigen Ständen, schön gelb mit aussen orangeroter Tönung, Fr. leuchtendrot. Amerika, 100—150, VI.	1.50	13.50	—
Francisci-Ferdinandi *Schneid.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, mit langen, einzelstehenden Stacheln, B. meist zu 6 gehäuft, oval bis ovallanzettlich, Rand stachelzähnig, oberseits leuchtend grün, unterseits heller, Bl. gelb in langen Hängetrauben, Fr. oval, scharlachrot. Westchina, 2—3 m, V—VI.	1.50	13.50	—
Gagnepaini *Schneid.* # . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, B. tiefgrün, schmallanzettlich, Bl. hellgelb, Fr. bläulichpurpurrot. Westchina, 200, VI.	2.—	18.—	—
® **Giraldii** *Hesse* ꝏ Ø . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, früh austreibend mit Bronzeton, B. ziemlich gross, Rand stachelzähnig, meist rotbraun, Herbstfärbung rötlich, Bl. grünlichgelb in bis 12 cm langen, dichten Trauben, Fr. länglich, scharlachrot. Nordchina, 2—3 m, VI.	1.50	—	—
Henryana *Schneid.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, Wuchs aufrecht, sparrig, B. kurz, breit, stumpf, unterseits graugrün, Bl. sattgelb in Trauben, Fr. rot. Westhupeh, 200, VI.	2.—	—	—
Hookeri *Lem.* △ # . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. meist zu dreien, lederartig, unterseits weiss, Bl. gross, schwefelgelb, Fr. schwärzlich. Himalaja, 150, V—VI.	2.—	—	—
» **compacta** *Hort.* △ #. . . . . mit Ballen Form in Wuchs und B. kleiner als die Art, sonst in den Eigenschaften dieser gleich. 80, V—VI.	2.—	—	—
hybrido-Gagnepaini *Hort. Holl.* (B. Gagnepaini×verruculosa) △ # . . . . mit Ballen Kulturform zwischen den beiden Eltern stehend.	2.—	18.—	160.—

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Berberis (Fortsetzung):			
Julianae *Schneid.* # . . . . mit Ballen, 30—40 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Strauch, immergrün, kräftig bestachelt, B dun- » » 40—60 » »	3.—	27.—	240.—
kelgrün, lederartig, unterseits heller, oval-ovallanzettlich, Rand stachelzähnig, Bl. sehr reich, in Trauben, gelb, Fr. elliptisch, schwarz, leicht bläulich bereift. West-Hupeh, 200, V.			
koreana *Palib.* ⊘ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend. B. breit oboval, dunkelgrün, im Herbst in Rot übergehend, Bl. ziemlich gross in reichblütigen Trauben, Fr. dunkelrot. Korea, 100—150, V.	1.50	13.50	—
linearifolia *Phil.* # . . . . **Neu!** mit Ballen Strauch, immergrün, B. sehr schön dunkelgrün, schmallineal, stachelspitz, unterseits bläulich, Bl. tief aprikosengelb, in dichten Büscheln in überreicher Fülle, Fr. schwarz, bereift. Chile, 1—2 m, V—VI.	7.50	—	—
lologensis *Sandw.* # . . . . **Neu!** mit Ballen! Naturhybride, B. Darwini×linearifolia, immergrün, B. breiter und glänzender als die von B. linearifolia, Bl. mehr orangegelb. Lolog-See, Chile, bis 2 m, V—VII.	7.50	—	—
Neuberti, siehe Mahoberberis.			
(HA) **notabilis** *Schneid.* ☘ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, grosslaubig, an Berb. heteropoda erinnernd, aber Fr. auffallend gross, dunkelrot, pflaumig angehaucht. Hybride, 150, VI.	2.—	18.—	—
oblonga *Schneid.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, Holz kastanienbraun, B. ungleich oboval bis elliptisch, 2—5,5 cm gross, ganzrandig oder wenig gezähnt, graugrün, unterseits blaugrau, Bl. gelb, in 10—20 blütiger Traube, bis 1 cm gross, Fr. schwarzrot, bereift. Turkestan, 2 m, V—VI.	1.50	—	—
parvifolia *Sprague.* △ . . . . **m. Tb.** Strauch, meist laubabwerfend, B. sehr klein, 1,5 cm gross, Bl. gelb in Büscheln. Westchina, 50—80, V—VI.	2.—	—	—
polyantha *Hemsl.* ☘ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, straff aufrecht, mit übergebogenen Zweigen, B. hellgrün, Bl. tiefgelb, in schönen, aufrechten Blütenständen den ganzen Zweig entlang, Fr. lachsrot. Westchina, 200—300, VI.	1.50	13.50	120.—
Prattii *Schneid.* (B. aggregata Prattii *Schneid.*) ☘ . . . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, dicht bestachelt, kleinlaubig, quirlig, Bl. gelb, Fr. lachsrot, bereift. Westchina, 100, VII.	1.50	13.50	120.—
pruinosa *Franch.* # ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, sparrig, B. in vierzähligen Rosetten, 3—5 cm lang, länglichoval, Bl. hellgoldgelb in Büscheln, Fr. oval, blauschwarz bereift. SW-China, 100—200, V—VI.	1.50	13.50	—
replicata *W W.Sm.* # . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, Zweige gelblich, überhängend, dichtbuschig, B. schmal, Ränder umgerollt, nur wenig gezähnt, Bl. zitronengelb, Fr. schwarz. SW-China, 150, III—IV.	2.—	18.—	—
sanguinea *Franch.* △ # . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün. B. dornig bestachelt, 4—6 cm lang, 6—8 mm breit, lichtgrün, Bl. sattgelb, zu 2—4 gebüschelt, Kelch schön rot. Westchina, bis 2 m, V.	2.—	—	—
Sargentiana *Schneid.* # . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. hellgrün, ziemlich gross, dicht dornig gesägt, Bl. gelb, ziemlich gross, in Büscheln, Fr. blauschwarz, leicht bereift. Mittelchina, 100—150, V—VI.	2.—	—	—
serotina *Lge.* (B. chinensis *Poir.*) . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. meist ganzrandig, klein, oboval, Bl. gelb, in Trauben, Fr. elliptisch, dunkelrot, öfters bereift. Kaukasus, 200, V.	1.50	13.50	—
Stapfiana *C. S.* (B. Wilsonae Stapfiana *C. S.*) △ ☘ . . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, stark bestachelt, dichtbuschig, B. verkehrt lanzettlich, Bl. klein, zu 4—7, sattgelb, Fr. elliptisch, dunkel karminrot. Westchina, 80—100, V.	1.50	13.50	120.—
stenophylla *Mast.* (B. Darwini×empetrifolia) △ # ∧ **m. Tb.** 30—40 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Strauch, immergrün, m. rotbraunen Zweigen, mit Ballen 40—60 » »	3.—	27.—	—
B. lederartig, schmal, oberseits dunkelgrün, unterseits grau bis weisslichgrün, Bl. lebhaft rein goldgelb, Fr. schwarz. Hybride, 150—200, V.			
» **Irwini** *Hort.* △ # . . . . **m. Tb.** Form im Wuchs niedriger, dichter als die Art, B. breiter, zackiger.	2.—	18.—	160.—
» **latifolia** *Hort.* △ # . . . . **m. Tb.** Form, aufrecht wachsend, B. breit, dunkelgrün, Bl. satt goldgelb, am alten Holze.	2.—	18.—	—
subcaulialata, siehe B. Wilsonae subcaulialata.			

Berberis (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Thunbergi *DC.* ♙ ☘ Ø . . . . Sträucher 40—60 cm hoch Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, sehr reichblühend, Bl. meist einzeln, hellgelb, aussen rötlich, Fr. korallenrot, elliptisch, Herbstfärbung feurig bis mennigrot. Japan, 150, IV—V.	—.60	5.—	45.—
» **atropurpurea** *Hort.* ♙ ☘ Ø . . . . . . Sträucher 50—70 cm hoch	—.90	8.—	70.—
Form, rotblättrig, von ausgezeichneter Farbwirkung das ganze Jahr über. » 80—100 » »	1.25	11.—	—
» **Maximowiczi** *Franch. & Savat.* ♙ ☘ Ø . . . . Form, besonders dicht und straffwüchsig, für Hecken besonders geeignet, hellgrün belaubt, sonst wie die Art.	—.80	7.—	60.—
» **minor** *Rehd.* △ ☘ Ø . . . . Form, sehr schwachwachsend, in allen Teilen kleiner als die Art, nur 50 cm hoch.	—.80	7.—	60.—
tibetica *Schn.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, Dornen bis 2,5 cm lang, B. oboval, 1—2,5 cm gross, ganzrandig oder wenig gezähnt, Fr. rot. Westchina, 1,5—2 m, VI.	1.50	—	—
Tischleri *Schneid.* . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, stark bestachelt, stark gezähnte B. zu 8 gebüschelt, tiefgrün, unterseits heller und bereift, Bl. gelb, in mehrblütigen Trauben, Fr. länglich, blutrot. China, 200, V.	1.50	13.50	—
Veitchi *Schneid.* △ # . . . . mit Ballen, 30—50 cm hoch Strauch, immergrün, B. lanzettlich, 6—12 cm lang, dunkelgrün, am Rande dornig, Stacheln kräftig, dreiteilig, Bl. gebüschelt, bleichgelb, Fr. blau bereift. China, 150, V.	2.—	18.—	—
Vernae, siehe B. Caroli hoanghensis.			
verruculosa *Hemsl. & Wils.* △ # . . . . . . mit Ballen, 20—30 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Strauch, immergrün, B. hellgrün, scharf stachelzähnig, klein, glänzend, unterseits blaugrau, Zweige rauhdrüsig, Bl. gross, goldgelb, Fr. länglich, bereift. Westchina, 50, V—VI. » » 30—40 » »	2.—	18.—	160.—
Vilmorinii *Schneid.* (B. Soulieana *Schneid.*) # . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, Triebe gelblich, B. lanzettlich, grob gezähnt, Fr. elliptisch, blau bereift. China, VI, 150.	2.50	—	—
vulgaris atropurpurea *Rgl.* ♙ ☘ Ø . . . . Form der gemeinen Berberitze, B. dunkelrot mit pflaumenblauem Hauch, Bl. gelb in Trauben, Fr. in Trauben, länglich purpurrot. Europa, bis 2 m, V.	—.60	5.—	45.—
Wallichiana *D.C.* △ # . . . . mit Ballen, 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, ähnlich Berb. Hookeri.	2.—	18.—	160.—
Wilsonae *Hemsl. & Wils.* △ ☘ Ø . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, auffallend stachelig, dichtbuschig, kleinblättrig, reichblühend, Bl. goldgelb, Fr. üppig, lachsrot, Herbstfärbung schön karminrot. Westchina, 80, V—VI.	1.50	13.50	—
» **subcaulialata** *C. S.* (B. subcaulialata *Schneid.*, B. Coryi *Veitch.*) △ ☘ Ø mit Ballen Strauch, laubabwerfend, stark bestachelt, B. unterseits grauer als bei B. Wilsonae, Bl. hellgelb, 6—8 blütig, Fr. lachsfarbig, gelbrot. Westchina, bis 100, VI—VII.	1.50	13.50	120.—
yunnanensis *Franch.* Ø . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige rundlich, wenig bestachelt, B. kleiner als bei Berb. diaphana, oft ganzrandig, weit netznervig, Herbstfärbung sehr fein rot, Bl. gelb, gross, Fr. gross, rot. Yunnan, bis 2 m, V—VI.	1.50	—	—

Betula — Birke — Betulaceae.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
alba *L.*, Weissbirke . . . . 120—150 cm hoch Baum mit ansteigenden Ästen, Rinde weiss werdend, B. klein. Europa, bis 20 m.	1.—	9.—	80.—
» **atropurpurea** *Hort.* Blutbirke ♙ . . . . 40—60 cm hoch	2.50	—	—
Rotblättr. Form Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 6—8 cm Umfang	5.—	—	—
der Weissbirke. » » » » 180—200 » 6—8 » »	6.—	—	—
» **fastigiata** *Hort.* . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	4.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang Raschwüchsige, fast säulenförmige Pyramidenform der Weissbirke.	6.—	54.—	—
» **laciniata** *Lond.* . . . . 60—80 cm hoch Form mit schön geschlitzten Blättern.	2.50	—	—
dahurica *Ledeb.* . . . . 150—200 cm hoch Meist kleiner Baum mit mehr oder weniger behaarten Zweigen und grobgezähnten, kleinen B. NO-Asien, Japan, bis 20 m.	2.—	18.—	—
Ermanii *Cham.* . . . . 150—200 cm hoch Stattl. Baum mit weit ausladender Krone u. gelblichbrauner bis weisser, sich ablösender Rinde. B. enorm gross. NO-Asien, Japan, bis 20 m.	2.—	—	—

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Betula (Fortsetzung):			
lenta *L.*, Zuckerbirke (B. carpinifolia *Erh.*) ⊘ . . . . . . 60—80 cm hoch Pyramidaler Strassenbaum mit schwarzer, rissiger, sich nicht ablösender Rinde, Zweige mit hellen, kurzen Längs- und Querstrichen wie bezuckert aussehend. B. auf 10—15 cm langen Stielen, weissbuchenblättrig, Kätzchen sehr lang und zierend, Herbstfärbung gelb. Nordamerika, bis 25 m.	2.—	—	—
lutea *Mchx.*, Gelbbirke ⊘ . . . . 100—120 cm hoch	2.—	—	—
Hochaufstrebender, schmalkroniger 200—250 » »	3.—	—	—
Baum mit gelbbrauner Rinde und Hochstämme, 6—8 cm Umfang stumpfgrünen, eilanzettlichen, weichhaarigen B., Herbstfärbung tiefgelb, Nordamerika, bis 30 m.	3.50	33.—	—
nana *L.*, Zwergbirke △ . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch Zwergstrauch, Triebe behaart, B. rundlich, 0,5—1,5 cm gross, Rand schön gekerbt. Europa, Asien, bis 50 cm. In Kultur höher werdend.	2.—	18.—	—
papyrifera *Marsh.* (B. papyracea *Ait.*) Papierbirke . . 150—200 cm hoch Stattlicher, schlanker Baum, Rinde blendend weiss, leicht ablösend, Äste braunrot, B schön gross. Nordamerika, bis 30 m.	2.—	—	—
pendula Youngi, siehe unter „Trauerbäume".			
Resnyzenkvana . . . . 100—120 cm hoch Baum mit grobkörnig bedrüsten Zweigen und rauhen, spitzdreieckigen B., scharfgesägt.	1.50	—	—
utilis *Don.* . . . . 150—200 cm hoch Baum mit in der Jugend schokoladebrauner, abblätternder, später wundervoll cremeweisser Rinde und gestielten, walzenförmigen Fruchtkätzchen. Himalaya, bis 20 m.	2.—	—	—
Bignonia, siehe Catalpa und auch Tecoma unter „Schlingpflanzen"			
Bridgesia, siehe Ercilla.			
Broussonetia — Papier-Maulbeerbaum — **Moraceae.**			
papyrifera *Vent.* . . . . 50—70 cm hoch Meist baumartiger Strauch mit behaarten Zweigen und feigenblattähnlichen, grauen, behaarten B. An weiblichen Pflanzen auch mehr oder weniger ungelappte B. China, Japan, bis 15 m, V.	1.—	9.—	—
Bruckenthalia — Ährenheide — **Ericaceae.**			
spiculifolia *Rchb.* ◑ △ # . . . . mit Ballen Heideähnlicher Kleinstrauch mit rötlichen Bl. in endständigen, blattlosen, ährenartigen Trauben und kleinen, frischgrünen B. Südosteuropa, 15—25, VI—VII.	—.80	7.—	—
Bryanthus, siehe Phyllodoce.			
Buddleia — Schmetterlings-Busch — **Loganiaceae.** ♄			
albiflora, siehe B. Hemsleyana.			
alternifolia *Maxim.* . . . . Prachtvoller, holziger Zierstrauch, laubabwerfend, mit rutenartig überhängenden Zweigen, B. wechselständig, klein, lanzettlich, unterseits graufilzig, Bl. in zierlichen, lavendelpurpurnen Büscheln an Kurztrieben entlang vorjähriger Triebe. Nordwestchina, 1,5—3 m, VI.	2.—	18.—	—
globosa *Hope* (B. capitata *Jacq.*) /\ . . . . **m. Tb.** Strauch, halbimmergrün, B. schmal, lang, unterseits weisslich-gelblich filzig, oberseits dunkelgrün, Bl. in gelben, endständigen, kugeligen Köpfen. Peru, bis 5 m, VI.	3.—	27.—	—
Hemsleyana *Koehne* (B. **albiflora** *Hemsl.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, Triebe jung dicht weissfilzig, Blütenstände bis 30 cm lang, Einzelblütchen dichtstehend, zart bläulichlila mit gelbem Schlund. China, bis 3 m, VI—VIII.	—.80	7.—	60.—
japonica *Hemsl.* (B. curviflora *Andr.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, locker, B. sattgrün, Bl. in zahlreichen, hängenden Blütenrispen. Fruchtstände dick, zierend. Japan, bis 2 m, VI—IV.	—.80	7.—	60.—
nivea *Duthie* . . . . Strauch, laubabwerfend, ganz weissfilzig, B. später oberseits dunkelgrün, Bl. in dichten, schmalen Blütenständen lebhaft dunkellila. Westchina, bis 3 m, VIII—IX.	1.—	—	—
stenostachya *Rehd. & Wils.* . . . . Strauch ähnlich B. nivea, aber nicht so stark wolligfilzig, B. länglich-lanzettlich, bis 20 cm lang, Bl. in schmalen Ähren, bis 40 cm lang, lila mit Orange. Westchina, bis 2 m, IX—X.	1.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Buddleia (Fortsetzung):			
variabilis *Hemsl.* (B. Davidi *Franch.*) . . . . Strauch oder Halbstrauch, laubabwerfend, B. unterseits grau behaart, Blütenähren lang, bläulich-lila, duftend. Wird stark von Faltern beflogen. Tibet, 2,5 m, VII—IX.	—.80	7.—	60.—
» **Distinction** *Hort. Gibbs* . . . . **Neu!** Form, kräftig wachsend, zierlich überhängend, Blütenähren gross, veilchenblau.	1.—	9.—	80.—
» **magnifica** *Wils.* . . . . Form, B. dunkelgrün, unterseits silberweiss, Blütenähren herrlich tief rosapurpurn. Verlangt Herbstrückschnitt. Blüht etwa 14 Tage später als B. variabilis Veitchiana.	1.—	9.—	—
» **nanhoënsis** *Chittenden* △ ∧ . . . . Form, schön überhängend, Blütenstände sehr zahlreich, lebhaft violett. Kansu, nur bis 1,5 m, VIII—IX.	1.50	13.50	—
» **Veitchiana** *Wils.* . . . . Form, mit 30—40 cm langen, dichten Blütenähren von glänzend cattleyen-malvenlila Farbe mit orangegelbem Auge. Die früheste Form in Bl.	1.—	9.—	80.—
Buxus — Buchsbaum — Buxaceae. ● ♯ #			
balearica *Willd.* △ ∧ . . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch Strauch oder auch baumartig, B. glänzend grün, rundlich, über 1,5 cm breit. Balearen, Spanien. In Kultur sehr langsam wachsend.	3.—	—	—
chinensis *Hort* (Simmondria chinensis *Lk.*) . . . **Echt!** 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, von dichtem Wuchs mit länglich-ovalen, frischgrünen B., fast an Evonymus japonica-Form erinnernd. Kalifornien.	2.50	22.50	—
japonica *Müll.-Arg.* ♯ . . . . 30—40 cm hoch	1.50	12.50	100.—
Strauch, immergrün, lockerwüchsig. Blättchen 40—50 » » stets hellgrün, meist herzförmig eingekerbt. Vorzüglich zu halbhohen, breiten Hecken, von ganz zuverlässiger Winterhärte. Bl. grünlichgelb, ziemlich gross. Japan, bis 2 m, V.	1.75	15.—	120.—
» **aurea** *Hort.* . . . . Büsche 30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
Form, breitblättrig mit gelblichem Laub. » 40—50 » »	2.50	22.50	—
breite Pflanzen 100—125 » »	10.—	—	—
niedrige, feste Kugel 70—80 » breit	10.—	—	—
sempervirens *L.* (B. arborescens *Mill.*) ♯ ⊥ — 15—20 cm breit, 30—40 cm hoch	1.—	8.—	70.—
20—25 » » 40—50 » »	1.20	10.—	90.—
Ungeschnittene Büsche — 25—35 » » 50—60 » »	1.50	12.—	110.—
zur Unterpflanzung — 30—40 » » 60—70 » »	1.75	15.—	140.—
35—45 » » 70—80 » »	2.—	18.—	160.—
Strauch, immergrün, der sich leicht in jeder Form in Schnitt halten lässt, sehr gut zu Hecken und beliebtes Unterholz. Südeuropa, Nordafrika, Westasien, bis 2 m, IV—V. — 40—50 » » 80—90 » »	2.50	22.50	200.—
40—50 » » 90—100 » »	3.—	27.—	240.—
40—50 » » 100—125 » »	4.—	35.—	320.—
Pyramiden 50—60 » »	1.75	15.—	140.—
» 60—70 » »	2.—	18.—	160.—
» 70—80 » »	2.50	22.50	200.—
» 80—90 » »	3.—	27.—	240.—
» 90—100 » »	4.—	35.—	320.—
» 100—125 » »	5.—	45.—	400.—
breite » 125—150 » »	8.—	72.—	—
» » 150—175 » »	10.—	—	—
» » 175—200 » »	12.—	—	—
niedrige, feste Kugel 30—35 » breit	2.50	22.50	200.—
» » » 35—40 » »	3.—	27.—	240.—
» » » 40—50 » »	3.50	31.50	280.—
» » » 50—60 » »	4.—	36.—	300.—
» » » 60—70 » »	5.—	45.—	400.—
» » » 70—80 » »	5.50	50.—	450.—
» » » 80—90 » »	6.50	60.—	—
ca. 20—35 cm breit: niedrige, vierkantig geschnittene 70—80 cm hoch	2.50	22.50	200.—
» » » 80—90 » »	3.—	27.—	240.—
» » » 90—100 » »	4.—	35.—	320.—
» » » 100—125 » »	5.—	45.—	400.—
Kronenbäumchen: Stammhöhe 35—50 cm, Kronendurchmesser 60—70 cm . . .	6.—	—	—
sempervirens angustifolia *Loud.* . . . . 40—50 cm hoch	1.75	15.—	120.—
50—60 » » Form, mit länglich-lanzettlichen B. von dunkelgrüner Färbung.	2.—	18.—	160.—
» **argenteo-variegata** *Hort.* . . . . 40—50 cm hoch Form, mit weissbunten B.	2.50	—	—
» **glauca** *Hort.* . . . . 50—60 cm hoch Form, mit eiförmig rundlichen, blaugrünen B.	2.—	—	—

Mit festen Ballen!

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Buxus (Fortsetzung):			
sempervirens Handsworthii *K. Koch* . . . . 50—60 cm hoch	2.—	18.—	160.—
60—70 » »	2.50	22.50	200.—
Form, mit aufgeblasenen, breiten, runden, ziemlich grossen, saftigrünen B.			
» **Handsworthii aureo-variegata** *Hort.* . . . . . . 60—70 cm hoch Gelbbuntblättrige Spielart der breitblättrigen Form.	2.50	—	—

Callicarpa — Schönfrucht, Wirbelbeere — Verbenaceae.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
americana *L.* ♣ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, Triebe und Blattunterseiten filzig, B. 7—14 cm gross, Bl. fast sitzend, blaupurpurn, achselständig, Fr. violett. Amerika, bis 2 m, V—VII.	1.50	13.50	—
(N) **Giraldiana** *Hesse* (C. longifolia *Lam.*) ♣ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. schön breit-elliptisch, Bl. rosalila in zahlreichen, vielblütigen, achselständigen Trugdolden, Fr. sehr zahlreich, violette Perlen, 2—4 mm gross. China, bis 2 m, VII—VIII.	1.50	13.50	—
japonica *Thbg.* Japanische Schönfrucht ♣ . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, starkwachsend, B. bis 12 cm lang, Bl. blasslila bis weisslich, Fr. violett. Japan, bis 2 m, VII—VIII.	1.20	11.—	100.—

Calluna — Besenheide — Ericaceae. △ #

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
vulgaris *Hull.* Besenheide . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, mit kleinen schuppigen Blättchen, Bl. rosenrot in bis 20 cm langen Blütenähren. Europa, 20—40, VII—VIII.	—.60	5.—	—
» **alba** *Don.* . . . . mit Ballen Form der gewöhnlichen Besenheide mit weissen Bl.	—.60	5.—	40.—
» » **erecta** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit straff aufwärtsgerichteten Blütentrieben, Bl. reinweiss.	—.60	5.—	40.—
» » **Hammondi** *Hort.* . . . . mit Ballen Form von straffem Wuchs und späten, weissen Blütenrispen.	—.60	5.—	—
» » **Searlei** *Hort.* (C. vulg. Searlei *Bean.*) . . . . mit Ballen Form von höherem Wuchs als die Art, straffer, Bl. weiss, spätblühend.	—.60	5.—	40.—
» **Alporti** *Kirchn.* . . . . mit Ballen Form von aufrechtem Wuchs und späten, leuchtend dunkelroten Blütenrispen.	—.70	6.—	55.—
» **argentea** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit fast silbergrauem Laub, Bl. lila, Wuchs dicht.	—.60	5.—	40.—
» **aurea** *Forbes.* ○ . . . . mit Ballen Form mit goldgelber Belaubung für sonnige Lagen, Bl. hell lilarosa, sehr lebhaft. Goldbraune Winterfärbung.	—.60	5.—	45.—
» **cuprea** *Bean.* . . . . mit Ballen Form mit kupfrigroter Belaubung, Wuchs gedrungen, Bl. lilarosa.	—.60	5.—	45.—
» **diffusa** *Hort.* . . . . mit Ballen Form von niedergestrecktem Wuchs, Zweige aber auffallend wirr durcheinander. Bl. lilarosa.	—.70	6.—	—
» **Foxii** *Bean.* (C. vulg. Foxii nana *Hort.*) . . . . mit Ballen	1.—	9.—	80.—
starke Pflanzen, 15—20 cm Durchmesser » » Form von ganz niedrigem, kissenartigem Wuchs, sehr schön dunkelgrün, Bl. zierlich lilarosa.	1.50	13.50	—
» **gracilis** *Kirchn.* . . . . mit Ballen Form mit sehr zierlicher Belaubung und Zweigbildung. Bl. lilarosa.	—.80	7.—	—
(N) » » **major** *Hesse* . . . . mit Ballen Unterform mit gröberer und lockerer Belaubung als C. vulg. gracilis, jedoch gut unterschiedlich von der Stammart. Bl. lilarosa	—.80	7.—	—
» **nana** *Kirchn.* (C. vulg. pygmaea *Hort.*, C. vulg. minima *Hort.*) mit Ballen Form von niedrigem, breitgehendem Wuchs, Bl. schön rosa purpurn.	—.60	5.—	45.—
» » **alba** *Hort.* . . . . mit Ballen Unterform mit weissen Bl. und noch platterem Wuchs. Struktur bedeutend gröber als C. vulg. nana.	—.70	6.—	55.—
» **pilosa** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit behaarten Trieben und reinweissen Bl.	—.60	5.—	—
» **plena** *Rgl.* (C. vulg. multiplex. *Sweet.*) . . . . mit Ballen Form mit langen, graugrünen Trieben, Bl. dicht an den Trieben entlang sitzend, dichtgefüllte lilarosa Röschen bildend.	—.70	6.—	55.—
» » **H. E. Beale** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit besonders langen Blütentrieben, die bis in die Spitze mit den dichtgefüllten, rosaroten Bl. besetzt sind. Spätblühend.	—.80	7.—	60.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Calluna (Fortsetzung):			
vulgaris prostrata atrorosea *Hesse* . . . . mit Ballen Unterform der niedergestreckten Besenheide mit mehr rosafarbenen Bl.	—.80	—	—
» **prostata flagelliformis** *Hesse* . . . . mit Ballen Unterform der niedergestreckten Besenheide mit besonders lang peitschenförmiger Verzweigung, die sich im Steingarten sehr schön ausnimmt. Bl. lilarosa.	—.80	7.—	—
» » **Kuphaldti** *Hesse* . . . . mit Ballen Unterform der niedergestreckten Besenheide, die sich dicht kissenartig geschlossen und ineinandergedreht dem Boden anschmiegt. Belaubung graugrün, Bl. rosapurpurn.	—.80	7.—	—
» **tenuis** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit lebhaft grüner Belaubung, kurztriebig, Bl. dunkelpurpurn frühblühend, das ganze Jahr über sehr zierend.	—.60	5.—	45.—

Calluna, in schönsten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 45.—

Calycanthus — Kelchblume — Calycanthaceae.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
floridus *L.* Erdbeerstrauch, Gewürzstrauch . . . . Strauch, laubabwerfend, dicht belaubt, Bl. einzeln, dunkelbraunrot, von herbem, erdbeerartigem Duft. Nordamerika, bis 2 m, VI—VII.	1.50	13.50	120.—
glaucus *W.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. unterseits bläulichgrün, Bl. grösser und heller als die von C. floridus, aber nicht so stark duftend. Nordamerika, bis 2 m, VI—VII.	1.50	12.—	—
occidentalis *H. & A.* . . . . Strauch, laubabwerfend, Bl. doppelt so gross als die der übrigen Arten, lebhaft ziegelrot, duftlos. Kalifornien, bis 3 m, VI—VII.	1.50	—	—
praecox, siehe Meratia.			

Campsis, siehe Tecoma unter „Schlingpflanzen".

Caprifolium, siehe unter „Schlingpflanzen".

Caragana — Erbsenstrauch — Leguminosae.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
ambigua *Stocks.* . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, starkwachsend mit langen, gebogenen Zweigen, Austrieb weisslich behaart. Süd-Afghanistan. — Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
arborescens *Lam.* Baumartiger Erbsenstrauch . . . . Sträucher Strauch, laubabwerfend, B. paarig gefiedert, Bl. gelb, zu 1—4. Sehr anspruchslos. Mandschurei, bis 6 m, V—VI.	—.60	5.—	40.—
» **albescens** *Bois* . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Form, deren Blättchen beim Austrieb weisslichgelb, später normal grün sind. — Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
» **Lorbergii** *Koehne* . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
» » » » 180—200 » 8—10 cm Umfang Form mit auffallend feinen, schmalen Blättchen und zierlich wirkenden, schmalen, gelben Bl.	2.50	—	—
» **nana** *Hort. Spaeth.* . . . . Form von niedrigem, kugelförmigem Wuchs.	—.80	—	—
argentea, siehe Halimodendron.			
aurantiaca *Koehne.* . . . . Strauch von aufrechtem Wuchs, Bl. tief orangegelb. Altai, bis 1 m, V—VI.	—.80	—	—
Boisi *Schneid.* . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, mit überhängenden Zweigen und locker gestellten, verkehrteiförmigen, unterseits graugrünen, derben Fiederblättchen. Bl. einzeln, gelb. China, bis 2,5 m, VI. — Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
brevispina *Royle.* Kurzdorniger Erbsenstrauch . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, mit seidig behaarten jungen Trieben, Stacheln scharfspitzig, flach am Grunde der Blattstiele, Blüten zu mehreren gehäuft, auf bis 3 cm langen Stielen. Nordwesthimalaja, bis 2,5 m, V—VI. — Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
decorticans *Hemsl.* . . . . Sträucher Strauch, laubabwerfend, dünntriebig, kleinblättrig, scharfspitzig bestachelt, matt sattgrün. Bl. klein, grünlich. Afghanistan, auch baumartig, VI.	—.80	7.—	—
frutesceus *de Cand.* (C. frutex *K. Koch*). Kleiner Erbsenstrauch. Sträucher	—.80	—	—
Strauch mit frühem, schön goldgelbem Austrieb und lebhaft gelben Bl. Sibirien, bis 3 m, V. — Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—

Caragana (Fortsetzung):

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
glomerata *Hort.* (C. microphylla *Lam.*, C. Altagana *Poir.*) . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, ziemlich ausladend, junge Triebe seidig behaart, Blättchen 12—18, graugrün, zierlich, Bl. gelb, zu 1—2. Altai. Mandschurei, 1—2,5 m, V—VI. — Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
Maximowicziana *Komar.* . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang — Strauch, laubabwerfend, dichtzweigig, lebhaft grün, Bl. gelb, auffallend lang. Westchina, bis 1 m, V—VI.	2.50	22.50	—
microphylla *Kam.* . . . . Strauch, breitwüchsig, junge Triebe seidig behaart, Blättchen 12—18, zierlich, 3—8 mm gross, feinseidig behaart, Bl. gelb, zu 1—2. Sibirien, Altai, bis 2,5 m, V.	—.80	7.—	—
Redowskii *Fisch.* (C. cuneifolia *Dipp.*) . . . . Sträucher	—.80	7.—	—
Strauch, ähnlich C. arborescens, aber niedriger bleibend, Blättchen kleiner, Bl. langgestielt, tiefgelb. Amurland, bis 2 m, V. — Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—

Carpinus — Weissbuche, Hornbaum — Betulaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
americana *Mich.* (C. caroliniana *Walt*) Ø . . . . 80—100 cm hoch — Kleiner Baum mit zierlicher Bezweigung und schöner Herbstfärbung, orangescharlach. Nordamerika, bis 10 m.	2.—	—	—
betulus *L.* ● Ø . . Verpflanzte, buschige Ware 100—125 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Weiss- oder Hainbuche zu Hecken! » » » 125—150 » »	1.75	16.—	150.—
» » » 250—300 » »	3.50	31.50	—
» » » 300—350 » »	4.—	36.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
» 10—12 » »	3.—	27.50	—
» 12—14 » »	3.60	33.—	300.—
» 14—16 » »	4.—	36.—	—
» 16—18 » »	5.—	—	—
Baum, laubabwerfend, mit pyramidaler Kronenbildung, schönem Laub und zierend geflügelten, grünen Fruchtkätzchen. Viel zu hohen u. schmalen Hecken und Laubengängen benutzt. Herbstfärbung gelb. Gutes Nutzholz für Drechsler. Auch für trockene Standorte. Europa, bis 20 m, IV—V.			
• **columnaris** *Späth.* . . . . 80—100 cm hoch	2.—	—	—
Form von pyramidalem Wuchs. 120—150 » »	2.50	—	—
• **pyramidalis erecta nova** *Hort. Hesse* Pyramiden 200—250 » »	3.—	27.—	250.—
» 350—400 » »	8.—	—	—
» 400—450 » »	10.—	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.50	—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	4.50	40.—	—
» » » » 180—200 » 12—14 » »	5.—	45.—	—
» » » » 180—200 » 14—16 » »	6.—	54.—	—
Form, breitpyramidal, von straff aufrechtem Wuchs, B. auffallend länglich, frischgrün.			
japonica *Bl.* . . . . 50—70 cm hoch — Baum, laubabwerfend, Zweige jung behaart, Knospen klein, B. im Austrieb rötlich, spitz eilanzettlich, bis 10 cm lang, 4 cm breit, scharf doppelt gesägt, mit 20—24 Nervenpaaren. Japan, bis 9 m.	1.50	13.50	—
yedoënsis *Max.* (C. Tschonoskii *Maxim.*) . Pyramiden 120—150 cm hoch — Baum, laubabwerfend, dichtbuschig, mit überhängenden Zweigchen und silberglänz. behaarten Triebspitzen. Nordchina, Japan, bis 15 m, IV—V.	2.50	—	—

Carya — Hickorynuss — Juglandaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
amara *Nutt.* (C. cordiformis *K. Koch.*) Sumpf-Bitternuss 60—80 cm hoch — Baum, schwerholzig, B. bis 40 cm lang, Bl. in bis 15 cm langen Kätzchen, Fr. rund, nur bis 2 cm gross, bitter. Amerika, bis 30 m, V.	2.50	—	—
olivaeformis *Nutt.* (C. pecan *Engl. & Graebn.*) Pekannuss 60—80 cm hoch — Baum, als Fruchtbaum angepflanzt, B. bis 50 cm lang, Fr. olivenartig, wohlschmeckend. Amerika, bis 50 cm.	2.50	—	—

Caryopteris — Bartblume — Verbenaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Mastacanthus *Schau.* (C. incana *Miq.*) ○ △ ∧ . . . . **m. Tb.** — Strauch oder Halbstrauch, Zweige und B. silbergrau, stark aromatisch, Bl. hellviolettblau, quirlständig. China, Japan, bis 2,5 m, IX—X.	2.—	—	—

Cassia — Sennastrauch — Papilionaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
marylandica *L.* ○ □ . . . . — Halbstrauch, B. schön gefiedert, sattgrün, Bl. goldgelb. Nordostamerika, 100, VII—VIII.	2.—	18.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cassinia — Compositae.			
fulvida *Hook. fil.* (Diplopappus chrysophyllus *Koehne*) ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, heideartig, Zweige und Blattunterseiten goldbraunfilzig, B. linael, oberseits sattgrün, klebrig, Rand umgerollt, Blütenköpfchen klein, weiss in Doldentrauben. Neuseeland, 120, VII.	1.20	11.—	—
Vauvilliersii *Hook. fil.* ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. unterseits silbrig, im ganzen graugrün aussehend, sonst wie C. fulvida.	1.20	11.—	—
Castanea — Edel-Kastanie — Fagaceae.			
dentata *Borkh.* (C. americana *Raf.*) ⊘ + ... 100—120 cm hoch Baum, laubabwerfend, mit schön gesägten, großen B. und etwas kleineren essbaren Fr. als C. vesca. Herbstfärb. gelb. Nordamerika, bis 30 m, VI—VII.	3.—	—	—
pumila *Mill.* + ... 60—80 cm hoch Strauch, selten baumartig, laubabwerfend, Zweige rotbraun, B. hellgrün, unterseits weiss, Bl. besonders schön weiss, Fr. klein, länglich, wohlschmeckend. Nordamerika, bis 5 m, VI—VII. Ausläufer!	2.—	18.—	—
vesca *Gaertn.* (C. sativa *Mill.*) + ... Büsche 60—80 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Edel- oder Esskastanie — Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
Siehe auch unter „Obstsortiment" — » 10—12 » »	4.—	36.—	320.—
Baum, laubabwerfend, von bekannt — » 12—14 » » schöner Belaubung, zur Blütezeit und mit dem reichen Behang der essbaren Fr. in stark bestachelter Hülle sehr zierend. Südeuropa, Asien, bis 30 m, VI—VII. Wildverbiss-sicher!	5.—	45.—	—
» **albo-marginata** *Hort.* . . . . Büsche 100—120 cm hoch Form mit schön weiss gerandeten B.	2.50	—	—
» **heterophylla dissecta** *Hort.* . . . . . . » 60—80 » » Form mit teils fadenförmigen, teils unregelmäßig gebuchteten und zerschlitzten B.	2.—	—	—
Castanopsis — Scheinkastanie — Fagaceae.			
chrysophylla *de Cand.* ◑ ♯ ∧ . . . . . . mit Ballen 20—30 cm hoch Strauch, bis baumartig, immergrün, B. lederartig, 6 cm lang, 2 cm breit, unterseits goldgelb schuppig, Trieb goldgelb. Bl. wie Castanea vesca, Fr. ebenso, nur beides kleiner. Amerika, bis 35 m, VII—IX.	7.50	—	—
Catalpa — Trompetenbaum — Bignoniaceae.			
bignonioides *Walt.* (C. syringaefolia *Sims.*, C. cordifolia *Much.*) . . . . 70—100 cm hoch Baum, laubabwerfend, B. bis 30 cm Durchm., zu dreien, Bl. weiss, an den aufgelockerten Blütenstand einer Rosskastanie erinnernd. Fr. lange, schmalrunde Kapseln. Nordamerika, bis 10 m, VI—VII.	1.50	—	—
» **aurea** *Lav.* . . . . 30—50 cm hoch Form mit gelben B.	3.—	27.—	—
⊛ » **Koehnei** *Hesse* . . . . 30—40 cm hoch Form mit goldgelben B. mit einem schönen, grossen, dunkelgrünen Fleck vom Blattstiel bis zur Mitte des Blattes.	3.—	—	—
Duclouxii *Dode* . . . . 50—70 cm hoch Baum, laubabwerfend, B. oval, Bl. rosa mit Purpur und Orange gezeichnet, Fruchtkapseln bis 60 cm lang. China, 8—16 m, VII.	3.—	—	—
Kaempferi atropurpurea *Hort.* (C. ovata purpurea *Bean.*) 60—80 cm hoch Baum, laubabwerfend, B. gross, dunkelrot, besonders im Austrieb schwarzrot, Bl. gelblichweiss. Japan, bis 10 m, VIII.	3.—	27.—	—
speciosa *Ward* . . . . 60—80 cm hoch Baum mit grossen B., Bl. in grossen Rispen, weiss mit gelb. Amerika, bis 30 m, VI.	1.50	—	—
Ceanothus — Säckelblume — Rhamnaceae. ○			
americanus *L.* Amerikanische Säckelblume . . . . Strauch, laubabwerfend, B. fein gesägt, Bl. weiss in grossen, vielblütigen, end- und achselständigen, federigen Rispen. Nordamerika, bis 100, VI—IX.	—.80	7.—	60.—
Burkwoodii *Hort.* (C. floribundus × hybr. Indigo) ♯ . **Neu!** mit Ballen Strauch, immergrün, reichblühend mit langen, himmelblauen Blütenständen. Hybride, bis 1,5 m, VIII—Frost.	3.—	—	—
hybridus azureus grandiflorus *Hort.*, ∧ . . . . **m. Tb.** Hybride, grossblumig blassblau, bis 100, VII—IX.	2.—	18.—	—
» **Gloire de Versailles,** ∧ . . . . **m. Tb.**	2.—	18.—	—
Kronenbäumchen 60—80 cm Stammhöhe **m. Tb.** Hybride, dunkelazurblau, von bester Schmuckwirk., bis 100, VII—IX.	3.—	—	—
» **Indigo** ∧ . . . . Hybride, tief dunkelblau, bis 100, VII—IX.	3.—	—	—
» **Marie Simon,** ∧ . . . . **m. Tb.** Hybride, fleischfarbenrosa, bis 100, VII—IX.	2.—	18.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Celastrus, siehe unter „Schlingpflanzen“.			
Celtis — Zürgel — Ulmaceae.			
australis *L.* + ... Sträucher 50—70 cm hoch Baum mit breiter Krone, B. elliptisch, geschwänzt, scharf gesägt, oberseits dunkelgrün, unterseits graugrün, Fr. gut erbsengross, anfangs gelblichweiss, violettbraun, schmackhaft. Südeuropa, Westasien, bis 25 m, IV.	2.—	18.—	—
caucasica suberosa *Willd.* . . . . Sträucher 80—100 cm hoch Baum, laubabwerfend, mit ulmenartigen, kleinen B., weniger gezähnt als die von C. australis, Fr. rotbraun. Kaukasus, bis 20 m, IV.	2.—	—	—
occidentalis *L.* . . . . Sträucher 100—120 cm hoch Baum, laubabwerfend, mit etwas hängenden, weiss punktierten Ästen, B. bis 15 cm lang, Fr. anfangs rotorange, später tiefpurpurn. Nordamerika, bis 35 m, IV.	2.—	—	—
Cerasus, siehe Prunus.			
Ceratostigma, siehe unter „Stauden“.			
Cercidiphyllum — Judasbaumblatt — Trochodendraceae.			
japonicum *Sieb. & Zucc.* ⊘ . . . . Sträucher 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Baum, laubabwerfend, von schlankem, lichtem, » 200—250 » »	1.50	13.50	120.—
pyramidalem Bau. B. hautartig, im Aus- Hochstämme 8—10 » »	3.—	27.—	—
trieb braunrot, rund oder rundoval bis 6 cm » 10—12 » » Durchmesser, auf 2 cm langen, roten Blattstielen. Bl. unscheinbar, rötlich. Herbstfärbung goldgelb mit Rot. Japan, bis 35 m, IV.	4.—	36.—	—
Cercis — Judasbaum — Leguminosae.			
canadensis *L* . . . . 30—40 cm hoch Baum, breitkronig, B. langgestielt, nierenförmig, ganzrandig, Bl. hellpurpurn, vor den B., in Büscheln zu 3—5. Kanada, bis 15 m, IV—V.	2.50	—	—
Siliquastrum *L.* Gemeiner Judasbaum . . . . 30—40 cm hoch Kleiner Baum, laubabwerfend, B. rundlich, Bl. purpurrosa in Büscheln oder Trauben am alten Holz mit oder vor Ausbruch der B., Fr. schotenartig flach. Südeuropa, Orient, bis 5 m, IV—V.	2.50	—	—
Chaenomeles, siehe Cydonia.			
Chamaecerasus, siehe Lonicera.			
Chamaedaphne, siehe Lyonia.			
Chimonanthus, siehe Meratia.			
Chionanthus — Schneeblume, Schneeflockenbaum — Oleaceae.			
retusa *Ld. & Paxt.* . . . . **m. Tb.** Strauch, gedrungen wachsend, B. tiefgrün, mässig gross, Bl. rahmweiss in dichten Blütenständen. China, bis 6 m, VII—VIII.	6.—	—	—
virginica *L.* . . . . Strauch oder kleiner Baum, laubabwerfend, B. gross, glänzendgrün, breitlanzettlich, lederartig. Bl. in schönen, weissen, lockeren Rispen, mit langen, schmalen Blütenblättern. NO.-Amerika, 2—10 m, V—VI.	2.—	18.—	160.—
Choisya — Orangenblume — Rutaceae.			
ternata *Kunth* (Ch. grandiflora *Reg.*) ♯ ∧ . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, B. dreizählig, frischgrün, Bl. weiss, nach Orangen duftend und auch an diese Bl. erinnernd. Mexiko, bis 100, IV—V.	1.50	13.50	—
Cistus — Cistrose — Cistaceae.			
crispus *L.* ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, dichtbuschig, Austrieb stark grauwollig, B. schön graugrün, Bl. purpurrot. Mittelmeergebiet, 60, VI—VII.	1.50	—	—
cyprius *Lam.* (C. laurifolius × ladaniferus) ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** Hybride mit an C. laurifolius erinnernden B. und weissen Bl. mit rotem Fleck. Bis 2,5 m, VI—VII.	1.50	13.50	—
formosus *Curt.* (Helianthemum formosum *Dun.*) ♯ ∧ . . . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. klein, behaart, Bl. gelb mit schwarzrotem Fleck am Grunde. Portugal, bis 1 m, V—VI.	1.50	—	—
ladaniferus *L.* ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. glänzend, schmallanzettlich, unterseits graugrün, Bl. einzeln, weiss mit breitem, rotem Fleck im Grunde. Westl. Mittelmeergebiet, bis 1,5 m, VI—VII.	1.50	13.50	—
laurifolius *L.* ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. lorbeerartig, oval, oben dunkelgrün, unterseits graugrün, Bl. weiss mit gelbem Fleck. Mittelmeergebiet, bis 2,5 m, VI—VIII.	1.50	13.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cistus (Fortsetzung):			
salvifolius *L.* ‡ Λ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, mit an C. tauricus erinnernden B., aber kleiner, Bl. weiss mit gelbem Grund. Mittelmeergebiet, 60 cm, V—VI.	1.50	—	—
tauricus *Presl.* (C. villosus tauricus *Gross.*) ‡ Λ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, dichtbuschig, B. im Austrieb graufilzig, später graugrün, runzlich, Bl. purpurrosa. Östl. Mittelmeergebiet, bis 1 m, VI—VII.	1.50	13.50	—
Cladrastis — Gelbholz — Leguminosae.			
amurensis *Rupr.* (Maackia) . . . . 60—80 cm hoch Baum, mit pyramidaler Krone, B. gefiedert, Bl. grünlichweiss in aufrechten, lockeren Blütenständen. Mandschurei, Japan, bis 15 m, VI—VII.	1.50	—	—
» **Buergeri** *Max.* (Maackia) . . . . 60—80 cm hoch Form des Gelbholzes mit besonders dicht walzenförmigen, aufrechten, grünlichweissen, vielblütigen Blütenständen. Schon als 1,5 m hoher Strauch in Blüte. Japan, 8—10 m, VI—VIII.	1.50	13.50	—
Clematis, siehe unter „Schlingpflanzen" und „Stauden".			
Clethra — Scheineller — Clethraceae.			
acuminata *Mchx.* . . . . mit Ballen, 80—120 cm hoch	1.20	—	—
» » 175—200 » »	1.50	13.50	—
Strauch, laubabwerfend, B. dunkelgrün, Bl. weiss in 10—20 cm langen, aufrechten, rispenähnlichen Trauben auf schlanken Stielen. Amerika, 2—5 m, VII—IX.			
alnifolia *L.* ● ⚘ ⊘ . . . . mit Ballen, 100—150 cm hoch Strauch, laubabwerfend, B. elliptisch, frischgrün, Bl. weiss, in 5—15 cm langen, aufrechten Traubenrispen, weithin stark duftend. Nordamerika, bis 3 m, VII—IX.	1.20	11.—	—
» **rosea** *Rehd.* . . . . mit Ballen, 40—60 cm hoch Form mit rosa getönten Blütenknospen und Bl.	1.20	11.—	—
» **tomentosa** *Mchx.* . . . . mit Ballen, 125—150 cm hoch Form mit starkem Filzüberzug auf den B., Blütenstände grösser, reinweiss und später als die Art. VIII—IX.	1.20	11.—	—
barbinervis *Sieb. & Zucc.* (C. canescens *Auct.*) . . mit Ballen, 60—80 cm hoch Strauch oder Baum, laubabwerfend, mit abstehenden Zweigen, B. verkehrteiförmig, Bl. in grossen, weissen Trauben. Japan, bis 5 m, VII—IX.	2.—	—	—
Fargesi *Franch.* . . . . 70—100 cm hoch Strauch, ähnlich Cl. barbinervis, B. kahler, Bl. weiss in bis 18 cm langen Blütenständen, Staubfäden behaart. China, bis 4 m, VII.	1.—	9.—	—
Cocculus, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Colutea — Blasenstrauch — Leguminosae.			
arborescens *L.* (C. aurantiaca *Hort.*) ☘ ⚘ . . . . Strauch, laubabwerfend, B. lichtgrün, feingefiedert, Bl. goldgelb, bisweilen orangegetönt, Fr. grünlich, blasenartige Taschen. Südeuropa, bis 4 m, V—VIII.	—.60	5.—	45.—
» **crispa** *Kirch.* . . . . Form mit wellig gekrausten B., bedeutend niedriger bleibend.	—.80	7.—	—
aurantiaca, siehe C. arborescens.			
gracilis *Freyn. & Sint.* . . . . Strauch, laubabwerfend, zierlich belaubt, Bl. fast reingelb. Transkaspien, bis 2 m, VII.	1.—	9.—	—
longialata *Koehne* (C. cilicica *Boiss.* C. melanocalyx *Hort.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, B. schön blaugrün, fiedrig, Bl. gelb, Kleinasien, bis 3 m, VI—VII.	—.80	7.—	—
media *Willd.* (C. arborescens × orientalis), Bastard-Blasenstrauch ☘ . . . Hybride ähnlich C. arborescens, B. unterseits blaugrün, Bl. rotbraun bis orangefarben, auch Fruchttasche leicht gerötet. V—VIII.	—.80	7.—	60.—
orientalis *Mill.* (C. cruenta *Ait.*) Rotblühender Blasenstrauch . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. beiderseits blaugrün, derber als die von C. arborescens, Bl. rötlichbraun, Fruchttaschen rötlichviolett gefärbt. Kaukasus bis Turkestan, bis 2 m, VI—IX.	1.—	9.—	—
persica Buhsei *Boiss.* . . . . Strauch, laubabwerfend, kräftig wachsend, Bl. orangerotbraun. Persien, bis 1,5 m, VII.	1.50	—	—
Coprosma, siehe unter „Stauden".			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Coriaria — Gerberstrauch — Coriariaceae.			
japonica *Gray*, ♄ ∞ ⊥ ♣ . . . . . . Halbstrauch, von ausgebreitet überhängendem Wuchs, B. dicht gegenständig, eilanzettlich, mit leicht gewelltem Rand, Bl. achselständig, rötlichgrün, wenig auffallend, Fr. kugelig, anfangs lebhaft rot, später schwarzviolett. Japan, bis 1 m, V—VI.	1.50	13.50	—
terminalis xanthocarpa *Rehd. & Wils.*, ♄ ∞ ⊥ ♣ . . . . . . Halbstrauch, B. breitelanzettlich, Bl. in endständigen Trauben, Fr. erbsengross, orangefarben, die Zweige schwer überbiegend von Juli—November. Sikkim, bis 1 m, V.	1.50	13.50	—
Corchorus, siehe Kerria.			
Cornus — Hartriegel — Cornaceae.			
alba *Wangh.* (C. stolonifera *Mchx.*) ♣ ⌀ . . . . . . Strauch, laubabwerfend, Holz rotbraun, B. dunkelgrün, unterseits blaugrün, Blütendolden endständig, weiss, Fr. blauweiss. Ostnordamerika, bis 2,5 m, V—VII.	—.60	5.—	45.—
» **albo-marginata elegans** *Hort.* (C. sanguinea albo-marginata) . . . Form mit schön weissbunten B.	—.80	7.—	60.—
» **argenteo-marginata** *Hort.* ⌀ . . . . . . Form mit regelmässig breitem, weissem Blattrand, von üppigem Wuchs und schön karminroter Herbstfärbung.	—.80	7.—	60.—
» **coloradensis** *Koehne* (C. stolonifera coloradensis *C. S.*) . . . . . . Form mit überhängendem Wuchs, Zweige bräunlich, B. schmäler als die der Art.	—.60	5.—	—
» **flaviramea** *Späth* (C. stolonifera flaviramea *Rehd.*) . . . . . . Form, deren Holz im Winter vollkommen gelb wird. Breitwüchsig, wurzelnd.	—.80	7.—	60.—
» **Gouchaulti** *Hort.* . . . . . . Form von besonders kräftigem Wuchs und schön gelbbunten B.	—.80	7.—	60.—
» **Spaethi** *Wittm.* . . . . . . Form mit bronzefarbenem Austrieb, B. später goldgelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb. Wuchs niedrig.	—.80	7.—	—
alternifolia *L.* ⌀ . . . . . . Baum oder Strauch, laubabwerfend, Äste glänz. purpurbraun, B. wechselständig, Bl. weiss, Fr. trübblau. Herbstfärbung schön gelb oder gelb mit Scharlachrot. ON.-Amerika, bis 8 m, V—VI.	—.60	5.—	—
Amomum *Mill.* (C. sericea *L.*), Seiden-Hartriegel ⌀ . . . . . . Strauch, laubabwerfend, junge Triebe purpurn, B. unterseits grünlich, silbrig und rostbraunseidig, Blütenstände flach halbkugelig, gelblichweiss, Fr. hellblau, Herbstfärbung mattpurpurn, bisweilen mit Gelb. ON-Amerika, 2 m, VI.	—.60	5.—	45.—
Arnoldiana *Rehd.* (C. obliqua × racemosa) . . . . . . Hybride von rundlichem Wuchs, B. oberseits dunkelgrün, unterseits weisslich, Bl. und Fr. spärlich, letztere bläulichweiss. 2—3 m, VII.	—.60	5.—	—
australis *C. A. Mey.* (C. sanguinea australis *Koehne*), ⌀ . . . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs kräftig, Triebe rotbraun, jung leicht grau behaart, B. rundlich-oval, dunkelgrün, Herbstfärbung tief violett-braun. Westasien, 4 m, VII.	—.60	5.—	—
Baileyi *Coult. & Ev.*, ♣ ⌀ . . . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs aufrecht, B. unterseits weisslich wollig behaart, oberseits graugrün, Bl. rahmweiss, Fr. auffallend porzellanblau, Herbstfärbung schön hell rotbraun. Nordamerika, 2—3 m, VII—IX.	—.60	5.—	45.—
brachypoda *C. A. Mey.* (C. macrophylla *Wall.*) . . . . . . Baum, laubabwerfend, B. gegenständig, Bl. zahlreich, rahmweiss in lockeren Scheindolden, Fr. blauschwarz. Himalaja, China, Japan, bis 15 m, VII—VIII.	—.80	7.—	—
Bretschneideri *Henry* . . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. gross, frischgrün, Bl. gelblich-weiss, Fr. blauschwarz. Nordchina, bis 4 m, VI.	—.80	7.—	—
canadensis, siehe unter „Stauden".			
controversa *Hemsl.* (C. macrophylla *Koehne*), ≌ . . . . . . Baum, mit schirmartiger Krone, B. elliptisch, 16×8 cm gross, oberseits grün, unterseits bläulich, wechselständig, Bl. weiss in flachen Doldenrispen. Japan, China, bis 20 m, V—VI.	—.80	—	—
femina *Mill.* (C. stricta *Lam.*) . . . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige braungelb bis rötlich, B. auffallend schön fein ovallanzettlich, hellgrün, Bl. weiss, lange anhaltend, Fr. hellblau. Nordamerika, bis 5 m, V—VII.	—.80	7.—	60.—

Cornus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
florida *L.*, Blumenhartriegel, ⊘ . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. gross, sattgrün, unterseits weisslich, Bl. mit weissen, an der Spitze eingekerbten Blütenhüllen, Fr. scharlachrot, Herbstfärbung prächtig scharlachrot und violett. Nordamerika, bis 5 m, V.	2.50	22.50	—
» **rubra** *André*, ... mit Ballen Form des Blumenhartriegels mit rosa oder roten Blütenhüllen. Herbstfärbung ebenfalls scharlach mit Violett.	2.50	22.50	—
glabrata *Benth.* . . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige schlank, überhängend, B. schmal, hellgrün, Bl. weiss, Fr. bläulich. Kalifornien, bis 3 m, VI.	—.60	5.—	—
® **Hessei** *Koehne* △ . . . . . Strauch, niederliegend, kurztriebig, B. unterseits blaugrün, dicht, oberseits fast schwarzgrün, Bl. rahmweiss, in 2—5 cm breiten Dolden. Hybride, 30—50, VI—IX.	2.—	18.—	—
Kesselringi *E. Wolf* (C. alba Kesselringi *Rehd.*), ⊘ . . . . . Form mit fast schwarzroten Zweigen, B. im Austrieb dunkelrot, Herbstfärbung metallischbraun bis purpurviolett. Winterzierde!	—.80	7.—	60.—
Koehneana *Wang.* ♣ . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. sattgrün, Blütenstand gedrungen, Fr. schwarz. China, 3 m, VI.	—.60	5.—	—
Kousa *Bürg.* (Benthamia japonica *Sieb. & Zucc.*), ⊘ . . . . . Baumartiger Strauch, laubabwerfend, B. oberseits dunkelgrün, unterseits weissgrau, Bl. mit grossen, rahmweissen Brakteen mit lang ausgezogener Spitze, Fr. kugelig, fleischig, scharlachrot. Herbstfärbung scharlach. Japan, bis 5 m, VI.	2.50	22.50	—
mas *L.* Kornelkirsche, ● ♣ + ... Büsche 40—60 cm hoch	—.80	7.—	—
Wertvolles Hecken- und Vogelschutzgehölz. » 200—250 » » Strauch oder Baum, laubabwerfend, B. dunkelgrün, Bl. vor Ausbruch der B., goldgelb in Büscheln, Fr. essbar, länglich, rot. Mitteleuropa, bis 6 m, III—IV.	1.50	13.50	—
officinalis *Sieb. & Zucc.*, ⊘ . . . . . Strauch, laubabwerfend, Bl. leuchtend gelb, vor Laubausbruch, noch auffallender als C. mas. Herbstfärbung besonders schön rot. Japan, bis 4 m, III—IV.	2.—	18.—	—
pubescens *Nutt.* Weichhaariger Hartriegel ⊘ . . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs aufrecht, Zweige karminrot, in der Jugend mehr pfirsichrot, Bl. in dichten Ähren, gelblichweiss, Fr. weiss. Herbstfärbung rötlich mit grauem Ton. Kalifornien, bis 6 m, VI—VIII.	—.60	5.—	45.—
sanguinea *L.* Gewöhnlicher Hartriegel ● ⊘ . . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige braunrot, Blütendolden gelblichweiss, rund, Steinfrüchte schwarzrot. Europa-Orient, bis 4 m, V—VI.	—.60	5.—	45.—
sericea, siehe C. Amomum.			
stolonifera, siehe C. alba *Wangh.*			
stricta, siehe C. femina.			
suecia, siehe unter „Stauden".			
tatarica sibirica *Lodd.* ⊘ . . . . . Strauch, laubabwerfend, Holz im Winter leuchtend, fast mennigrot, im Sommer karminrot, B. kurz zugespitzt, unterseits hell, Blütenstände weisslich, Fr. bläulichweiss. Nordasien, Sibirien, bis 3 m, V.	—.80	7.—	60.—
» **sibirica albo-variegata,** *Hort.* . . . . . Form von dicht rundlichem Aufbau, B. sehr konstant weißbunt, Bl. weiss, Fr. lilabläulich, glasig. Schönste weissbunte Form.	—.80	7.—	60.—
Corokia — Corokie — Cornaceae.			
Cotoneaster *Raoul.*, Drahtnetzbusch ○ △ # ∧ . . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, Blättchen spärlich verteilt, klein, unterseits weisslich, Zweige merkwürdig wirr, winkelig gebogen, Bl. klein, sternartig, gelb, duftend, Fr. an kleine Kornelkirschen erinnernd. Neuseeland, bis 2 m, V—VI.	2.—	18.—	—
Coronilla — Kronwicke — Leguminosae.			
Emerus *L.* (C. pauciflora *Lam.*) △ [K] . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. gefiedert, Bl. hell- bis lebhaftgelb, in achselständigen, langgestielten, bis dreiblüt. Dolden. Südeuropa, bis 3 m, V—VII. Weitere Arten siehe unter „Stauden".	—.80	7.—	60.—
Corylopsis — Scheinhasel — Hamamelidaceae.			
pauciflora *Sieb. & Zucc.*, ⊥ △ ⊘ . . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, Wuchs dicht kugelig, Austrieb braunrot, Bl. primelgelb in wenigblütigen Trauben vor oder mit Ausbruch des Laubes. Triebspitzen das ganze Jahr schön kupfrig, Herbstfärbung gelb. Japan, 1,5 m, III—IV.	2.50	22.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Corylopsis (Fortsetzung):			
spicata *Sieb. & Zucc.*, ⊥ . . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. haselähnlich, bläulichgrün, grösser als die von C. pauciflora und glatter, Bl. hellgelb, in mehrblütigen, längeren Trauben. Japan, bis 2 m, IV.	2.—	18.—	—
Corylus — Hasel — Betulaceae. Siehe auch „Obstsortiment".			
americana *Marsh.* (C. calyculata *Dipp.*), Amerikanische Kelchnuss . . . Strauch, laubabwerfend, starkwachsend, B. breit herzförmig, tief mattgrün, Herbstfärbung brennendrot bis bräunlich. Nuss in sehr langer Hülle eingeschlossen. ON-Amerika, bis 3 m, II—III.	1.50	—	—
Avellana aurea *Kirchn.* Goldhasel . . . . . Form der heimischen Waldhasel mit goldgelben B., schwachwüchsig.	1.50	13.50	—
» **laciniata** *Kirchn.* Schlitzhasel . . . . . Form der heimischen Waldhasel mit zierlich zerschlitzten, grünen B.	1.50	13.50	—
» **rotblättrige Zellernuss** + ... Sträucher 80—120 cm hoch. Form der Zellernuß mit großen, bronzeroten B. und schönen rotbemäntelten Fr. Sehr wüchsige Form. S. auch unter „Obstsortiment".	1.20	10.—	90.—
Colurna *L.* Baumhasel ⊥ . . . . . Heister 200—250 cm hoch	1.50	13.50	—
Baum, laubabwerfend, schnellwüchsig, Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	250.—
von regelmässig pyramidalem Bau, Rinde » 10—12 » »	4.—	36.—	300.—
hell, korkig, B. schön frischgrün, hasel- » 12—14 » » nussartig. Fr. rundlich. Ungarn bis Himalaya, bis 20 m, II—III.	4.50	40.—	—
maxima atropurpurea *Rehd.* + ... Form der Lambertsnuss, B. gross, tiefdunkelrot. Beste Bluthasel.	1.20	10.—	—
Sieboldiana *Bl.* . . . . . Strauch, laubabwerfend, dicht verzweigt, Austrieb bräunlich, B. oval, langgestielt, an hellbraunen Zweigen. Japan, bis 5 m, III.	1.50	—	—
Cotinus, siehe Rhus Cotinus.			
Cotoneaster — Zwergmispel — Rosaceae.			
acuminata *Lindl.* . . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige rotgelbgrün, später rotbraun, heller gefleckt, B. länglich, derb, mit starker Stachelspitze, Bl. rötlich, Fr. braunviolett. Himalaya, bis 4 m, VI.	—.70	6.—	—
acutifolia *Lindl.* nicht *Turcz.* (C. lucida *Schlechtend.*) . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. spitzeiförmig, glänzendgrün, unterseits weissgrün, Bl. rötlichweiss, Fr. braunschwarz. Altai-Gebirge, bis 3 m, V—VI.	—.70	6.—	55.—
» **villosula** *Rehd. & Wils.* . . . . . Form von C. acutifolia Turcz (nicht Lindl.), B. grösser, unterseits zottig behaart, bedeutend schmäler, weniger zugespitzt. Mittelchina, bis 3 m, V—VI.	—.70	6.—	—
acutifolia *Turcz.*, siehe C. pekinensis.			
affinis bacillaris, siehe C. bacillaris.			
ambigua *Rehd. & Wils.* . . . . . Strauch laubabwerfend, Äste ausgebreitet, Triebe gelblich, später rotbraun, B. elliptisch-oval, zugespitzt, oberseits bald kahl, unterseits stets dicht behaart. Bl. klein, Fr. schwarz. Westchina, 3 m, V—VI.	—.70	6.—	55.—
amoena *Wils.* △ ^ . . . . . Strauch, halb-immergrün, Wuchs dichtbuschig, B. klein, matt olivgrün, Bl. weisslich, aber reichlich. Fr. karminrot. SW-China, 1,5 m, VII.	—.80	—	—
apiculata *Rehd. & Wils.* △ . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. sattgrün, rundlich, Fr. kugelig, glänzend scharlach. Westchina, 1,5 m, VI.	—.70	6.—	55.—
applanata *Veitch.* (C. Dielsiana *Pritzl.*) . . . . . Sträucher	—.70	6.—	55.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm. Strauch, laubabwerfend, starkwachsend, ausgebreitet überhängend, B. oval, dunkelgrün, unterseits weissgraufilzig. Bl. weiss, Fr. sehr zahlreich, glänzendrot, Herbstfärbung feuerrot bis tief braunrot. China, bis 2 m, VI.	2.—	18.—	—
bacillaris *Wall.* (C. affinis bacillaris *Schneid.*) . . . . . Strauch, laubabwerfend, von breitem Wuchs, Zweige zierlich übergebogen, stark behaart, B. ebenfalls stark behaart, reichblühend, Fr. fast schwarz. Himalaya, 3 m, V.	1.20	11.—	—
» **obtusata** *Hort. Gibbs.* . . . . . Form mit mehr stumpfen B., sonst wie die Art.	1.20	11.—	—
bullata *Bois.* . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. ziemlich gross, blasig aufgebauscht, Bl. weisslich mit schwach rötlichem Ton, am Ende der Zweige in Dolden. Fr. lebhaft rot, erbsengross. Herbstfärb. tief rotbraun. China, bis 3 m, VI.	—.70	6.—	55.—

Cotoneaster (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf	100 Stück M. Pf.
bullata floribunda *Rehd. & Wils.* . . . . Form von besond. Reichblütigkeit, etwas später fruchtend als die Art.	1.—	9.—	—
buxifolia *Wall.* △ ♯ . . . . mit Ballen, 30—50 cm hoch Strauch, immergrün, niederliegend, B. elliptisch, Bl. reinweiss, gross. Nepal, 1 m, VI.	1.20	11.—	—
congesta *Bak* (C. microphylla glacialis *Hook.*) △ ♯ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, den Bodenbewegungen sich vollkommen anschmiegend, B. klein, stumpfgrün. Himalaja, V—VI.	2.—	18.—	—
Dammeri, siehe C. humifusa.			
Davidiana, siehe C. horizontalis.			
Dielsiana elegans *Rehd. & Wils.* . . . . Form von C. Dielsiana = C. applanata mit besonders schön überhängenden Zweigen.	—.80	7.—	60.—
divaricata *Rehd. & Wils.* ⚘ ꝏ . . . . Strauch, laubabwerfend, B. schön eiförmig, tiefgrün, Bl. klein, rosa, Fr. hübsch rot, sehr zahlreich. China, bis 2 m, VI.	—.70	6.—	55.—
Fontanesi, siehe C. racemiflora.			
foveolata *Rehd. & Wils.* Ø . . . . Strauch, laubabwerfend, B. eielliptisch, kurz zugespitzt, dunkelgrün, Bl. rötlichweiss, Fr. kugelig, schwarz, Herbstfärbung schön scharlach und orange. China, 2—3 m, VI.	—.80	7.—	—
Franchetii *Boiss.* ♯ ꝏ . . . . Sträucher Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone Strauch, halbimmergrün, mit langen, überhängenden Zweigen, B. frischgrün, unterseits silberweiss, Bl. rötlich in 5—11 blütigen Trugdolden, Fr. orangerot, sehr zahlreich. In günstigen Wintern die B. sehr lange haftend. Westchina, bis 3 m, VI.	—.80 1.50	7.— 13.50	— —
frigida Vicaryi *Hort.* . . . . Sträucher mit Ballen Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone Strauch, laubabwerfend, B. ziemlich gross, dünn, Blütenstände gross, Fr. besonders auffallend lebhaft rot. Form des C. frigida aus dem Himalaja.	1.20 1.50	11.— —	— —
Henryana *Rehd. & Wils.* (C. rugosa Henryi *C. S.*) . . . . Strauch, halbimmergrün, mit stark hängenden Zweigen, B. schwachrunzlig, lanzettlich, unterseits blaugrau, Bl. weiss, gross, in lockeren Trugdolden, Fr. tiefscharlachrot, oval. Mittelchina, 2—4 m, VI.	1.20	—	—
Hessei, siehe C. praecox Hessei.			
horizontalis *Decne.* (C. Davidiana *Hort.*) △ ꝏ Ø mit Ballen 30—50 cm breit Strauch, halbimmergrün, von schön hingestrecktem Wuchs und fächerigen Zweigen. B. klein, dunkelgrün, Bl. rosa, Fr. leuchtend korallenrot, sehr zahlreich. Herbstfärbung rot und orange. Auch für Mauerbekleidung vorzüglich. Westchina, 1 m, VI.	1.20	11.—	100.—
» **variegata** *Osborn* △ Ø . . . . 15—25 cm breit **m. Tb.** Form von schwächerem Wuchs, dicht mit weissbunten Blättchen besetzt. Herbstfärbung schön.	2.—	18.—	—
humifusa *Duth.* (C. Dammeri *Schneid.*) △ ♯ . . mit Ballen 20—30 cm breit Strauch, immergrün, vollkommen niederliegend, langzweigig, dichtbelaubt, ziemlich grossblättrig, dunkelgrün, Bl. gross, weiss, Fr. scharlachrot. Mittelchina, 20 m, VI.	1.50	13.50	120.—
hupehensis *Rehd. & Wils.* Ø . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, dicht, B. lebhaft grün, Bl. sehr zahlreich, weiss, gross, Fr. gross, dunkelrot. Herbstfärbung gelb. Westchina, bis 2 m, V.	1.20	11.—	—
integerrima *Med.* (C. vulgaris *Ldl.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, Austrieb silbrig filzig, B. rundlich, stumpf dunkelgrün, Bl. rötlich, Fr. scharlachrot. Europa, Asien, 2 m, V.	—.70	6.—	55.—
⊛ **lactea** *W. W. Smith* ♯ ꝏ Neueinführung . . . . mit Ballen Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe Strauch, immergrün, von schön überhängendem Wuchs, B. gross, derblederig, oberseits mattgrün, unterseits anfangs weisslich, später gelblich filzig, Bl. milchweiss, sehr zahlreich in breiten vielblumigen Schirmtrauben an kleinen Kurztrieben in den Blattachseln den ganzen Zweig entlang. Fr. karmesinrot, birnförmig, sehr lange haftend, weil spät reif. Yunnan, 2—3 m, VI—VII.	2.— 2.50	18.— —	160.— —
Lindleyi *Steud.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. braungrün, Fr. schwarz. NW-Himalaja, bis 2 m, V—VI.	—.70	—	—
lucida, siehe C. acutifolia.			
microphylla *Wall.* ○ △ ♯ . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch und breit Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe Strauch, immergrün, B. klein, glänzend schwarzgrün, Bl. weiss, Fr. karminrot, Himalaja, 1 m, V—VI.	1.20 2.50	11.— 22.50	100.— —
» **cochleata** *Rehd. & Wils.* ○ △ ♯ **Neu!** 15—20 cm hoch u. breit **m. Tb.** Form mit stumpfgrüner B., an C. congesta erinnernd.	3.—	27.—	—

Cotoneaster (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
microphylla glacialis, siehe C. congesta.			
» **thymifolia** *Koehne* ○ △ ♯ . . . . 20—30 cm hoch und breit **m. Tb.** Form mit mehr linealen B., in allen Teilen zierlicher.	2.—	18.—	—
moupinensis *Franch.* ♣ Ø . . . . . . Strauch, laubabwerfend, ziemlich groblaubig, dunkelgrün, Bl. rötlich, Fr. schwarz. Westchina, bis 4 m, VI.	—.60	5.—	45.—
multiflora *Bge.* (C. reflexa *Carr.*) ♣ . . . . . . Sträucher	—.70	6.—	55.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe. Strauch, laubabwerfend, Zweige überhängend, Austrieb rötlich, Bl. milchweiss, sehr zahlreich, Fr. rot. Westasien, China, bis 2 m, V.	2.—	—	—
» **calocarpa** *Rehd. & Wils.* ♣ . . . . . . Sträucher	1.20	—	—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe. Form mit grösseren B. und vor allem viel grösseren, lebhaftroten Fr.	2.—	—	—
nanchuanica, siehe C. praecox.			
nigra *Fries* (C. melanocarpa *Lodd.*) . . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. graugrün, Fr. schwarz, bereift. Europa, Asien, bis 2 m, V—VI.	—.70	6.—	—
nitens *Rehd. & Wils.* . . . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige fächerartig ausgebreitet, dichtgestellt, B. glänzendgrün, Bl. rosa, Fr. schwärzlichrot. Westchina, bis 2 m, VI.	—.70	6.—	55.—
obscura *Rehd. & Wils.* . . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. eielliptisch, stumpfgrün, unterseits gelblich filzig, Bl. rosa, Fr. birnförmig, schwarzrot. China, bis 3 m, VI.	—.70	6.—	—
pannosa *Franch.* . . . . . . mit Ballen. Strauch, laubabwerfend bis halbimmergrün, B. klein, länglich, dunkelgrün, unterseits wollig und weiss, Bl. rötlich, Fr. stumpfrot, sehr zierend. China, bis 1,5 m, VI.	1.50	13.50	—
pekinensis *Zab.* (C. acutifolia *Turcz.*) . . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. schön hellgrün, oberseits zottig, behaart, Rand leicht umgebogen, Bl. rötlich, Fr. schwarz. Nordchina, bis 3 m, V—VI.	—.70	—	—
praecox *Hort. Vilm.* (C. nan Shan) (C. nanchuanica *Rgl.*) △ ♣ Ø . . . . mit Ballen 30—50 cm breit	1.20	11.—	100.—
» » 50—70 » »	1.50	13.50	120.—
Strauch, laubabwerfend, Zweige bogig zur Erde gehend, wurzelnd, B. rundlich, gewellt, Bl. früh, rosenrot, ziemlich gross, Fr. sehr gross, lebhaft mennigrot. Herbstfärbung leuchtend rot. Südchina, Nan-Shan, 75, V. — » » 70—90 » »	2.—	18.—	—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.50	22.50	—
® » **Hessei** *Hort. Hesse* (C. Hessei *Hort. Hesse*) △ . **Neu!** 30—50 cm breit	2.—	18.—	150.—
Form, in allen Teilen kleiner als die Art, von dichterem, langsamerem Wuchs. — Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.50	—	—
prostrata *Bak.* △ . . . . . . **mit Ballen 30—40 cm breit** Strauch, halbimmergrün, Wuchs bogig überhängend, geschlossen, B. klein, rund, Bl. rosa, Fr. rot, erbsengross. Himalaja, 1—3 m, VI.	1.50	13.50	120.—
racemiflora *K. Koch* (C. Fontanesi *Spach*) . . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. rundlich, stumpfgrün, Unterseite graufilzig, Austrieb seidig behaart, Bl. weiss, Fr. rot. Südeuropa, Nordafrika, Westasien, bis 2,5 m, V—VI.	—.70	6.—	—
» **microcarpa** *Rehd. & Wils.* . . . . . . Form mit bedeutend kleineren, dunkelgrünen, nahezu lanzettlichen B., Fr. eiförmig, klein.	—.70	6.—	55.—
» **soongarica** *Schneid.* . . . . . . Form mit grösseren B., unterseits grünlich behaart.	—.80	—	—
» **Veitchi** *Rehd.* . . . . . . Form mit glänzendgrünen, ovallanzettlichen B., unterseits grün, Fr. grösser, leuchtendrot.	—.80	7.—	—
® **rhytidophylla** *Rehd. & Wils.* ♯ . . . . . . **Neu!** Sträucher **m. Tb.**	2.50	22.50	—
Kronenbäumchen, ca. 100 cm Stammhöhe, mit Ballen. Strauch, immergrün, B. länglich lanzettlich, gelblichfilzig unterseits, oberseits runzlig, hellgrün, Bl. weisslich in dichten Dolden, Fr. birnförmig, orangerot. Westchina, bis 2 m, VII.	3.—	27.—	—
rosea *Edgew.* . . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. dünn, oberseits lebhaftgrün, unterseits weissgrau behaart, Bl. locker, rosa, Fr. rot, lange haftend. Himalaja, bis 2 m, VI.	—.80	—	—
® **rubens** *W. W. Smith* △ ♯ ♣ . . . . . . Strauch, halbimmergrün, B. auffallend stumpf schwarzgrün, zierlich, Bl. weiss, Fr. rot, sehr reich fruchtend. China, 1,5 m, VI.	1.20	11.—	100.—
rugosa Henryi, siehe C. Henryana.			
® **rupestris** *Hort. Gibbs.* △ . . . . . . **m. Tb.** Strauch, halbimmergrün, Wuchs niedrig, B. im Winter schön rötlich bronzefarben, Fr. leuchtendrot. Hybride, 1 m, VI.	1.20	11.—	100.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cotoneaster (Fortsetzung):			
salicifolia floccosa *Rehd. & Wils.* # . . . . mit Ballen 30—40 cm breit	2.—	18.—	160.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	3.—	27.—	—
Strauch, immergrün, Äste bogig oder flach ausgebreitet, B. länglich schmal, oberseits runzlig, lederig, unterseits dicht weissfilzig, Blütenstände weiss, Fr. lebhaft rot, sehr spät reifend und lange haftend. Westszechuan, 2 m, VI.			
» **rugosa** *Rehd. & Wils.* # . . . . Sträucher mit Ballen	1.50	13.50	—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.—	—	—
Form mit breiteren, dunkelgrünen und korallenroten Fr., Zweige zottig behaart, Blattunterseiten ebenso, üppiger Wuchs, China, bis 4 m, VI.			
Simonsii *Bak.* # . . . . Sträucher	—.70	6.—	55.—
Kronenbäumchen 140—160 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
Strauch, immergrün, B. lederig, rundoval, glänzend, Bl. fast weiss, Fr. korallenrot, sitzend, sehr lange haftend. Osthimalaja, bis 3 m, VI—VII.			
tomentosa *Lindl.*	—.70	6.—	55.—
Strauch, laubabwerfend, Zweige gelblich graufilzig, B. dunkelgrün, unterseits hell graufilzig, Bl. weiss bis hellrosa, Fr. mennigrot. Europa, Asien, bis 2 m, V—VI.			
vulgaris siehe C. integerrima.			
Zabelii *Schneid.*	—.70	6.—	55.—
Strauch, laubabwerfend, schlankzweigig, junge Triebe meist gelbgraufilzig, B. breitoval, dunkelgrün, unterseits gelblich oder graufilzig, Bl. rosa, Fr. dunkelrot. Westhupeh, bis 2 m, V.			
Crataegomespilus — Dornmispel — Rosaceae.			
Asnieresii *C. Schn.* . . . . Veredelungen 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
Pfropfbastard, Crataegus monogyna × Mespilus germanica, mehr an Weissdorn erinnernd, B. breit eiförmig, Bl. weiss in bis 12 blütigen Doldentrauben, Fr. rot, rund. V.			
Dardari *Jouin* . . . . Veredelungen 80—100 cm hoch	2.—	18.—	—
Pfropfbastard, Crataegus monogyna × Mespilus germanica, mehr an Mispel erinnernd, B. länglich-elliptisch, Zweige bedornt, Bl. weiss, Fr. mispelartig, aber kleiner.			
Crataegus — Dorn — Rosaceae.			
Arnoldiana *Sarg.* ⊥ . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Baum, laubabwerfend, Krone rund, Bl. schön gelblichweiss, Fr. lebhaft rot, wohlschmeckend, August. Amerika, 6—8 m, V.			
Carrierei *Vauv.* (C. crusgalli × pubescens) . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.50	22.50	200.—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
Baum, laubabwerfend, Wuchs kräftig, stark bedornt, B. dunkelgrün, glänzend, Bl. weiss, Fr. orangerot. B. und Fr. sehr lange haftend. Hybride, 5—7 m, V. Schöner Alleebaum für kleine Strassen.			
coccinea *L.* . . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Baum, stark bedornt, B. eielliptisch, kurzlappig, Bl. weiss, in mehrblütigen Dolden, Fr. kugelig, rot. Amerika, bis 6 m, V.			
coccinoides *Ashe.* . . . . 80—100 cm hoch	1.—	—	—
Baum, laubabwerfend, Austrieb rot, B. oberseits stumpfgrün, Bl. weiss, Fr. fast kugelig, dunkelkarmesin, glänzend, früh im Oktober. Herbstfärbung schön orange und scharlach. Amerika, 5—7 m, V.			
corallina *Hort.* . . . . 70—100 cm hoch	1.—	—	—
Baum, ähnlich Cr. coccinea, besonders gut korallenrot fruchtend.			
crudelis *Sarg.* (Cr. flabellata *Lge.*) . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Kleiner Baum, laubabwerfend, Dorne bis 6 cm lang, B. kurz spitzlappig, sehr schön scharf doppelt gesägt, Fr. rot. Amerika, 5 m, V.			
crusgalli *L.* Hahnendorn . . . . 60—80 cm hoch	1.—	9.—	—
Strauch oder Baum, laubabwerfend, B. glänzend, verkehrt eilanzettlich, gezähnt, Dorne lang, Bl. in lockeren, endständigen Dolden, rahmweiss, Fr. leuchtendrot, Herbstfärbung schön orange bis scharlach. Amerika, bis 10 m, VI.			
» **inermis** *Hort.* . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Dornenlose Form des Hahnendorns.			
» **salicifolia** *Ait.* (C. crusgalli linearis *Ser.*) . . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Form des Hahnendorns mit dünneren, lanzettlichen B.			
Egani *Ashe.* . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Baum, laubabwerfend, verwandt mit Cr. tenuifolia, von gleichem Zierwert wie Cr. coccinea. Illinois.			

Crataegus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ellwangeriana *Sarg.* . . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Baum, laubabwerfend, B. oberseits rauh, eiförmig, mit zwei kleinen Nebenblättchen, Dorne gebogen, Bl. weiss in wenigblütigen Blütenständen, Fr. glänzend karminrot, säuerlich, bald fallend, eiförmig bis 2,5 cm gross. Ost-Nordamerika, 5—6 m, V.			
fastigiata, siehe Cr. oxyacantha stricta.			
fissa fructu luteo *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
Baum, von kräftigem Wuchs, B. sorbusähnlich, oberseits glänzend frischgrün, unterseits matthellgrün, Fr. gelb, leicht punktiert, sehr zahlreich.			
flabellata, siehe Cr. crudelis.			
glandulosa *Ait.* (Cr. rotundifolia *Moench.*) . . . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Strauch, teilweise baumartig, laubabwerfend, mit vielen, grossen, weissen Blütentrauben. Fr. rot mit Gelb, zahlreich. Amerika, bis 6 m, V.			
grignonensis *Mouillef.* . . . . 80—100 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 200 » 8—10 » »	3.—	27.50	—
Baum, laubabwerfend, fast dornenlos, B. derblederig, doppelkerbig berandet, eiförmig, Bl. weiss, Fr. rund, scharlachrot, im Herbst lange haftend. Hybride mit Cr. pubescens, 5 m, V—VI.			
hiemalis *Lge.* (C. pentagyna × crusgalli) . . . . 60—80 cm hoch	1.—	—	—
Baumartiger Strauch, B. scharf gesägt, glänzendgrün, Bl. weiss in lockeren Doldenrispen, Fr. dunkelbraunrot. VI.			
Jonesae *Sarg.* . . . . 80—100 cm hoch	1.—	—	—
Baum, laubabwerfend, mit Cr. rotundifolia verwandt, Bl. reinweiss, Fr. hellkarminrot. Zierwert wie Cr. coccinea. Neuengland, Ostkanada.			
nemoralis *Sarg.* . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Baumartiger Strauch, laubabwerfend, B. oval, Dorne kastanienbraun oder rot, Bl. in Dolden, Fr. dunkelgrün bis leuchtendrot. Amerika, 3—4 m, V.			
nitida *Sarg.* . . . . 80—100 cm hoch	1.—	—	—
Baum, laubabwerfend, B. länglich, Bl. in vielblütiger Dolde, Fr. dunkelmennigrot, bereift. Amerika, bis 9 m, V.			
oxyacantha (monogyna) alba plena *Hort.* Pyramiden 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	2.50	22.50	—
Form des bekannten Weissdorns mit weissgefüllten Bl.			
» **punicea (flore coccineo)** *Hort.* . . Pyramiden 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Form des bekannten Weissdorns mit einfachen, leuchtend dunkelroten Bl. mit weisser Mitte.			
» » **plena** *Hort.* (Cr. monogyna kermesina plena *Hort.*) Rotdorn. Pyramiden 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	120.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.—	18.—	160.—
Form des bekannten Weissdorns mit dick gefüllten, roten Bl.			
» **rosea** *Hesse* . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
Form des bekannten Weissdorns mit einfach leuchtend rosa Bl., mit grosser, weisser Mitte, B. glänzend dunkelgrün.			
» » **plena** *Hort.* . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	2.50	—	—
Form des bekannten Weissdorns mit dickgefüllten rosafarbenen Bl.			
» **stricta** *Hort.* (Cr. fastigiata *Hort.*) Pyramiden 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Form des bekannten Weissdorns, die ohne Schnitt streng pyramidale Form annimmt. Bl. einfach weiss. » 100—150 » »	1.20	11.—	—
» 150—200 » »	1.50	13.50	—
» 200—250 » »	2.—	18.—	—
» 350—400 » »	3.—	—	—
» 400—450 » »	3.50	31.50	—
pentagyna *W. & K* (Cr. melanocarpa *Bieb.*) . . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Baumartiger Strauch, laubabwerfend, B. sattgrün mit 2—3 Lappenpaaren, Bl. weiss, Fr. länglichoval, trübschwarzrot. Kaukasien, bis 5 m, V.			
persimilis *Sarg.* (Cr. crusgalli × macracantha) . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Strauch mit dunkel orangebraunen Zweigen, Dorne 3—4 cm lang, B. dunkelgrün glänzend, unterseits hell gelbgrün, oval, Bl. langgestielt, in vielblütiger Dolde, Fr. dunkelrot. Amerika, 5—6 m, VI.			
prunifolia *Pers.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Baumartiger Strauch, laubabwerfend, B. glänzend dunkelgrün, Bl. weiss, Fr. rot, den ganzen Winter über haftend. Herbstfärbung gelb und rot. Nordamerika, bis 4 m, V—VI.			

Crataegus (Fortsetzung):

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
punctata *Jacq.* . . . . . 70—100 cm hoch Baum, laubabwerfend, breit verzweigt, kurzdornig, B. oval bis oboval, unterseits filzig, Fr. eiförmig, stumpfrot, hell gefleckt. O. Nordamerika, bis 10 m, V—VI.	1.—	9.—	—
Pyracantha, siehe Pyracantha coccinea und Formen.			
sanguinea *Pall.* . . . . . 80—100 cm hoch Baum, laubabwerfend, nur wenig bestachelt, B. breit eiförmig, Bl. in kleinen Doldenrispen, Fr. lebhaftrot. Ostsibirien, bis 7 m, V.	1.—	9.—	—
sertata *Sarg.* . . . . . 70—100 cm hoch Baum, laubabwerfend, B. gelblichgrün mit gelber Mittelrippe, Dorne gebogen, bis 6 cm lang, Bl. in 10—15 blütigen Dolden, Fr. glänzendrot. Amerika, 6—7 m, V.	1.—	9.—	—
sorbifolia *Lge.* . . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
» » » » » 200 » 8—10 » » Strauch oder Baum, laubabwerfend, B. ziemlich gross, dunkelgrün, an Mehlbeeren erinnernd, lange hängend, Bl. in Doldenrispen, Fr. länglich, scharlachrot. Vermutlich Hybride mit Cr. oxyacantha, 4 m, V—VI.	2.—	18.—	—
submollis *Sarg.* Ø . . . . . 70—100 cm hoch Baumartiger Strauch, laubabwerfend, Bl. besonders gross, Fr. hellglänzend orangerot, Herbstfärbung besonders schön dunkelrot bei gelblich feurigen Blattunterseiten. Amerika, bis 8 m, V.	1.—	9.—	—
succulenta *Lnk.* . . . . . 70—100 cm hoch Baumartiger Strauch, laubabwerfend, Dorne lang, B. spitzelliptisch, Bl. in vielblütigen Doldenrispen, Fr. glänzendschwarz. Amerika, bis 5 m, V.	1.—	—	—
tanacetifolia *Pers.* . . . . . 40—60 cm hoch Strauch oder kleiner Baum, dornlos, Zweige in der Jugend filzig, B. stark fiederspaltig, behaart, Bl. weiss, bis 2,5 cm breit, Blütenstände filzig, Fr. gelb oder rötlich. Westasien, bis 10 m, V—VI.	1.—	—	—
tarda *Sarg.* . . . . . 60—80 cm hoch Strauch, laubabwerfend. B. breitoval, dick, hellgrün, Bl. in 8—12 blütigen Doldenrispen, Fr. scharlach, saftig bei Vollreife im Okt. Amerika, bis 3 m, V.	1.—	—	—

Crinodendron — Dreispitzbaum — Eleocarpaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
dependens *Schneid.* (Tricuspidaria dep. *Ruiz & Pav.*) ‡‡ /\ . mit Ballen Strauch, immergrün, buschig, Wuchs breitgehend, B. breitoval, dicklich, glänzendgrün, Bl. rot. Chile.	1.50	13.50	—

Cudrania — Seidenwurmdorn — Moraceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
triloba *Hance* (Vanieria tricuspidata *Hu.*) /\ + ... **m. Tb.** Strauch oder Baum, laubabfallend, B. dunkelgrün, dreilappig, auch als Seidenraupenfutter verwendbar, Bl. grünlich, Fr. erdbeerrot, essbar. China, Korea, Japan, 3—10 m, V—VI.	2.—	—	—

Cydonia — Quitte — Rosaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
japonica *Pers.* (C. japonica Maulei *Hort. Holstein*) + ... Strauch, laubabwerfend, dornig, dichtbezweigt, B. glänzend tiefgrün, Bl. einfach rot, sitzend am alten Holz. Japan, bis 2 m, IV—V.	—.60	5.—	45.—
» **atrococcinea plena** *Hort.* . . . . . Form mit gefüllten, scharlachroten Bl. Remontiert.	1.—	9.—	80.—
» **Aurora** *Hort.* . . . . . Form mit einfachen, lachsroten Blüten,	—.80	7.—	—
» **Baltzii** *Hort.* . . . . . Form mit sehr grossen, einfachen, schön karmesinroten Bl. mit leuchtendgelben Staubfäden, eine der schönsten u. wirkungsvollsten Formen.	1.20	11.—	—
» **Columbia** *Hort.* . . . . . Form mit auffallend grossen B. und rosa fleischfarbenen, einfachen Bl., Fr. grünlichgelb, wohlriechend.	1.20	—	—
» **eximia** *Hort* . . . . . Form mit zahlreichen, grossen, einfachen, hellrot. Bl., hochwachsend.	—.80	7.—	60.—
» **Gaujardi** *Hort.* . . . . . Form mit grossen, einfachen, purpurroten Bl., reichblühend.	—.80	7.—	60.—
» **Moerloosi** *Hort.* . . . . . Form mit teils dunkler, teils heller rosagefärbten, einfachen Bl., die teilweise weiss gefleckt sind.	—.80	7.—	60.—
» **nivalis** *Hort.* . . . . . Form mit grossen, einfachen, reinweissen Bl.	1.20	11.—	—
» **nivea extus coccinea** *Hort.* △ . . . . . Form mit einfachen, fast weissen, aussen rötlich getönten Bl., Wuchs niederliegend, breitgehend.	—.80	7.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cydonia (Fortsetzung):			
japonica pygmaea *Hort.* △	1.20	—	—
Form mit einfachen, glänzend orange-lachs-scharlach Bl. und von niedrigem Wuchs.			
» **rubra grandiflora** *Hort.* Sträucher	1.—	9.—	80.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
Form mit besonders grossen, einfachen, karmesinroten Bl. Remontiert.			
» **sanguinea plena** *Hort.*	1.—	9.—	80.—
Form mit schön dunkelroten, gefüllten Bl.			
» **Simoni** *Hort.*	1.20	—	—
Form mit halbgefüllten, dunkelscharlachroten Bl.			
» **versicolor lutescens** *Hort.* Sträucher	—.80	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	—	—
Form mit einfachen, gelblichroten Bl.			
Maulei *Moore*, **Echt!** △ Sträucher	1.—	9.—	80.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	18.—	—
Strauch, laubabwerfend, Wuchs niedrig, dicht, Bl. ziegelrot, einfach, Fr. gelblich. Japan, bis 1 m, III—IV.			
» **alpina** *Hort.*	1.20	—	—
Form mit etwas helleren Bl. als die Art, reichblühend.			
» **grandiflora perfecta** *Froeb.*	1.20	11.—	—
Form von aufrechtem, straffem Wuchs, sehr reichblühend, Bl. meist mit 6—8 Petalen, B. breiter als bei der Art.			
Cytisus — Geissklee — Leguminosae.			
Siehe auch Genista und Laburnum.			
Ardoini *Fourn.* △ **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Strauch, Zweige und Blättchen seidenzottig, Bl. zu 1—3, reingelb. Franz. Seealpen, bis kaum 30 cm, IV—V.			
austriacus *L.* △	—.80	7.—	—
Strauch, seidig behaart, Bl. gelb, am Ende der Triebe zu Köpfen gehäuft. Osteuropa, bis 90 cm, VII—VIII.			
capitatus *Jacq.* (C. supinus *L.*) Gemeiner Kopf-Geissklee	—.80	7.—	—
Strauch, zottig behaart, Bl. sattgelb, am Ende der Triebe köpfig gehäuft. Ostfrankreich bis Kaukasus, bis 1 m, VI—VIII.			
decumbens *Spach.* ∞ △ **m. Tb.**	1.—	9.—	80.—
Strauch, niederliegend, wurzelnd, B. stumpfgrün, Bl. gross, leuchtendgelb, reichblühend. Mittel-Südeuropa, bis 20 cm, IV—VI.			
kewensis *Bean.* (C. multiflorus × Ardoini) Zwergelfenbeinginster ○ △ **m. Tb.**	2.50	22.50	—
Strauch, zierlich überhängend, Bl. mittelgross, elfenbeinfarben, reichblühend. Hybride, 50, V.			
multiflorus *Sweet* (C. albus *Link.* nicht *Jacq.*)	1.50	13.50	—
Strauch von der Tracht wie Genista praecox, mehr aufrecht, Bl. reinweiss. Spanien, Nordafrika, bis 3 m, V—VI.			
nigricans *L.*	—.60	5.—	—
Strauch, Wuchs aufrecht, Blütentrauben bis 20 cm lang, endständig, aufrecht, schön dottergelb. Südeuropa, bis 2 m, VI—VII.			
praeflorens *Hort. Hesse* **Neu! m. Tb.**	1.50	13.50	—
Strauch von üppigem, aufrechtem Wuchs, ziemlich grosse, dreiteilige B., oberseits stumpf- bis bläulichgrün, unterseits anliegend seidig behaart, Bl. ziemlich gross, lebhaft gelb, am ganzen Zweig entlang sitzend. Kaukasus, bis 2 m, IV.			
purpureus *Scop.* ○ △ mit Ballen	1.50	13.50	120.—
Strauch von niederliegend aufstrebendem Wuchs, Bl. purpurn, reichblühend entlang vorjähriger Triebe, zu mehreren gehäuft. Tirol bis Norditalien, 50, V—VI.			
» **albus** *Sweet.* △ **m. Tb.**	2.—	—	—
Form mit weissen Bl., sonst wie die Art.			
ratisbonensis *Schaeff* Zwillings-Ginster	1.—	9.—	—
Strauch von aufrechtem Wuchs, Bl. zu 3—4 gehäuft, entlang vorjähriger Triebe, dunkelgelb mit orange Tönung. Südosteuropa, bis 2 m, V.			
schipkaënsis *Dieck.* (C. albus *Hacq.* nicht *Link.*) ○ △ **m. Tb.**	2.—	—	—
Strauch von niedrigem, ausgebreitetem Wuchs, B. behaart, Bl. ziemlich gross, weiss, in 3—10blütigen, endständigen Blütenköpfen, Südosteuropa, bis 30, VI—VII.			
sempervirens *Hort.*	—.80	7.—	—
Strauch, in der Jugend dicht behaart, Bl. goldgelb, in endständig. Köpfchen.			
sessilifolius *L.* ○	—.60	5.—	—
Strauch von aufrechtem Wuchs, Blättchen sitzend, dreizählig, verkehrt eiförmig, hellbläulichgrün, Bl. satt kanariengelb in bis 12 blütigen Blütenständen. Südeuropa, bis 2 m, V—VI.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Dabeocia — Glanzheide — Ericaceae. △ #			
polifolia *D. Don* (Menziesia polifolia *Juss.*, D. cantabrica *K. Koch*) mit Ballen Strauch, immergrün, Blättchen klein, glänzendgrün, Bl. erikaartige Glocken, bläulichrot in vielblütigen, endständigen, lang ausgezogenen Trauben. Irland, Nordspanien, 20—50, VI—XI.	—.70	6.—	55.—
» **alba** *Don* (D. cantabrica alba *Dipp.*) . . . . mit Ballen Form mit reinweissen Glockenblüten, Holz hellgrün, sonst wie die Art.	—.70	6.—	55.—
Danaë, siehe Ruscus unter „Stauden“.			
Daphne — Seidelbast — Thymeleaceae.			
alpina *L.* ∞ △ [K] . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, Wuchs schön buschig, zwergig, B. schmal, blau, behaart, Bl. weiss, duftend, in kleinen, endständigen Blütenköpfen, Fr. mennigrot. Alpen, bis 30, V—VI.	3.—	—	—
Blagayana *Freyer*, Königsblume ◑ △ # . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. lederartig, glänzendgrün, am Ende der Triebe gehäuft, Bl. gelblichweiss, duftend, in gedrängten Köpfchen, Fr. weisslichrosa. Südosteuropa-Gebirge, bis 30, IV—VI.	3.—	—	—
caucasica *Pall.* ○ ◑ . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, B. schmal, länglich, lederartig, graugrün, behaart, Bl. wohlriechend in 6—10 blütigen Köpfchen am Ende vorjähriger Kurztriebe, gelblichweiss bis schneeweiss. Kaukasus, bis 1 m, V—VI.	2.50	22.50	—
Cneorum *L.* Rosmarinseidelbast ○ ◑ △ # [K] . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, niederliegend, B. glänzendgrün, schmal, unterseits blau, Bl. in 5—10 blütigen, endständigen Köpfchen, hellkarmin bis dunkelrosa, duftend, Fr. gelblichbraun. Südeuropa-Gebirge, bis 40, IV—VI.	3.—	—	—
collina *Smith* ○ # . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, kurztriebig, seidig, B. glänzendgrün, Bl. in 10—15 blütigen, dichten, endständigen Köpfchen, purpurrosa, duftend. Italien, Kleinasien, bis 75, V—VI.	3.—	27.—	—
Mezereum *L.* Kellerhals, Pfefferstrauch ● ⚘ ஃ +! . . 30—50 cm hoch Strauch, laubabwerfend, Wuchs aufrecht, B. dünn, lanzettlich, blaugrün, Bl. vor dem Laub, sitzend, rötlich fliederfarben, stark duftend, Fr. scharlachrot. Europa, bis 1,20 m, II—III.	2.50	22.50	—
oleoides *Schreb.* (D. buxifolia *Vahl.*) # . . . . **m. Tb.** Strauch mit behaarten Zweigen, B. oval-elliptisch, spitz, bis 3,5 cm gross, Bl. weiss bis hellila, Fr. rot. Mittelmeergebiet, bis 1 m, V—VI.	3.—	—	—
pontica *L.* # . . . . **m. Tb.** Strauch, meist eintriebig und erst weiter oben verzweigt, B. lederartig, glänzendgrün, bis 8 cm lang und 3 cm breit, Bl. grünlichgelb, sehr stark riechend, in dichtem Quirl um den neuen Trieb. Kleinasien, bis 1,5 m, IV—V.	3.—	—	—
Davidia — Taubenstrauch — Nyssaceae.			
involucrata *Baill.* ○ ◑ . . . . mit Ballen 150—200 cm hoch	4.—	36.—	—
Solitärpflanzen » » 200—250 » » Strauch bis baumartig, laubabwerfend, B. gross, lindenartig, frischgrün, Bl. in kugeligen Köpfchen, umgeben von zwei gegenständigen Hochblättern von mehr oder weniger weisser Färbung. Oberes Hochblatt schirmartig über den Blütenkopf gewölbt, unteres glatt herabhängend, sehr auffallend, wirkungsvolle Blütenbildung. Westchina, 4—20 m, V—VI.	6.—	54.—	—
Decaisnea — Lardizabalaceae.			
Fargesi *Franch.* ஃ . . . . 80—120 cm hoch Strauch, laubabwerfend, mit schlanken Trieben und rötlichem Austrieb, Fiederblätter wechselständig, bis 80 cm lang, oberseits stumpfgrün, unterseits blaugrau, Bl. in hängenden Rispen, glockig, grünlichgelb, Fr. ähnlich Dickebohnen, zur Reifezeit auffallend pflaumenblau bereift. Westchina, bis 5 m, VI.	1.—	9.—	80.—
Decumaria — Sternhortensie, Kletterklamme — Saxifragaceae.			
barbara *L.* ◑ ● △ ≌ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, halbimmergrün, leicht kletternd, B. glänzendgrün, gegenständig, länglich, Bl. weiss, in bis 7 cm breiten Scheindolden, wohlriechend. Amerika, bis 1 m, V—VII.	1.—	9.—	—
Desmodium — Fesselhülse — Leguminosae.			
canadense *DC.* (Hedysarum canadense *L.*) Wandelklee ♃ ♄ . . . . . . Halbstrauch oder Staude mit dreizählig fiederigen B., Bl. in grossen, dichten, blauroten Trauben. ON-Amerika, 60—100, VII—IX.	1.—	9.—	—
penduliflorum *Oudem.* (Lespedeza Sieboldi *Miq.*) Buschklee △ . . . . . Strauch, laubabwerf., von überhängend. Wuchs, Bl. purpurn, in bis 12 cm langen, lockeren, vielblütigen Trauben. Nordchina, Japan, bis 2 m, VII—X.	1.50	13.50	—

Deutzia — Deutzie — Saxifragaceae.	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
corymbiflora rosea *Hort.* . . . . Form der lebhaft grün belaubten D. corymbiflora *Lem.* mit grossen, rosa Bl. Hybride, 1,5 m, V—VI.	—.80	—	—
corymbosa *R. Br.* (D. parviflora corymbosa *Franch.*) . . . . Strauch, der sich von D. parviflora durch die mehr kerbig gesägten B. und die gezähnten Staubfäden unterscheidet.	—.80	—	—
crenata *Sieb. & Zucc.* (D. scabra *Thbg.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, B. länglich-lanzettlich, rauhhaarig, Bl. weiss in schmalen, aufrechten, rauhen Blütenrispen. Japan, China, bis 2,5 m, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
» **eburnea** *Lem.* (D. crenata candidissima plena×Vilmorinae) . . . . Hybride von auffallender Reichblütigkeit, Blütenrispen locker, mit grossen, einfachen, herrlich elfenbeinfarbenen Bl. mit goldgelben Staubfäden. Mittlere Blütezeit.	—.80	7.—	60.—
» **elegantissima** (D. scabra×discolor purpurascens) . . . . Hybride von dichtem, hohem Wuchs, B. mittelgross, dunkelgrün, Bl. in 15—18 blütigen, achselständigen Blütenständen, Einzelblüten rund, gut geöffnet, rosaweiss, karmin gerandet, von zieml. langer Blütendauer.	—.80	7.—	—
» **macrothyrsa** *Hort. Lem.* . . . . Hybride von ausserordentlicher und früh einsetzender Reichblütigkeit, die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge bedeckt mit ungewöhnlich grossen, weissen Blütentrauben. Einzelblüten klein, Staubgefässe leuchtend gelb.	1.—	9.—	—
» **magnifica** *Lem.* . . . . Form von kräftigem Wuchs. Die in gedrängten Trauben stehenden Bl. sind dicht gefüllt und schön reinweiss. Triebe stark überhängend. Mittlere Blütezeit.	—.80	7.—	60.—
» **Pride of Rochester** *Hort.* Ø . . . . Form mit weissgefüllten Bl. in grosser Rispe. Das matt tiefgrüne Laub geht im Herbst in tiefes Rotbraun über.	—.60	5.—	—
» **rosea plena** *Hort.* . . . . Form mit rosagefüllten Blüten.	—.60	5.—	45.—
» **suspensa** *Hort. Lem.* . . . . Form mit sehr grossen, glockenartigen Einzelblüten in langen, hängenden Rispen, mittlere Blütezeit.	1.—	9.—	—
discolor floribunda *Lem.* . . . . Form aufrechtwachsend, Bl. in dichten Rispen, reinweiss, weit geöffnet, Rückseite und Knospen leicht rosa. VI—VII.	—.60	5.—	—
» **grandiflora** *Lem.* . . . . Form aufrechtwachsend, Bl. weit geöff., weiss, Rückseite u. Knosp. rosa.	—.60	5.—	45.—
» **kalmiaeflora** *Hort.* . . . . Form mit aussen prächtig dunkelrosa Bl.	—.80	—	—
» **stellata** *Lem.* (D. scabra×disc. grandiflora) . . . . Hybride mit dichtgedrängten, kurzen Zweigen, B. glänzendgrün, auffallend tief gesägt, Bl. mittelgross, weiss bis karminrosa, Staubgefässe goldgelb. 100 cm, V—VI.	—.80	7.—	—
glomeruliflora *Franch.* . . . . Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit schlanken, rotbraunen Zweigen, Bl. rauh, scharf gesägt, unterseits dicht grau- oder hellgrün behaart, Bl. weiss, in zwar ziemlich kleinen, aber zahlreichen Doldenrispen entlang der vorjährigen Zweige. Westchina, bis 2 m, VI.	—.80	—	—
gracilis *Sieb. & Zucc.* Maiblumenstrauch . . . . Strauch, niedrig, B. lanzettlich, scharf gesägt, beiderseits grün, Bl. weiss in 9—15 blütigen, rispigen Trauben. Japan, bis 1 m, V—VI.	—.60	5.—	45.—
» **aurea** *Schelle* . . . . Form mit goldgelben B.	—.60	5.—	45.—
» **campanulata** *Lem.* Ø . . . . Form mit grossen, glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Bl. in reicher Fülle, Wuchs kräftig, B. matt tiefgrün, im Herbst auffallend schwärzlich blutrot.	—.60	5.—	45.—
» **candelabrum** *Lem.* (D. gracilis×Sieboldiana) . . . . Hybride mit langen, bis auf den Boden herabhängenden Zweigen, B. hellgrün, braun berandet, Bl. rahmweiss bis milchweiss in dicht gedrängten Blütenständen, Staubgefässe goldig.	—.60	5.—	—
» **carminea** *Lem.* (D. Lemoinei×gracilis) Ø . . . . Hybride von grosser Reichblütigkeit, B. matt tiefgrün, Bl. mittelgross, schneeweiss, Herbstfärbung schwärzlich rotbraun.	—.60	5.—	—
» **fastuosa** *Lem.* (D. gracilis×Sieboldiana) . . . . Hybride von straffem Wuchs, Bl. milchweiss in 20—25 blütigen, verlängerten, aufrechten Blütensträussen.	—.60	5.—	—

Deutzia (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
gracilis marmorata *Hort.* Form mit schön weissgesprenkelten B.	—.60	—	—
» **multiflora** *Lem.* (D. gracilis×discolor purpurascens) Hybride von aufrechtem Wuchs mit unzähligen, weissen Bl. entlang der Zweige.	—.60	5.—	—
» **venusta** *Lem.* (D. gracilis×discolor purpurascens) Hybride von dichtem Wuchs, mit Bl. in langen Rispen und in der Form einer reinweissen Miniatur-Azalee. Interessante, wertvolle Form.	—.80	7.—	—
hybrida Mont-Rose *Hort. Lem.* (D. longiflora×disc. elegantissima) Hybride mit straffen Zweigen, Bl. gross, weit geöffnet von einem schön rosigen Mauve in horizontal. Blütenständ., die Pflanze ganz überdeck.	1.—	9.—	—
» **Watereri** *Veitch.* Hybride mit sehr grossen, einfachen, reinweissen Bl.	—.60	5.—	—
» **Welsi** *Veitch.* Hybride mit reinweiss gefüllten Bl. von grosser Reichblütigkeit.	—.60	5.—	—
hypoglauca *Rehd.* Strauch mit unterseits blaugrauen B., Bl. reinweiss in halbkugeligen Blütenständen. China, bis 2 m, VI.	1.—	—	—
Lemoinei *Lem.* (D. gracilis×parviflora) (D. angustifolia *Dipp.*) Hybride von niedrigem Wuchs mit grossen, weissen Bl. in zahlreichen Doldenrispen. Gilt als eine der schönsten, weissen Deutzien für Treibzwecke und Vorpflanzung.	—.60	5.—	—
» **Boule rose** *Hort. Lem.* (D. Lemoinei×discolor) Hybride, Zweige dicht besetzt mit kurzgestielten Dolden, Bl. gut geöffnet, 20—25 in einer Dolde, innen weiss, am Rande und aussen rosa gefärbt.	1.—	9.—	—
longifolia *Franch.* Strauch, laubabwerfend, B. lanzettlich, dicklich, rauh, runzlig, unterseits dicht weissfilzig, Bl. bis 2,5 cm breit, rosenrot überlaufen, innen mehr weiss, in grossen, lockeren, breiten Rispen. China, bis 2 m, VI.	1.—	9.—	—
mollis *Duthie* **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, B. oberseits rauh, unterseits dicht weich behaart, elliptisch, Bl. weiss, in breiten, flachen Trugdolden. Mittelchina, b. 2 m, VI.	1.—	—	—
parviflora *Bnge.* Strauch, laubabwerfend, von aufrechtem Wuchs, B. scharf gesägt, beiderseits grün, Bl. weiss, in reichblütigen Trugdolden. Nordchina, bis 2 m, IV—VI.	—.60	5.—	45.—
Schneideriana *Rehd.* Strauch, laubabwerfend, B. scharf gesägt, rauh, Bl. weiss, leicht gewellt, in lockeren Blütenständen. China, bis 2 m, VI.	—.80	—	—
» **laxiflora** *Rehd.* Form mit blassgrünem Laub, kurz gestielt, länglich lanzettlich, unregelmässig gezähnt, Bl. weiss in breitpyramidalen, lockerrispigen Blütenständen.	—.80	7.—	—
Sieboldiana Dippeliana *C.S* Form der D. Sieboldiana mit breiteren, kleineren B., lockeren Blütenständen, Bl. weiss, klein, aber in aufrechten, breit eiförmigen Blütenständen. Japan, bis 1 m, VI.	—.80	—	—
Vilmorinae *Lem.* Strauch, laubabwerfend, B. länglich lanzettlich, scharf gezähnelt, oberseits locker sternhaarig, unterseits dicht sternhaarig, grauweiss, Bl. gross, weiss, in bis zu 25 blütigen, lockeren, seitenständigen Trugdolden. Mittelchina, bis 1,5 m, VI.	—.80	—	—
Wilsoni *Duthie* (D. discolor × mollis) Strauch von kräftigem Wuchs, B. breit, stark behaart, Bl. sehr gross, reinweiss, reichblühend. Zentralchina, bis 2 m, VI.	—.80	—	—

Diervillea — Weigelie — Caprifoliaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
biformis, *Hort.* Hybride, mit großen, hell- und dunkelrosa Bl.	—.80	7.—	—
candida *Hort.* (D. florida × coraeensis) Hybride mit auch im Verblühen reinweiss bleibenden Bl., sehr reichblühend, B. stark hellgrün.	1.—	—	—
Chamaeléon *Hort.* Hybride, sehr reichblühend, Bl. karmin und hellrosa.	—.80	7.—	—
Dame blanche *Hort.* (D. amabilis × hortensis) Hybride von kräftigem Wuchs, Bl. sehr gross, elfenbeinweiss mit hellgelbem Schlund.	1.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Diervillea (Fortsetzung):			
decora *Nakai* (D. versicolor *Sieb. & Zucc.*) . . . . Strauch mit oberseits dunkelgrünen B., Mittelrippe auffallend hell, auf der helleren Blattunterseite fast weiss. Bl. klein, anfangs grünlich gelb, später sich schön rötend. Farbwechsel interessant. Japan, bis 2 m, V—VII.	1.—	—	—
Desboisii *Hort.* (D. hortensis × floribunda) . . . . Hybride mit großen Bl., rosa mit weiss marmoriertem Saum, sehr früh.	—.80	7.—	—
Edouard André *Lem.* (D. amabilis × floribunda) . . . . Hybride mit dunkelroten Bl.	—.80	7.—	—
Emile Gallé *Lem.* . . . . Hybride mit dunkelroten Bl.	—.80	—	—
Eva Rathke *Rathke* (D. amabilis × floribunda) . . . . Hybride mit grossen, aufgerichteten, prächtig leuchtend karmin-purpurroten Bl., sehr reichblühend, nicht sehr stark wachsend.	1.20	11.—	—
Féerie, *Lem.* . . . . Hybride von wunderbar reinem Rosa, sehr grossblumig und reichblühend.	—.80	7.—	—
florida purpurea *Hort. Gibbs.* △ . . . . Form mit kleinem, rotem Laub, dichtbuschig, Bl. dunkelrosa.	1.—	9.—	—
grandiflora Vanhouttei *Lem.* (D. florida × hortensis) . . . . Hybride mit lebhaft wirkenden Bl., leuchtend rosa, Blütenlappen außen weiss berandet, ein Lappen ohne Berandung.	—.80	—	—
hortensis aurea, *Hort.* . . . . Form mit schönen, goldgelben B., Bl. klein, einfarbig kirschrot.	—.80	7.—	—
» **Conquête** *Lem.* (D. florida × hortensis) . . . . Hybride starkwachsend und reichblühend, Bl. dunkelrosa, riesig gross, in 6—8 blütigen Büscheln entlang vorjähriger Triebe.	1.—	9.—	—
» **rubra aureo-marginata** *Hort.* . . . . Form mit schön gelb gerandeten B.	—.80	—	—
japonica *D. C.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. breit elliptisch, auffallend gross, Bl. erst weiss, dann in karmin Weinrot übergehend. Japan, China, bis 3 m, V—VI.	—.80	—	—
Lowei *Rehd.* (D. florida × floribunda) . . . . Hybride mit stark behaarten Trieben und Stielen, Bl. dunkelpurpurrot.	1.—	9.—	—
Mad. Lemoine *Billiard* (D. florida × amabilis) . . . . Hybride, sehr reichblühend, Bl. frischrosa, teils weiss getönt, mit scharlachrotem Schlund, im Verblühen im Ganzen dunkler werdend.	—.80	7.—	—
Président Duchartre *Lem.* (D. florida × floribunda) . . . . Hybride, straff aufrecht wachsend, B. leicht bronziert, im Austrieb dunkelrandig, gewellt, Bl. schwärzlich dunkelpurpur, mittelspät.	1.—	—	—
rivularis *Gatt.* . . . . Strauch, laubabwerfend, mit behaarten Trieben und B., Bl. am Ende diesjähriger Triebe in Rispen, gelb, schmalröhrig. Amerika, bis 2 m, VII—VII.	—.80	—	—
rosea Kosteriana variegata *Hort.* . . . . Form mit schön gelbbunter Belaubung.	1.—	9.—	—
sessilifolia *Buckl.* . . . . Strauch, laubabwerfend, mit fast sitzenden B. und schwefelgelben Bl. in endständigen Rispen. ON-Amerika, bis 1,5 m, VI—VIII.	—.80	—	—
splendens *Kirchn.* (D. sessilifolia × D. Lonicera) . . . . Strauch, laubabwerfend, ähnlich D. sessilifolia, aber B. kurz gestielt, Austrieb glänzend gelb, Herbstfärbung wunderschön metallisch kupferrot.	—.80	—	—
Stelzneri *Hort.* (D. florida × hortensis) . . . . Hybride, starkwachsend, Bl. karmin und rosa.	—.80	—	—
styriaca *Klenert* (D. amabilis × floribunda) . . . . Hybride von ausgezeichnetem Wuchs und Blütenreichtum, leuchtend amarantrot, mittelgross und mittelfrüh.	1.—	—	—
Verschaffelti *Hort.* . . . . Hybride mit purpurrosa Bl. mit weissem Saum.	—.80	—	—
Dimorphanthus, siehe Aralia.			
Diospyros — Persimone — Ebenaceae.			
Lotus *L.*, Dattelpflaume . . . . 250—300 cm hoch Baum, laubabwerfend, mit runder Krone, B. länglich, glänzend dunkelgrün, Bl. rötlich oder grünlichweiss, Fr. an weiblichen Pflanzen kirschengross, gelb, blau bereift, fad schmeckend, aber lange haftend. Orient, Japan, bis 12 m, VI.	2.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Dipelta — Doppelschild — Caprifoliaceae.			
floribunda *Max.* . . . . **m. Tb.** Strauch, an Diervillea erinnernd, B. eilänglich, zugespitzt, 5—9 cm lang, ganzrandig, fast kahl, Bl. in kleinen Büscheln entlang der Zweige, weiss, lilarosa getönt, von glockig-trichteriger Form. China, bis 5 m, V	2.—	—	—
Diplopappus chrysophyllus, siehe Cassinia fulvida.			
Dirca — Lederholz — Thymelaeaceae.			
palustris *L.* ○ ◑ ≌ [K] + ... mit Ballen 30—50 cm hoch Strauch, laubabwerfend, auffallend hell gelbgrün belaubt, bei biegsamem Holz, B. dünnhäutig, breitoval, Bl. vor oder mit dem Laub, hellgelb, Fr. gelbrot, pflaumenartig, schnell abfallend. ON-Amerika, bis 1,5 m, III—IV.	1.50	13.50	—
Disanthus — Doppelblüte — Hamamelidaceae.			
cercidifolia *Maxim.* ⚘ . . . . **m. Tb.** Strauch, buschig, B. langgestielt, kreisförmig oder rundoval, dickfleischig, lackartig glänzend, dunkelgrün, auffallend schön geadert, Herbstfärbung prächtig purpurn oder orangerot, Bl. in zweiblütigen Köpfchen, ähnlich Hamamelis, aber violettpurpurn. Japan, bis 5 m, X.	5.—	—	—
Distylium — Doppelgriffel — Hamamelidaceae.			
racemosum *Sieb. & Zucc.* ◑ # . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch Strauch, in Heimat Baum, immergrün, B. einfach sattgrün, unterseits weisslich hellgrün, Bl. rötlich, wenig auffallend, in achselständigen Ähren. Japan, bis 25 m, III—IV.	1.50	13.50	—
Drimys — Beissrinde, Gewürzrindenbaum — Magnoliaceae.			
aromatica *F. Müller* (Tasmannia aromatica *R. Br.*) # ∧ + **m. Tb.** 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, sehr stark pfefferig riechend, B. stumpf, lanzettförmig, Blattstiele und Triebe rot, Bl. weiss, in den Blattachseln, Fr. als Pfefferersatz verwandt. Australien, bis 4,5 m, IV—V.	1.50	13.50	—
Dryas, siehe unter „Stauden".			
Elaeagnus — Ölweide — Elaeagnaceae.			
angustifolia *L.* ⚘ ⚘ . . . . Baum oder Strauch, laubabwerfend, ganze Pflanze silbrig, Zweige mitunter dornig, B. länglich-lanzettlich, Bl. glockig, gelb, duftend, Fr. länglich, gelb. Mittelmeergebiet, bis 7 m, VI.	—.60	5.—	—
edulis *Hort.* (E. multiflora *Thbg.*, E. longipes *Gray*) ⚘ ⚘ + ... Strauch, laubabwerfend, dornlos, Zweige goldbraun schülferig, Bl. eielliptisch, oberseits dunkelgrün, unterseits silbrig, Bl. blassgelb in dichten Büscheln, Fr. rot, länglich, saftig, herb, ergeben gutes Kompott. China, Japan, bis 3 m, V.	—.60	5.—	45.—
macrophylla *Thbg.* # ∧ . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch Strauch, immergrün, dornlos,, B. breitoval, oberseits graugrün, unterseits silberweiss, lederartig, Bl. silberweiss mit Gelb, in achselständigen Büscheln. Japan, bis 3 m, IX—XI.	1.50	13.50	—
pungens maculata aurea *Hort.* # . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch Form der immergrünen, dornigen Art mit gelbgefleckten B.	1.50	13.50	—
» **Simoni** *Carr.* # ∧ . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch Form mit langen, schmalen, immergrünen B.	1.50	13.50	—
» » **tricolor** *Hort.* # ∧ . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch Form mit langen, schmalen, gelb- u. grüngefl., immergrünen B.	1.50	13.50	—
reflexa *Morr. & Dcne.* (E. pungens reflexa *Rehd.*) # mit Ballen 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, mit dunkelgrünen, unterseits silberweissen B. Ostasien, bis 2 m, X.	1.50	13.50	—
umbellata *Thunb.* . . . . Strauch, laubabwerfend, junge Zweige silbern, B. bis 3 cm breit, 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silbern, meist wellig, Bl. gelblich, duftend, Fr. kugelig, rot. China, Japan, bis 4 m, VI.	—.60	—	—
Eleutherococcus, siehe Acanthopanax.			
Elsholtzia — Kamminze — Labiatae.			
Stauntoni *Benth.* ♄ ○ . . . . Halbstrauch, laubabwerfend, B. lanzettlich, schön gesägt, gegenständig, frischgrün, Bl. in dichten, langen Scheinähren, rosaviolett, Laub aromatisch duftend. Nordchina, 1 m, IX—X.	2.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Empetrum — Rauschbeere — Empetraceae. △ ♯			
nigrum *L.*, Krähenbeere ◑ ● . . . . mit Ballen Strauch, heideartig, kriechend, dichtrasig, immergrün, B. frischgrün, etwa 5 mm lang, lineal, Bl. klein, rosa bis purpurn, Fr. beerenartig, schwarz. Europa, bis 25 cm, IV—V.	—.70	6.—	—
» **scoticum** *Hook.* . . . . mit Ballen Form mit dunkelgrüner, etwas gröberer Belaubung, sonst wie die Art.	—.70	6.—	55.—
Enkianthus — Prachtglocke — Ericaceae.			
campanulatus albiflorus *Mak* ◑ ⊘ . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch	1.20	11.—	100.—
» » 70—100 » »	2.—	18.—	—
Strauch, laubabwerfend, B. scharf gesägt, frischgrün, lederig, Bl. in hängenden Blütenständen, zahlreich, weisslich, rotgestreifte Glöckchen. Herbstfärbung auffallend leuchtend feurigrot. Japan, bis 4 m, V.			
Ercilla — Phytolaccaceae.			
volubilis *A. Juss.* (Bridgesia spicata *Hook.*) ⚓ ♯ ∧ mit Ballen 30—40 cm hoch Strauch, mit Luftwurzeln kletternd, immergrün, B. klein, wechselständig, lederig, hell silbriggrün, wellig gesäumt, Bl. klein, graurosa, ährig, Fr. purpurn, beerenartig. Peru, Chile, 1,5 m, III—IV.	1.20	11.—	—
Erica — Heide — Ericaceae. ○ △ ♯ ✿ Siehe auch Calluna.			
australis *L.* ∧ ✂ . . . . mit Ballen Strauch, aufrecht, frischgrün, immergrün. B. zu vieren quirlig, Bl. zu vieren endständig, rosa. Spanien, Portugal, 30—40, III—IV.	—.70	6.—	—
ciliaris *L.* ∧ . . . . mit Ballen Strauch, niederliegend-aufstrebend, immergrün, zierlich belaubt, B. zu dreien, grau behaart, Bl. gross, schön purpurrosa. Westeuropa, 25, VII—IX.	—.60	5.—	—
cinerea alba *Bedf.* . . . . mit Ballen Form der grauen Heide mit reinweissen Bl. in endständigen Ähren. 30—50, VI—IX.	—.70	6.—	50.—
» **atropurpurea** *Lodd.* . . . . mit Ballen Form der grauen Heide mit blutroten Bl.	—.70	6.—	50.—
» **atrorosea** *Hort.* . . . . mit Ballen Form der grauen Heide mit dunkelrosa Bl.	—.70	6.—	50.—
herbacea *Auct.* (E. carnea *L.*) Schneeheide . . . . mit Ballen Strauch, niederliegend-aufstrebend, immergrün, B. nadelartig, zu vieren quirlig, Knospen im Herbst vorgebildet, Bl. lebhaft rosenrot, dichtsitzend in grosser Zahl. Alpen, 15—25, nach der Schneeschmelze.	—.60	5.—	—
» **alba** *Auct.* (E. carnea alba *Zab.*) . . . . mit Ballen Form von niedrigem, plattem Wuchs, Bl. reinweiss.	—.70	6.—	55.—
» **James Backhouse** *Hort.* . . . . Neu! mit Ballen Form von früher Blüte und grösseren Rispen, Bl. lichtrosa, II—IV.	1.—	—	—
» **Vivelli** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit dunkler Belaubung, im Herbst braunrot, Bl. sehr dunkel karminrot. Wohl dunkelste Form.	—.70	6.—	55.—
» **Winter Beauty** *Hort.* . . . . mit Ballen Form von schön dichtem Wuchs, grossblumig, dunkelrosa, früheste Form der Art. Schon Weihnachten in Blüte.	—.70	6.—	55.—
Mackayana *Babingt.* (E. tetralix × ciliaris) ⩯ . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, B. kürzer und breiter als bei E. Tetralix, zu vieren in Quirlen, Bl. rosa, schön geöffnet in Dolden oder traubenähnlichen Büscheln. Standortsform aus Irland, 10—25, VI—VIII.	—.70	6.—	55.—
mediterranea erecta *Hort.* . . . . mit Ballen Form der hohen Mittelmeer-Erika, von straff aufrechtem Wuchs, Bl. dunkelrosa, lange blühend, 40—60 cm, III—V.	1.—	—	—
multicaulis *Salisb.* (E. stricta *Andr.*, E. terminalis *Salisb.*) ⩯ ∧ mit Ballen Strauch, immergrün, von straffem Wuchs, B. frischgrün, zu vieren quirlig, Bl. rosa, zylindrisch. Süditalien, Spanien, 30—60, VII—VIII.	—.70	6.—	55.—
Tetralix alba *Ait.* . . . . mit Ballen Form der heimischen Glockenheide mit weissen Bl., bis 30, VI—IX.	—.50	4.—	35.—
» **mollis** *Bean.* . . . . mit Ballen Form der Glockenheide, B. unten weissfilzig, so dass die ganze Pflanze grau erscheint, Bl. schön weiss.	—.80	7.—	—
» **rubra** *Bedf.* . . . . mit Ballen Form der heimischen Glockenheide mit dunkelroten Bl.	—.50	4.—	35.—
vagans alba *Sweet* . . . . mit Ballen Form der englischen Cornwallheide mit weissen Bl. in 15 cm langen, ährenartigen Trauben.	—.60	—	—
» **carnea** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit zart fleischfarbenen Bl., 25, VIII—IX.	—.60	5.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Erica (Fortsetzung):			
vagans Lyonesse *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit weissen Bl., grösser als die der alten weissblühenden Form, daher weisser erscheinend, von bester Wirkung.	—.70	6.—	55.—
» **Mrs. D. F. Maxwell** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit tiefrosa Bl. von besonderer Leuchtkraft.	—.70	6.—	55.—
» **rubra** *Dipp.* . . . . mit Ballen Form mit dunkelroten Bl., sonst wie die Art.	—.60	5.—	45.—
» **St. Keverne** *Hort.* . . . . mit Ballen Form mit dichten, lachsfarbig roten Blütenständen.	—.70	6.—	55.—
Erica, in besten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 45.—			
Erinacea — Igelginster — Leguminosae.			
pungens *Boiss* ∞ △ [K] ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, schwachwüchsig, dichte, stechende Polster, Laubblättchen spärlich, seidig behaart, Zweige dunkelgrün, Bl. zu 1—3 achselständig am Ende der Zweigchen, hellpurpurblau. Pyrenäen, Korsika, 15—25, IV—V.	2.—	—	—
Escallonia — Escallonie — Saxifragaceae.			
langleyensis *Veitch.*, (E. Philippiana × punctata) ♯ ∧ **m. Tb.** 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, mit überhängenden, dunkelgrünen Zweigen und an Veronica erinnernden, endständigen Blütenständen in karminrosa Farbe. In warmen Lagen auch für Hecken. Hybride, 1,5 m, VI—VIII.	1.20	11.—	—
macrantha *Hook. & Arn.* ♯ ∧ . . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, mit üppigen, glänzenden B. und fuchsiaähnlichen, rosaroten Bl. Südamerika, 1,5 m, VIII.	1.20	—	—
Philippiana *Mast*, (E. virgata *Pers.*) ♯ . . . . **m. Tb.** Strauch, wintergrün, dicht verzweigt, B. klein, bis 15 mm, einfach, glänzendgrün, Bl. achselständig, weisslich, in Scheintrauben. Chile, bis 1 m, VI—VII.	1.20	11.—	—
rubra *Pers.* ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch Strauch, immergrün, mit wechselständigen, lederartigen B., Bl. karmin, in endständigen Blütentrauben. Chile, 1 m, VII—VIII.	1.20	11.—	—
Eucryphia — Eucryphiaceae.			
pinnatifida *Gay.* (E. glutinosa *Focke*) ♯ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. grün, schön gefiedert, ähnlich Rosenblättern, Bl. gross, einfach, weiss mit zierenden Staubgefässen an Hypericum erinnernd, Chile, bis 5 m, VII—VIII.	2.50	22.50	—
Euptelea — Scheinrüster — Trochodendraceae.			
polyandra *Sieb. & Zucc.* ⊘ . . . . **m. Tb.** 40—60 cm hoch Strauch, laubabwerfend, B. wechselständig, gross, rundlich, scharf zugespitzt, grob gezähnt, prächtig metallisch glänzend, Austrieb rotbraun, Herbstfärbung gelb und rot, Bl. vor dem Laub in Büscheln, rotfädig. Japan, bis 10 m, III—IV.	2.50	22.50	—
Evodia — Rutaceae.			
hupehensis *Dode* . . . . 200—250 cm hoch Baum, laubabwerfend, Laub streng riechend, flott wachsend, B. gefiedert, Einzelblättchen bis fast 30 cm lang, glänzendgrün, Bl. zahlreich, grünlichweiss in endständigen, breiten Rispen, von fast 2 Monaten Blühdauer. China, bis 6 m, VI—VIII.	2.50	—	—
Evonymus — Spindelbaum — Celastraceae.			
alata *Rgl.* (E. striata *Loes.*) Korkästiger Spindelbaum ⊘ . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, mit korkig-flügelkantigen Zweigen, B. tiefgrün, spitzoval, im Herbst prächtig flammend, purpurn. Bl. wenig auffallend, gelblich, Fr. braunrot. Japan, bis 4 m, V—VI.	1.20	11.—	100.—
» **triflora** *Franch & Sav.* . . . . Form meist ohne Korkflügel, B. besonders scharf fein gesägt. Sonst wie die Art.	1.20	—	—
americana angustifolia *Wood.* ⊘ . . . . Form der echten E. americana von aufrechtem Wuchs, B. schmal, fast lineal, dunkelgrün, nahezu wintergrün. Herbstfärbung schwärzlich rotbraun mit violettem Schein.	1.20	11.—	—
» **angustifolia purpurea** *Pursh.* ⊘ . . . . Form mit schmalen, sichelförmig zugespitzten, oberseits dunkelgrünen, später dunkel purpurfarbenen B. Herbstfärbung dunkelrotbraun mit violettem Schein.	1.20	—	—

Evonymus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
atropurpurea *Jacq.* ₰ ꝏ Ø . . . . . Strauch, bisweilen baumartig, laubabwerfend, straff wachsend, B. eielliptisch, fein gesägt, Bl. dunkelpurpurbraun, Fruchtkapsel scharlachkarminrot. Amerika, bis 5 m, V—VI.	1.20	—	—
Bungeana *Maxim.* ꝏ Ø . . . . . Strauch oder Baum, von locker überhängendem Wuchs, B. länglich elliptisch, bis 10 cm lang, Herbstfärbung herrlich lachsfarben, Bl. grünlichgelb, verästelt, Fr. hell fleischfarb., Samenmantel orange. Nordchina, bis 5 m, V.	1.20	—	—
europaea *L.* Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelbaum ꝏ Ø . . . . . Strauch, laubabwerfend, B. eielliptisch, kerbsägig, Bl. gelblichgrün, Fr. rosa bis rot, Samen orange. Europa, bis 5 m, V.	—.60	5.—	45.—
(GA) » **aldenhamensis** *Hort. Gibbs.* ꝏ Ø . . . . . Form von grosser Fruchtbarkeit schon bei jungen Pflanzen.	1.20	11.—	—
» **argenteo-variegata** *Hort.* Ø . . . . . Form mit weissen Flecken auf den dunkelgrünen B., Herbstfärbung prachtvoll rotbraun, wobei sich die elfenbeinweissen Blattflecken lebhaft abheben.	—.80	7.—	—
» **pubescens** *Hort.* . . . . . Form mit grossen, gewellten B.	—.80	7.—	—
Hamiltoniana *Wall.* ꝏ Ø . . . . . Strauch, laubabwerfend, buschig, B. hellgrün, lederartig, bis 12 cm lang bei 3 cm Breite, Bl. mit lebhaft roten Staubbeuteln, Fr. gelblich bis fleischrot., Samenmantel mennigrot. Herbstfärbung schön violettbraun. Himalaja, bis 2 m, V—VI.	1.20	—	—
» **semi-persistens** *Rehd.* . . . . . Form mit in günstigen Lagen halbimmergrüner Belaubung, B. schön hellgrün, Bl. zahlreich, grün mit lebhaft roten Staubbeuteln.	1.20	—	—
japonica microphylla compacta *Hort.* △ # . . . . . **m. Tb.** Form, immergrün, dicht pyramidal, zwergig, kleinblättrig, sehr schön dunkelgrün.	1.20	—	—
(GA) » **microphylla compacta variegata** *Hort. Gibbs.* △ # . . **m. Tb.** Form, immergrün, dicht pyramidal, zwergig, kleinblättrig, B. schön weissbunt.	1.20	11.—	100.—
kewensis *Hort.* (E. radicans minima *Sim.-L.*) ◑ ● △ # . . . . **m. Tb.** Form von E. radicans mit ganz kleinen, ovalen B., oberseits frischgrün mit heller Aderung, kriechend und wurzelnd. Wächst stets nach Norden.	—.70	6.—	55.—
lanceifolia *Loes.* ꝏ . . . . . Strauch oder kleiner Baum, laubabwerfend, B. auffallend gelblichgrün, lanzettlich, Bl. cremeweiss, Fr. orangerot, sehr zierend. China, bis 9 m, VI.	1.20	11.—	—
latifolia *Scop.* Breitblättriger Spindelbaum ꝏ Ø . . . . . Strauch oder kleiner Baum, laubabwerfend, B. dunkelgrün, Bl. grünlich in bis 6 cm langen, schlanken, gestielten Scheindolden, Fr. meist 5flügelig karminrot, Samenmantel orange. Südeuropa, bis 7 m, V—VI.	1.20	—	—
» **planipes** *Koehne* ꝏ Ø . . . . . Unterscheidet sich von der Art durch die spitzeren, grob gesägten B.	1.20	11.—	—
nana Koopmanni *Dipp.* (E. nana turkestanica *Dieck*) ₰ △ # ꝏ . . . Form, fast immergrün, von straffem Wuchs, B. schmallänglich, stumpfgrün, Bl. dunkel rötlichbraun bis purpurfarben, Samenmantel mennigrot. Turkestan, bis 1 m, V—VI.	1.—	9.—	—
obovata *Nutt.* ◑ ● △ Ø . . . . . Strauch, laubabwerfend, niederliegend, wüchsig, B. stumpfgrün, verkehrt eiförmig, Herbstfärbung schön rot, Bl. rötlich, wenig auffallend, Kapseln fünffurchig, karmesin bis dunkelrot, höckerig mit weichen Stacheln besetzt, Samenmantel hellscharlachrot. Zur Unterpflanzung von Gehölzen wertvoll. Kanada, bis 30 cm, VI—VII.	1.50	13.50	—
oxyphylla *Miqu.* ꝏ Ø . . . . . Strauch oder Baum, laubabwerfend, B. breitoval, lang zugespitzt, kerbsägig, hellgrün, unterseits netzadrig. Herbstfärbung schön dunkelrot, Bl. grünlich, Fr. langgestielt, kugelig mit 5 Rippen, dunkelrot. Japan, bis 7 m, V.	1.20	—	—
radicans *Sieb.* ● ■ :‖: # . . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, kriechend, wurzelnd, B. klein, 1—3 cm lang, oval, kerbig, oben stumpfgrün, Nervatur heller. Korea.	—.50	4.50	40.—
(GA) » **acuta** *Rehd.* ◑ ● △ # . . . . . mit Ballen	—.80	7.—	60.—
Kronenbäumchen 40— 60 cm Stammhöhe	1.50	—	—
» 80—100 » »	2.—	18.—	—
Form, immergrün, niederliegend oder kletternd, B. schön dunkelgrün bis bronzefarbig, viel dunkler als E. radicans vegeta, Laub spitzer. Zu Gehölz-Unterpflanzungen.			
» **minima**, siehe E. kewensis.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Evonymus (Fortsetzung):			
radicans variegata *Hort.* Δ ⁞ # . . . . mit Ballen	—.60	5.—	45.—
Kronenbäumchen 50— 70 cm Stammhöhe	1.25	11.—	—
» 70—100 » »	1.50	13.50	—
Form, immergrün, mit schön weissbuntem Laub in Grösse der Art.			
» **vegeta** *Rehd.* ● Δ # . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	80.—
Kronenbäumchen 50— 70 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
» 80—100 » »	2.—	—	—
Form, immergrün, von üppigem Wuchs, Laub glänzend hellgrün, rundblättrig. Auch zur Wandbekleidung.			
sanguinea *Loes.* & Ø . . . . Strauch oder Baum, laubabwerfend, gut verzweigt, B. dunkelgrün, spitzoval, fein gesägt, lange haftend, Austrieb rötlich, Herbstfärbung tief scharlachrot. Bl. in lockeren, langgestielten, vielblütigen Blütenständen, grünlichgelb, Fr. vierflügelig, gross, rot, Samenmantel gelb, Samen schwarz. Westchina, bis 7 m, V.	1.20	11.—	—
verrucosa *Scop.* ● . . . . Strauch, laubabwerfend, mit von bräunlichen Warzen bedecktem, grünlichgrauem Holz, B. gelbgrün, spitzeilanzettlich, Bl. rötlichbraun, Fr. gelbrot, Samen schwarz mit blutrotem Mantel. SO.-Europa, bis 2 m, V—VI.	1.20	11.—	—
yedoënsis *Koehne.* & . . . . Strauch, laubabwerfend, B. gross, breit eiförmig, Bl. in vielblütigen Ständen, gross, gelbrot, Fr. karminrosa, reich fruchtend, lange haftend. Japan, Korea, bis 3 m, VI.	1.20	—	—
Exochorda — Scheinfelsenbirne, Perlstrauch — **Rosaceae.**			
Alberti *Rgl.* . . . . Baumartiger Strauch, laubabwerfend, B. graugrün, sehr früh austreibend, Bl. weiss in aufrechten Trauben. Auch Knospenstände schon sehr zierend. Turkestan, bis 4 m, IV—V.	2.—	18.—	—
» **macrantha** *Hort.* (E. Alberti × grandiflora) . . . . Hybride, mit besonders üppigem Flor schneeweisser Bl., gut öffnend, in 8—10 blütigen Blütentrauben. Bis 4 m, V.	2.50	22.50	—
® **Giraldi** *Hesse* . . . . Strauch, laubabwerfend, Austrieb schön rot, B. rundlich, Bl. bisweilen rot gestielt, breitgestellt, weiss, fein zerschlitzt, mehr als 6 cm im Durchmesser haltend, in langen, lockeren, aufrechten, achselständigen, 6—8 blütigen Trauben. NW.-China, bis 4 m, V.	2.50	22.50	—
» **Wilsonii** *Rehd.* (E. racemosa Wilsoni *Rehd.*) . . . . Form mit grossen B. und überaus üppigem Blütenreichtum reinweisser Blütenstände bei aufrechtem, dichtem Wachstum.	2.50	22.50	—
grandiflora *Hook.* (E. racemosa *Rehd.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, breitwachsend, B. blaugrau, Blütentrauben aufrecht, gross, weiss. Ostchina, bis 4 m, IV—V.	2.—	18.—	—
Korolkowii *Lav.* . . . . Strauch, laubabwerfend, von dichtem, straffem Wuchs, B. besonders blaugrau, Blütenstände achselständig, ebenfalls straff, Bl. weiss. China, bis 2 m, V.	2.—	—	—
Fabiana — Pitzguinstrauch — **Solanaceae.**			
imbricata *R. & P.* Δ # ʌ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, breitwachsend, heideartig, B. dachziegelartig, Bl. einzeln, endständig, langröhrig, weiss. Chile, bis 1 m, VI.	1.50	—	—
Fagus — Rotbuche, Buche — **Fagaceae.**			
ferruginea *Ait.* (F. americana *Sweet.*) Ø . . . . 120—150 cm hoch	4.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	—	—
Baum, laubabwerfend, B. bis 14 cm lang und bis 6 cm breit, seicht ausgeschweift gesägt, Borke sehr hellgrau, Herbstfärbung schön rot, im Winter auffällig durch das helle Holz. Kanada, Florida, bis 30 m.			
orientalis *Lipsky* (F. macrophylla *Koidz.*) Ø . . . . . 200—250 cm hoch	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 200—250 cm	6.—	50.—	—
Baum, laubabwerfend, raschwüchsig, Wuchs schmal pyramidal, B. grösser und fester als die der F. silvatica, fast ganzrandig, leicht gewellt. Herbstfärbung schön gelb. Kleinasien, Kaukasus, bis 40 m.			
Sieboldi *Endl.* . . . . 150—200 cm hoch	6.—	—	—
200—250 » »	7.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
Baum, laubabwerfend, Krone rundlich, hellrindig, B. spitzoval, kerbig, in der Jugend seidig behaart, am breitesten vor der Mitte. Japan, bis 30 m.			
silvatica argenteo-marginata *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	7.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 200—250 cm	6.—	50.—	—
Form der heimischen Rotbuche mit weissbunten B.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fagus (Fortsetzung):			
silvatica asplenifolia *Lodd.* ⊥			
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 200—250 cm	6.—	50.—	—
Form der heimischen Rotbuche mit sehr feinen, tiefgeschlitzten B. von saftig dunkelgrüner Färbung. Im Austrieb besonders auffallend. Bildet prächtige breitrunde Kronen.			
» **cristata** *Hort.* . . . . 120—150 cm hoch	4.—	—	—
150—200 » »	5.—	—	—
200—250 » »	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	—	—
Form der heimischen Rotbuche mit kleinen B., stark gezähnt, büschelweis hahnenkammartig zusammenstehend, eigentümlich gekrümmt.			
(PA) » **Dawyckii** *Hesse*, Pyramidenbuche ⊥ . . . . 150—200 cm hoch	5.—	—	—
200—250 » »	8.—	—	—
300—350 » »	10.—	90.—	—
Solitär-Pyramiden 500—600 » »	40.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 250—300 cm	6.—	50.—	—
Form der heimischen Rotbuche von straff säulenartig pyramidalem Wuchs, B. gross, glänzend dunkelgrün, junge Triebe anfangs überhängend, später sich vollkommen straff aufrichtend.			
» **grandidentata** *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	8.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 200—250 cm	6.—	50.—	—
Form der heimischen Rotbuche mit grossen, eckigen, ausgeschnittenen Zähnen.			
» **heterophylla** *Lodd.* . . . . 120—150 cm hoch	5.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 200—250 cm	6.—	50.—	—
Form der heimischen Rotbuche mit mehr oder weniger tief geschlitzten, oft ganz schmalen, ganzrandigen B. von hellgrüner Färbung.			
(PA) » **horizontalis** *Hort. monac.* Neueinführung! △			
Höhe bis zur Krone 100—120 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	—	—
» » » » 100—120 » 8—10 » »	7.—	—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	8.—	70.—	—
Form der heimischen Rotbuche mit waagerecht abstehenden, oder über den Erdboden ausgebreiteten Ästen und Zweigen.			
» **purpurea** *Ait.* Blutbuche . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	6.—	—	—
Form der heimischen Rotbuche mit tiefbraunroten B., die bei üppigem Stand einen schwärzlichen oder bläulichen Schein haben. In Schattenlagen und nach Neupflanzung oft weniger gefärbt.			
» » **macrophylla** *Hort.* (Swat Margret.) . . . . . 120—150 cm hoch	4.—	35.—	300.—
150—200 » »	5.—	45.—	400.—
200—250 » »	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	55.—	500.—
» » » » 160—180 » 6—8 » »	7.—	60.—	550.—
» » » » 180—200 » 6—8 » »	8.—	70.—	650.—
» » » » 160—180 » 8—10 » »	8.—	70.—	650.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	10.—	90.—	800.—
Form der Blutbuche mit besonders grossen, intensiv schwarzroten B. Treibt sehr früh aus.			
» » **major** *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	6.—	50.—	—
300—350 » »	10.—	90.—	—
Höhe bis zur Krone 80—120 cm, ganze Höhe 200—250 cm	5.—	45.—	400.—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 6—8 cm Umfang	7.—	60.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	10.—	90.—	—
Form der Blutbuche mit grossen, tief dunkelroten B.			
» » **roseo-marginata** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	3.—	—	—
150—200 » »	5.—	45.—	—
200—250 » »	6.—	50.—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	50.—	—
Form der Blutbuche mit roten B. und rosa Rand. Blattform meist unregelmässig.			
» **quercifolia** *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch	4.—	—	—
100—120 » »	5.—	—	—
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 100—120 cm	6.—	50.—	—
Form der heimischen Rotbuche mit eichenähnlichem Blattrand, kleinblättrig, dunkelgrün und schön regelmässig ausgebildet.			
» **quercina** *Sichrow* . . . . 200—250 cm hoch	6.—	—	—
Form der heimischen Rotbuche mit an Eichen erinnernden B., oft stark fast zur Mittelrippe eingebuchtet, B. daher sehr unregelmässig gestaltet.			
» **Rohani** *Koerber* ∅ . . . . 150—200 cm hoch	5.—	—	—
200—250 » »	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 80—120 cm, ganze Höhe 150—200 cm	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm, 8—10 cm Umfang	7.—	—	—
Form der heimischen Rotbuche mit B. in der Form wie bei F. silv. quercifolia, nur etwas schmäler im Durchschnitt, u. von prächtig dunkelroter Färbung, die im Herbst ins Braungrün der Blutbuche übergeht.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fagus (Fortsetzung):			
silvatica Zlatia *Schneid.* Serbische Goldbuche . . . . 150—200 cm hoch	5.—	—	—
200—250 » »	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm, ganze Höhe 200—250 cm	6.—	50.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 12—14 cm Umfang	10.—	90.—	—
Form der heimischen Rotbuche mit prächtig goldgelben B. sowohl beim Frühjahrsaustrieb als auch beim Johannistrieb, allmählich in ein gelbliches Hellgrün übergehend.			
Fatshedera — Aralia × Hedera — Araliaceae.			
Lizei (Hedera Helix hibernica × Aralia Moseri) ◑ ⌗ Λ . . . **m. Tb.**	2.50	—	—
Strauch, immergrün, ähnlich Aralia Moseri in der Blattform, aber mehr locker und fast efeuartig kletternd, Triebspitzen zimtbraun, B. kleiner als bei Aralia Moseri.			
Fontanesia — Fontanesie — Oleaceae.			
Fortunei *Carr.*	1.—	—	—
Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, B. glänzend dunkelgrün, gegen- oder zu 3 wirtelständig, bis 10 cm lang, 2 cm breit, mit langer, scharfer, sichelförmiger Spitze, Bl. weiss, rosa angehaucht, in lockeren, traubenartigen Blütenständen. China, bis 5 m, V—VI.			
phillyreoides *Labill.* (F. angustifolia *Dipp.*)	—.80	7.—	60.—
Strauch, laubabwerfend, dicht sparrig wachsend, B. ovallanzettlich, rauh gezähnelt, graugrün, Bl. in vielblütigen, büschelartigen Scheindolden, weiss. Syrien, Nordchina, bis 1,5 m, VI.			
Forestiera — Forestiere — Oleaceae.			
acuminata *Poir.* (Adelia acuminata *Mchx.*) Zugespitzte Forestiere **m. Tb.**	1.—	—	—
Strauch, laubabwerfend, langsam wachsend, B. lanzettlich, scharf zugespitzt, dunkelgrün, Bl. unscheinbar, grünlichgelb, Fr. tiefrot. Amerika, bis 3 m, IV—V.			
neo-mexicana *A. Gr.* (F. acuminata parvifolia *Gray.*, Adelia parvifol. *Cov.*) Δ	1.—	—	—
Strauch, laubabwerfend, sparrig, dornig, B. verkehrt eilanzettlich, stumpf graugrün, Bl. unscheinbar, gelblich, Fr. blauschwarz, beerenartig. Amerika, bis 3 m, IV—V.			
Forsythia — Goldglöckchen — Oleaceae.			
europaea *Deg. & Bald.*	—.70	6.—	55.—
Strauch, laubabwerfend, von mittlerem, gedrehtem Wuchs, sehr verzweigt, dicken, etwas lederartigen B., Bl. schwefelgelb. Albanien, bis 2 m, V.			
intermedia *Zbl.* (F. suspensa × viridissima) . . . . Sträucher	—.70	6.—	55.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.20	—	—
Hybride, schön aufrechtwachsend, B. ähnlich F. europaea, Bl. lichtgelb. Bis 2 m, V.			
» **densiflora** *Koehne*	—.70	6.—	55.—
Form mit grossen, hellgelben Bl. in dichten Büscheln vereinigt, sehr reichblühend, Blütenblatt kürzer und breiter als bei F. interm. vitellina, daher von gedrungenerem Aussehen.			
» **primulina** *Rehd.* . . . . Sträucher	—.70	6.—	55.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.20	—	—
Form mit sehr gedrängtstehenden Bl. von eigenartig stumpfprimelgelber Farbe, auffallend.			
» **spectabilis** *Koehne*	—.70	6.—	55.—
Form von ziemlich sparrigem Wuchs, ausserordentlich reichblühend, mit grossen, schön dunkelgoldgelben Bl.			
» **vitellina** *Koehne* . . . . Sträucher	—.70	6.—	55.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.20	—	—
Form, kräftig aufrechtwachsend, mit reichem Blütenflor, grosser, dottergelber Bl., locker aber gleichmässig am ganzen Zweig entlang.			
ovata *Nakai.* Neueinführung! Δ	1.20	11.—	—
Strauch, laubabwerfend, von breitem Wuchs, B. meist breit eiförmig, nur leicht gesägt, Bl. bernsteingelb, allerfrüheste der Gattung. Korea, bis 1,5 m, IV.			
suspensa *Vahl*	—.80	7.—	60.—
Strauch, laubabwerfend, üppig, mit überhängenden Zweigen und oft dreizähligen B., Bl. trichterig glockig, hellgelb, innen gelbrot gestreift. China, bis 2 m, IV.			
» **Fortunei** *Rehd.*	—.80	—	—
Form von üppigem, aufrechtem Wuchs mit leicht überhängenden oder ausgebreiteten Zweigen. Bl. dunkler gelb als die der Art, ebenfalls Röhre innen dunkelgelb gestreift. Bis 2 m, IV.			
» » **atrocaulis** *Rehd.*	—.80	7.—	—
Form, die sich von F. susp. Fortunei unterscheidet durch das schwarzrote, junge Holz und durch schmälere, rot austreibende Belaubung.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Forsythia (Fortsetzung):			
suspensa Fortunei aurea *Koehne*	—.80	7.—	—
Form mit gelblicher Belaubung.			
» **Sieboldi** *Zbl.* △ ⌀	—.80	7.—	—
Form von niedrigerem Wuchs, von Jugend an hängend bis niederliegend, Laub tiefgrün, Bl. hellgelb, Röhre innen dunkelgelb gestreift, Herbstfärbung prachtvoll schwärzlichbraun mit violettem Schein. Bis 2 m, IV.			
viridissima *Ldl.* ● ⌀ ∧	—.80	7.—	60.—
Strauch, laubabwerfend, stets aufrechtwachsend, B. länglich lanzettlich, gesägt, stets einfach, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, Bl. satt dunkelgelb, Herbstfärbung sehr schön violett. Bis 2 m, IV.			
Fothergilla — Hamamelidaceae.			
alnifolia *L. fil.* (F. Gardenii *Murr.*) △ ⌀ . . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
Strauch, laubabwerfend, ausläufertreibend, mit ovalen dunkelgraugrünen B., an Erlen erinnernd, Bl. weiss, kurz nach Ausbruch der B., in rundlichen, bis 3,5 cm hohen, köpfchenartigen Ähren. Amerika, bis 1 m, IV.			
major *Lodd.* ○ ◑ ⌀ . . . . mit Ballen	2.50	22.50	200.—
Strauch, laubabwerfend, von aufrechtem, dichtem Wuchs, ausläufertreibend, B. breitoval oder herzeiförmig, unterseits blaugrau, Herbstfärbung schön gelbrot bis sattgelb, Bl. mit dem Austrieb der Blätter an Kurztrieben, in aufrechtstehenden, 4—8 cm langen, weissen, köpfchenartigen Blütenähren, stark nach Honig duftend. Amerika, bis 2 m, V.			
monticola *Ashe.* . . . . mit Ballen	3.—	27.—	—
Strauch, laubabwerfend, von breitgehendem Wuchs, B. unterseits grün, sonst ähnlich denen von F. major, Blütenähren weiss, bis 6 cm hoch. Amerika, bis 2 m, V.			
Fraxinus — Esche — Oleaceae.			
americana *L.* (Fr. alba *Marsh.*) Weissesche ⌀ . . . . 200—250 cm hoch	1.50	13.50	—
Baum, laubabwerfend, mit eiförmiger Krone, B. lichtgrün, Fieder meist 7, Herbstfärbung schön purpurn und gelb. Amerika, bis 40 m.			
» **acuminata** *Wesm.* (Fr. americana glauca *Hort.*)			
Höhe bis zur Krone ca. 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
» » » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
Form mit derberen B., gross, ganzrandig, lang zugespitzte Blättchen, oberseits meist glänzend blaugrün, unterseits fast weisslich.			
excelsior *L.* Gemeine Esche ☡ . . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.20	11.—	100.—
» 8—10 » »	1.50	13.50	125.—
» 10—12 » »	2.—	18.—	—
Baum, laubabwerfend, sehr starkwachsend, mit dicken, schwarzen Knospen, meist 11 Fiederblättchen. Europa, bis 40 m.			
» **aurea** *Pers.* Goldesche ⌀ . . . . 80—100 cm hoch	1.20	—	—
150—200 » »	1.75	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
» » » » ca. 250 » 16—18 » »	5.—	45.—	—
» » » » ca. 250 » 20—22 » »	8.—	—	—
Form mit hellgelbgrüner Blattfarbe, lebhaft gelber Herbstfärbung und gelbem Winterholz, wovon die dicken, schwarzen Knospen sehr lebhaft abstechen. Sonst wie die Art.			
» **globosa** *Hort.* Kugelesche			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	300.—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
» » » » 180—200 » 18—20 » »	8.—	—	—
Form mit dicht geschlossenem, kugeligem Kronenbau, schwachwüchsig und mit etwas kleineren Fiederblättchen, schön dunkelgrün. Wertvoll für Vogelschutz als Nistgehölz sowie als Alleebaum für enge Strassen.			
(M) » **Hessei** *Hort. Hesse* Hesse's Einblattesche . . . . Neu!			
☛ *Siehe* Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Bildtafel! » » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
Form von sehr kräftigem Wuchs. Die straffen Triebe erinnern an Pappeln, zumal auch das einfache, glänzend dunkelgrüne Blatt fast einem Pappel- oder Syringenblatt ähnelt.			
» **heterophylla** *Hort.* . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
Form mit stark verschmälerten Fiederblättchen und im ganzen kleineren B von stumpfgrüner Farbe.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fraxinus (Fortsetzung):			
longicuspis *Sieb. & Zucc.* . . . . 200—250 cm hoch	1.50	—	—
Baum oder Strauch, laubabwerfend, mit langgestielten, bis 30 cm langen B., rostig behaarten Knospen, Bl. in end- und seitenständigen Rispen, alabasterweiss, Herbstfärbung purpurn. Japan, bis 12 m, V.—VI.			
mandschurica *Rpr.* . . . . Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	27.50	—
» 12—14 » »	3.50	33.—	—
Baum, laubabwerfend, mit bis 50 cm langen B, und auffallend langen Fiederblättchen, oberseits tiefgrün, unterseits hellgrün, Bl. vor oder mit Laubaustrieb. Nordostasien, bis 30 m.			
monophylla *Desf.* (Fr. exc. diversifolia *Ait.*) Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
Form der gemeinen Esche mit teils einfachen, teils mehr gelappten B., dann an Ebereschen erinnernd.			
oregona pulverulenta *Dieck* . . . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
Form der westamerikanischen Esche mit schön weissbestäubten B.			
Ornus *L.* Gemeine Blumenesche, Manna-Esche 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	4.—	36.—	—
Baum, laubabwerfend, rundkronig, mit nussähnlichen B., Bl. in grossen, flachen, weissen Rispen, duftend. Herbstfärbung schön rot. Die den Bl. folgenden Fruchtstände ebenfalls zierend. Südeuropa, Orient, bis 8 m, V—VI.			
» **globosa** *Hort.* **NEU!** Kugel-Blumenesche. Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.50	33.—	—
Form der Manna-Esche mit dichtem, kugeligem Kronenbau. Als Alleebaum für enge Strassen bewährt.			
» **rotundifolia** *Hort.* . Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.50	33.—	—
Form mit breiteren, daher rundlicheren Fiederblättchen und schwächerem, mehr strauchigem Wuchs.			
Paxiana *Lingelsh.* . . . . 80—100 cm hoch	2.—	18.—	160.—
Siehe Bildtafel! 120—150 » »	2.50	22.50	—
Baum, laubabwerfend, ziemlich kurztriebig, der Manna-Esche nahestehend, B. dunkler grün, Fiederblättchen schmäler und zahlreicher. Bl. sehr zahlreich in grossen, flachen, weithin duftenden, weissen Blütenständen, gefolgt von grossen Fruchtständen schön grüner Flügelsamen. China, bis 20 m, VI.			
potamophila *Herd.* (F. Regelii Dipp.) Uferesche . . . 200—250 cm hoch	2.—	18.—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
Baum, laubabwerfend, mit kahlen Zweigen, braunen Knospen, etwa 30 cm langen, graugrünen B., Bl. vor oder mit Laubaustrieb. Ostturkestan, bis 10 m.			
sambucifolia *Lam.* (Fr. nigra *March*). . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
Baum, laubabwerfend, von stattlicher Erscheinung, B. sehr gross, tiefgrün, leicht gelbfilzig behaart am Grunde der Blättchen, Winterknospen dunkelbraun, Holz auffallend dunkel. Schwarzesche. Bl. vor oder mit Laubaustrieb. Amerika, bis 25 m.			
Washingtoni *Hort.* (Fr. oregona *Nutt.*) . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
Baum, laubabwerfend, von kräftigem Wuchs, mit ausgebreiteter Krone, B. schön gross, dunkelgrün, Blattstiele und Adern filzig behaart. Bl. vor oder mit Laubaustrieb. Kalifornien, bis 25 m.			
Fuchsia, siehe unter „Stauden".			
Garrya — Becherkätzchen — Garryaceae.			
Fadyenii *Hook.* ● # ∧ . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch	2.—	—	—
Strauch, immergrün, B. gegenständig, einfach, lederig, ganzrandig, oberseits stark glänzend, unterseits graufilzig, Bl. achselständig, einzeln oder zu dreien, Fr. beerenartig. Westindien, bis 4 m, IV—V.			
Gaultheria — Scheinbeere — Ericaceae.			
procumbens *L.* Niederliegende Scheinbeere ◑ ● △ # . . mit Ballen	1.—	9.—	80.—
Kleiner, immergrüner, auf und unter der Erde kriechender Strauch für Unterpflanzung und Bodenbegrünung. B. 5×3 cm, dunkel- bis rötlichgrün, Beeren rot, von aromatischem Geschmack. Liebt frischen, anmoorigen Standort. Alaska bis Kalifornien, 30, VI.			

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Gaultheria (Fortsetzung):			
Shallon *Pursh.* ◑ # ❀ . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, kriechend und ausläufertreibend, B. pergamentartig, lederig, bis 8 cm lang, 5 cm breit, freudiggrün, Bl. weisslichrosa, in vielblütigen Trauben, Fr. dunkelpurpurn, später blauschwarz, wohlschmeckend. Westnordamerika, bis 50 cm, V—VI.	2.—	—	—
Genista — Ginster — Leguminosae. # Siehe auch unter „Cytisus".			
anxantica *Ten.* (G. tinctoria anxantica *Fiori*) △ . . . . **m. Tb.** Form des Färberginsters von niedrigerem Wuchs, ganz kahl, mit wenigen, schmalelliptischen B., Zweige gerieft, mehr an einen niedrigen G. praecox erinnernd, Bl. gelb. Italien, bis 50, V—VI.	2.—	18.—	—
Dallimorei *Hort.* (Cytisus Dallimorei *Rolfe.*) . . . . **m. Tb.** Hybride (Cytisus multiflorus × Genista scoparia Andreana), in Tracht ähnlich G. scoparia, Bl. karminrot von guter Grösse, von allen übrigen Gartenformen gut verschieden, Fahne rosa, Flügel an den Spitzen tiefkarmin. V—VI.	2.—	18.—	—
dalmatica *Bartl.* (G. silvestris pungens *Vis*) Teppichginster ○○ △ **m. Tb.** Strauch, fein verzweigt, B. seidig behaart, Zweige leicht dornspitzig, Bl. hellgoldgelb, leicht duftend. Mittel- und Südeuropa, 15—20, VI—VIII.	2.—	—	—
germanica *L* Gemeiner Stechginster . . . . Strauch mit dornigen Zweigen, B. einfach, dunkelgrün, bis 2 cm lang, zottig behaart, Triebe ebenfalls, Bl. gelb, in traubigen Blütenständen. Europa, bis 50, VI VII.	1.—	—	—
hispanica *L* ○ △ . . . . **m. Tb.** Strauch, dicht verzweigt, stark dornig, an niedrigen Ulex erinnernd, Bl. gelb in endständigen, mehrblütigen Köpfchen. Südeuropa, bis 30, VI—VII.	1.—	9.—	80.—
horrida *DC* ○ △ . . . . **m. Tb.** Strauch mit stark dornigen, graugrünen Zweigen, Bl. gelb. Südfrankreich, bis 20, VI—VIII.	1.50	13.50	—
humifusa *Wulf.* ○ △ [K] . . . . **m. Tb.** Strauch, von niederliegendem Wuchs, B. lanzettlich, Bl. gelb. IV—VI.	2.—	—	—
hybrida Dorothy Walpole [K] . . . . **m. Tb.** Hybride von ganz eigenartiger Blütenfarbe. Fahne tiefsamtig karminrot, Schiffchen reinrosa, sehr reichblühend, bis 1,5 m, VI—VII.	2.—	18.—	—
pilosa *L.* △ . . . . **m. Tb.** Strauch, niederliegend, wurzelnd, B. klein, unterseits behaart, Bl. behaart, gelb. Europa, V—VI.	1.—	9.—	80.—
praecox *Hort.* (Cytisus praecox *Bean*) (C. multiflorus × purgans) △ ✂ **m. Tb.** Hybride, meist etwas überhängend, B spärlich, seidig behaart, Bl. in grosser Fülle, schwefelgelb, klein. Bis 2 m, IV—V.	1.50	13.50	120.—
» **alba** *Hort.* (Cytisus praecox albus *Smith.*) △ ✂ . . . . . . **m. Tb.** Form mit reinweissen Bl., Wuchs etwas niedriger als G. praecox.	1.50	13.50	120.—
radiata *Scop.* Strahlenginster ○ △ . . . . **m. Tb.** Strauch, graugrün, von sparrig verzweigtem, dicht breit-kugeligem Wuchs, Bl. gelb in mehrblütigen Köpfchen am diesjährigen Holz. Südalpen, bis 50, VI.	1.50	13.50	—
sagittalis *L.* Pfeilginster △ . . . . **m. Tb.** Strauch, mit eigenartig pfeilförmig geflügelten, frischgrünen Zweigen, Bl. klein, lebhaft gelb. Europa, bis 20, V—VI.	1.—	9.—	80.—
scoparia *Wall.* (Sarothamnus sc. *Wimm.*, Cytisus sc. *Lk.*) ✂ . . . . **m. Tb.**	—.60	5.—	40.—
mit Ballen Strauch, aufrecht, rutenförmig, dunkelgrün, Bl. einzeln, achselständig, ziemlich gross, zahlreich, lebhaft gelb. Besenginster. Europa, bis 2 m, V—VI.	—.70	6.—	50.—
» **Andreana** *Dipp.* . . . . **m. Tb.** Form mit goldgelben Bl. und glühend dunkelpurpur gefärbten Flügeln.	2.—	18.—	—
» » **compacta** *Hort.* △ . . . . **m. Tb.** Unterform von besonders dichtem, niedrigem Wuchs, Blütenfarbe wie G. scop. Andreana.	2.—	18.—	—
» » **pendula** *Hort.* △ . . . . **m. Tb.** Unterform mit schön überhängendem Wuchs, Blütenfarbe wie G. scop. Andreana.	2.—	18.—	—
» **Butterfly** *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form mit gelber Bl., dunklem Grunde, Fahne hellgelb.	2.—	18.—	—
» **Donard Seedling** *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form mit eigentümlich gefärbten Bl., eine Mischung von Weiss, Kirschrot, Rot und Gelb.	2.—	18.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Genista (Fortsetzung):			
scoparia Firefly *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form mit granatroten Bl., gelb gerandet, Fahne mit schwach Granatrot verwaschen, Kelch purpurn.	2.—	—	—
» **fulgens** *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form in Tracht mehr nach G. praecox gehend, Bl. rötlichgelb.	2.—	—	—
» **Lord Lambourne** *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form von schön überhängendem Wuchs, Bl. mit leuchtend scharlachroten Flügeln, Fahne primelgelb, Rückseite rosa.	2.—	18.—	—
» **Mayfly** *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form mit Bl., deren Flügel mit Granatrot verwaschen sind. Fahne satt kanariengelb, Schiffchen hängend, ebenfalls kanariengelb.	2.—	18.—	—
» **stricta** *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form von besonders straff aufrechtem Wuchs, Bl. leuchtend gelb.	—.80	7.—	60.—
thyrsiflora *Hort.* (**G. tinctoria elatior** *Hort.*) △ . . . . **m. Tb.** Form des Färberginsters von straff aufrechtem Wuchs mit besonders grossen Blütenständen von schön gelben Bl. Bis 2 m, VI—VII.	—.80	7.—	60.—
tinctoria *L.* **Färberginster** △ . . . . mit Ballen Strauch, schön grün belaubt, mit verzweigten, goldgelben Blütentrauben. Europa, bis 1 m, VI—VIII.	—.80	7.—	60.—
» **plena** *Hort.* △ . . . . **m. Tb.** Form des Färberginsters von niedrigem Wuchs, Bl. leuchtend goldgelb, schön gefüllt und von langer Blühdauer. 30, VI—VII.	1.—	9.—	—
Villarsii *Clem.* (G. pulchella *Vis.*) △ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, niederliegend, polsterig, mit grauen, dornigen Zweigchen, Bl. gelb. Östl. Mittelmeergebiet, 15, V—VI.	2.—	18.—	—
Gleditschia — Gleditschie — Leguminosae.			
horrida *Willd.* (Gl. sinensis *Lam.*) . . . . 200—250 cm hoch Baum, laubabwerfend, mit hellgrünem Holz, Dorne sehr breitkonisch, hellgrün, dreiteilig, B. gelbgrün, Fiederchen kerbsägig. Ostchina, bis 15 m, VI—VII.	2.—	—	—
japonica *Miqu.* (Gl. horrida *Mak.*) . . . . 150—200 cm hoch Baum, laubabwerfend, mit dunklem Holz, Dorne lang, dünn, dunkelgrün, Austrieb rötlich, B. frischgrün, glatt, Fiederchen ganzrandig. Japan, China, bis 20 m, VI—VII.	1.—	9.—	—
texana *Sarg.* (Gl. triacanthos × aquatica) . . . mit Ballen 50—70 cm hoch Hybride, B. sehr fein, schön leuchtend, glänzendgrün, Fruchthülsen gerade, 10—12 cm lang. Texas.	1.50	—	—
triacanthos *L.* **Christusdorn** . . . . Sträucher 150—200 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Baum, laubabwerfend, mit lichter, breiter Krone, B. einfach oder doppelt gefiedert, — Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
» 10—12 » »	4.—	36.—	—
bis 20 cm lang, lebhaft grün, Zweige, Äste, und Stamm besetzt mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen. O.-Nordamerika, bis 45 m, VI.			
Glycine, siehe Wistaria unter „Schlingpflanzen".			
Halesia — Silberglocke — Styracaceae.			
tetraptera *Ellis.* (H. carolina *L.*) Maiglöckchenbaum . . . . Strauch oder kleiner Baum, laubabwerfend, B. dicklich, lichtgrün, spitzoval, Bl. glockig, weiss, Fr. hellgrün, vierflügelig. ON-Amerika, bis 5 m, V.	1.50	13.50	—
Halimodendron — Salzstrauch — Leguminosae.			
argenteum *Fisch.* (H. Halodendron *Voss.*) ∞ . . . . Strauch, laubabwerfend, B. und Zweige graugrün, stechend, Bl. hellviolett, doldentraubig am alten Holze, Fr. aufgeblasen, bräunlichgelb, an Colutea-Früchte erinnernd. Transkaukasien bis Turkestan, bis 2 m, VI—VII.	1.50	—	—
Hamamelis — Zaubernuss — Hamamelidaceae.			
japonica *Sieb. & Zucc.* (H. arborea *Mast.*) Winterblüher . . . . Strauch, baumartig, laubabwerfend, Äste breit ausladend, B. an Hasel oder Erlen erinnernd, Bl. entlang der Zweige in achselständigen goldgelben, dichten Büscheln, Kelch innen purpurn, Blütenblätter schmal bandartig. Herbstfärbung lebhaft gelb. Japan, bis 8 m, I—III.	3.—	27.—	—
® » **rubra** *Hesse* (H. jap. flavo-purpurascens *Rehd.*, H. incarnata *Matt.*) . Form mit sehr schön karminroter, bandartiger Färbung auf den gelben, gewellten Blütenfahnen. Feurige Färbung. Winterblüher.	3.—	27.—	—
» **Zuccariniana** *Hort.* Winterblüher . . . . Form mit schwefelgelben Bl. in lockerer Anordnung als bei der Art.	3.—	—	—

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hamamelis (Fortsetzung):			
mollis *Oliv.* Winterblüher . . . . . Strauch, baumartig, laubabwerfend, B. gross, oberseits graugrün behaart, unterseits graufilzig, Bl. lebhaft gelb, die grössten der Gattung und von angenehmem Duft. Von langsamem Wuchs. China, bis 8 m, I—III.	4.—	36.—	—
vernalis *Sarg.* Winterblüher . . . . . Strauch von dichtem, rundlichem Wuchs, Zweige und B. zottig behaart, Bl. klein, sternartig, sitzend, gelbgrün, Kelch innen weinrot, gut duftend. Amerika, bis 2 m, I—III.	3.—	—	—
virginica *Hort.* (H. virginiana *L.*) Herbstblüher . . . . . Strauch, laubabwerfend, auch baumartig, B. an Haselnuss erinnernd, Bl. hellgelb, Kelch innen bräunlich. Herbstfärbung gelb. ON-Amerika, bis 6 m, IX—XI.	1.50	13.50	—
Hedera, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Hedysarum — Hahnenkopf — **Leguminosae.**			
alpinum *Willd.* (H. sibiricum *Poir.*) ♃ . . . . . **m. Tb.** Halbstrauch oder mehr Staude, von aufrechtem Wuchs, Fiederblättchen länglich-lanzettlich, unterseits behaart, Bl. rot, in langen Trauben. Altai, Dahurien, 20—40, VI—VII.	1.50	13.50	—
multijugum *Maxim.* ∞ . . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, breit überhängend bezweigt, Fiederblättchen wechselständig, graugrün, unterseits dicht seidenhaarig, Blütentrauben achselständig, karminpurpurn, bis 25 cm lang. Mongolei, bis 1,5 m, VI—VIII.	1.50	—	—
obscurum neglectum . . . . . **m. Tb.** Halbstrauch oder Staude, ausläuferbildend, Blättchen stachelspitzig, Bl. langgestielt, nickend, violett oder weiss in lockerer Traube. Nördliche gemässigte Zone, 20—60, VII—VIII.	1.50	—	—
Helianthemum, siehe unter „Stauden".			
Helwingia — **Cornaceae.**			
rusciflora *Willd.* (H. japonica *Dietr.*) △ . . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, B. klein, tiefgrün, Bl. grünlichweiss, etwa in Blattmitte auf der Mittelrippe, Fr. schwarz. China, Japan, bis 1,5 m, VI.	1.—	—	—
Hibiscus — Eibisch — **Malvaceae.** Strauch, laubabwerfend, B. schön gelappt, dunkelgrün, Bl. trichterig, glockig, bis 6 cm Durchmesser. Verlangt guten, durchlässigen, etwas feuchten Boden in sonniger, warmer Lage. In der Jugend etwas Winterschutz. Wegen der späten Bl. wertvoll. Indien, China, bis 3 m, VIII—X.			
syriacus-Hybriden in den Sorten:			
Admiral Dewey, gefüllt, reinweiss	1.50	13.50	—
albus plenus, gefüllt, reinweiss	1.50	—	—
bicolor hybridus, gefüllt, weiss, mit purpurrotem Fleck im Grunde .	1.50	—	—
coelestis, einfach, blau	1.50	—	—
Comtesse de Flandre, gefüllt, dunkel karmesinrot	1.50	—	—
Duchesse de Brabant, stark gefüllt, dunkelrot	1.50	—	—
Jeanne d'Arc, gefüllt, weiss mit Hellrosa	1.50	—	—
Odens, gefüllt, violettrosa	1.50	—	—
puniceus plenus, halbgefüllt, dunkelrosa	1.50	—	—
roseus plenus, gefüllt, rosa	1.50	—	—
Rubin, einfach, dunkelste der Roten	1.50	13.50	—
Snowdrift, reinweiss, sehr gross, einfach	1.50	13.50	—
Souvenir de Charles Breton, halbgefüllt, violett	1.50	—	—
totus albus, einfach, weiss, sehr gross, früh	1.50	13.50	—
Hippophaë — Sanddorn, See-Kreuzdorn — **Elaeagnaceae.**			
rhamnoides *L.* ♣ □ . . . . . Strauch, laubabwerfend, dornig, B. schmallanzettlich, beiderseits silberglänzend, Bl. unauffällig grünlich, Fr. an weiblichen Pflanzen sehr wirkungsvoll orangefarben, rundlich, beerenartig. SO-Europa, Orient, Sibirien, bis 5 m, III—IV.	—.80	7.—	—
Holodiscus, siehe Spiraea ariaefolia.			
Hovenia — Fruchtbaum — **Rhamnaceae.**			
dulcis *Thbg.* ⋀ . . . . . mit Ballen. Strauch, laubabwerfend, B. langgestielt, breit eiförmig, gross, sattgrün, Bl. grünlich, unscheinbar, Fr. erbsengross, schmutzigweiss, bei uns kaum reifend, Fruchtstand fleischig, rötlich, essbar. Japan, China, bis 10 m, VI—VIII.	1.50	13.50	—

Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
altissima *Wall.* ∧ ⚘ . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, kletternd oder kriechend, wurzelnd, B. wellig, runzlig, ziemlich klein, frischgrün. Himalaja.	1.—	9.—	—
arborescens cordata *Pursh.* O ⚘ . . . . Form mit grossen, herzförmigen B., oberseits gelblichgrün, unterseits weisslich, Bl. gelblichweiss in grossen, platten Dolden, nur wenig sterile Randblüten.	1.—	—	—
» **grandiflora** *Rehd.* ⚘ . . . . Form mit nur sterilen, weissen Bl. in grossen Dolden, daher sehr zierend.	1.—	9.—	80.—
aspera *Don.* ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, B. länglich, scharf doppelt gesägt, unterseits weisslich filzig, Bl. in bis 16 cm grossen, flachen Dolden mit leuchtenden, leicht geröteten, weisslichen, sterilen Randblüten und lebhaft blauen, fertilen Mittelblüten. Himalaja, bis 2,5 m, VII—VIII.	1.50	—	—
hortensis Lindléyana *Hort.* (H. macrophylla rosea *Unger*) . . . . Form der Gartenhortensie, B. klein, teils gerötet, Blütenstände sehr schön und zahlreich, sterile Randblüten weiss, später in Rosa übergehend, verhältnismässig gross, innere fertile Bl. blau.	1.20	—	—
» **macrosepala** *Dipp.* . . . . Form mit weissen, sterilen Randblüten, innere Bl. der Dolde fertil und blau gefärbt.	1.20	—	—
» **Otaksa** *Hort.* . . . . Form mit mattgrünen B. und grossen, ballartigen Blütenständen nur steriler purpurrosa Bl.	1.20	11.—	—
» **Thomas Hogg** *Hort.* . . . . Form mit grossen, elliptischen B., Bl. in grossen, weissen Blütenständen.	1.50	—	—
macrophylla Domotoii *Hort.* . . . . Form mit schön dunkelgrünen B., Blütenstände ballartig, reinrosa.	1.50	—	—
opuloides acuminata *A. Gr.* ⚘ . . . . Form von straffem Wuchs, B. klein, gerötet, Blütenstände flach, zahlreich mit schönen, sterilen, rosa Randblüten, Mitte mit fertilen Bl. blau.	1.20	11.—	100.—
» **japonica Belzonii imperialis** *Hort.* . . . . Form mit sehr grossen, flachen Blütenständen mit porzellanblauen, sterilen Randblüten, Mitte mit fertilen, blauen Bl.	1.20	—	—
» **Otaksa** *C. S.* . . . . Form mit langen, grossen, glänzendgrünen B., Holz braun getupft, Bl. flach, sterile Randblüten wasserblau, fertile Bl. von gleicher Farbe.	1.20	11.—	—
» **stellata rubra** *Dipp.* ⚘ . . . . Form reichblühend mit flachen Blütenständen, Randblüten weisslichrosa und purpurn getönt, steril, Mittelblüten wunderbar leuchtend, tief purpurn.	1.20	—	—
paniculata grandiflora *Sieb.* ⚘ . . . . . . **Sträucher mit** 4—8 **Trieben**	—.90	8.—	70.—
Kronenbäumchen 40—60 **cm bis zur Krone**	1.—	9.—	—
» 60—80 » » » »	1.50	13.50	120.—
» 80—100 » » » »	2.50	22.50	200.—
» 100—120 » » » »	3.—	27.—	—
Strauch, laubabwerfend, Blütenstände pyramidal, nur sterile Bl., reinweiss, im Verblühen rosa. Blüht am diesjährigen Holze, alljährlich starker Rückschnitt ratsam. VII—IX.			
petiolaris, siehe unter „Schlingpflanzen".			
pubescens *Dcne.* . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige rotbraun, B. bis 20 cm lang, 10 cm breit, Bl. weiss in bis 15 cm breiten Scheindolden. Himalaja, bis 2 m, VII.	1.—	—	—
quercifolia *Bartr.* (H. platanifolia *Hort.*) ⚘ . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, breitbuschig, B. an Eichen oder Platanen erinnernd wegen der gelappten Blattränder, über 20 cm gross, dunkelgrün, im Herbst schön braun werdend, unterseits graufilzig. Bl. in 15 cm langen, vielästigen Rispen, weiss, schliesslich rötlich. Amerika, bis 1,5 m, VII—IX.	2.—	—	—
radiata *Walt.* (H. nivea *Mich.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, B. langgestielt, oval, unterseits weissfilzig, Blütenstände mit weisslichen, sterilen Randblüten und gelblichweissen, fertilen Mittelblüten. SW-Nordamerika, bis 2 m, VI—VII.	1.—	9.—	—
Sargentiana *Rehd.* ⚘ . . . . Strauch, laubabwerfend, B. sehr gross. dichtsamtig behaart, junges Holz dichtfilzig, Blütendolden flach, sehr gross, sterile Randblüten weiss, fertile Mittelblüten violett. Wegen der grossen B. windgeschützten Standort wählen! China bis 2 m, VII—VIII.	1.—	9.—	—
scandens, siehe unter „Schlingpflanzen".			
virens, siehe unter „Schlingpflanzen".			

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hydrangea (Fortsetzung):				
xanthoneura *Diels.*		1.—	9.—	80.—
Strauch, laubabwerfend, B. länglich-lanzettlich, Blütenstände zahlreich, flachdoldig, Randblüten steril, reinweiss. Mittelblüten locker gestellt, gelblichweiss. Rinde nicht abschülfernd, gelblichgrau oder graubraun. China, bis 5 m, VII.				
Hymenanthera — Hautanthere — Violaceae.				
crassifolia *Hook.* ○ △ ♗ ⌗ ∧	m. Tb.	1.—	9.—	—
Strauch, immergrün, dichtbuschig mit starrer Bezweigung, B. klein, ganzrandig, dunkelgrün, Bl. klein, achselständig, gelblichweiss, Fr. erbsengross, weisslich mit pflaumenblauem Hauch, in warmen Lagen auch als Einfassungs-Heckenpflanze verwendbar. Neuseeland, bis 1 m, IV—V.				
Hypericum — Hartheu, Johanniskraut — Hypericaceae.				
Weitere Arten und Formen siehe unter „Stauden".				
calycinum *L.* △ ⌗	mit Ballen	1.—	9.—	—
Strauch, immergrün, ausläufertreibend, B. stumpf eilänglich, sattgrün, 5—10 cm lang, Bl. gelb, einz., 7—8 cm Durchm. Orient, bis 30 cm, VII—IX.				
densiflorum *Pursh.*		—.80	—	—
Strauch, laubabwerfend, mit zweikantigen Trieben, B. lineal-lanzettlich, bis 5 cm lang, Bl. gelb, bis 1,5 cm Durchmesser in dichten Rispen. Nordamerika, bis 2 m, VII—IX.				
Moserianum *E. André*, (H. calycinum × patulum) ∧	mit Ballen	1.50	13.50	—
Hybride, in günstiger Lage wintergrün, B. stumpfoval, Bl. bis zu 5, goldgelb, bis 7 cm Dm. In rauhen Lagen Winterschutz! Bis 50 cm, VII—IX.				
patulum Forrestii *Forrest.*		1.50	—	—
Form mit sehr grossen Bl., sattgoldgelb. Starker Rückschnitt im Nachwinter erforderlich. Yunnan, VII—IX.				
Ilex — Hülse, Stechpalme — Aquifoliaceae ● ♗ ♗ ⌗ ♧ ♗				
Die immergrünen Arten und Formen werden mit festem Ballen geliefert.				
Aquifolium *L.*	60—80 cm hoch	2.50	22.50	200.—
Strauch, auch baumartig, immergrün, B. wechselständig, oval, mit stark dornigen Randzähnen, glänzend dunkelgrün, unterseits heller, Bl. weiss, duftend, gebüschelt, am alten Holz, Fr. erbsengross, leuchtendrot. Europa bis Asien, bis 10 m, V—VI.	80—100 » »	3.—	27.—	240.—
	100—125 » »	4.50	40.—	—
	125—150 » »	6.—	54.—	500.—
	150—180 » »	10.—	90.—	—
	200—250 » »	14.—	—	—
	250—300 » »	20.—	—	—
	350—400 » »	30.—	280.—	—
» **aureo-marginata** *Hort.*	50—70 » »	5.—	45.—	—
Form mit gelbgerandeten B.				
» **balearica** *Loes.*	80—100 » »	5.—	—	—
Form mit grossen, grünen B. von unregelmässiger Zähnung.	175—200 » »	14.—	—	—
	250—275 » »	20.—	—	—
» **calamistrata** *Goepp.*	40—60 » »	5.—	—	—
Form mit eiförmigen B., stachlig gezähnt, stark gebuchtet, mehr oder weniger stark zusammengerollt, trichterförmig gedreht.				
» **ferox** *Ait* (I. Aquif. echinata *DC.*)	20—30 cm hoch	3.—	—	—
Form mit grünen, mittelgrossen B., nicht nur am Rande, sondern auch auf der Blattfläche mit Stacheln besetzt, B. unregelmässig gewellt und verbogen.				
» **Foxii** *Moore*	60—80 cm hoch	4.—	—	—
Form mit schönen, dunkelgrünen, breitovalen B., ausgezeichnet durch üppigen Fruchtbehang auffallend grosser Beeren von leuchtend mennigroter Farbe.	175—200 » »	14.—	—	—
» **fructu luteo** *Hort.*	30—40 cm hoch	6.—	—	—
Form mit gelben Fr., sonst wie die Art.				
» **handsworthensis**, siehe I. spinosissima.				
» **heterophylla** *Ait.* (I. Aquif. Maboon *Hort. Hesse*)	60—80 cm hoch	5.—	—	—
Form mit stark gewellten B, oft stachellos, schön dunkelgrün.				
» » **Lawsoniana** *Loes.* (I. Aquif. Mahoon aureo-maculata *Hort. Hesse*)	20—30 cm hoch	4.—	—	—
	30—40 » »	5.—	—	—
Unterform mit gelbgefleckten, bunten B., etwas bestachelt.				
» **Hodginsii** *Hodg.*	150—175 cm hoch	12.—	—	—
Form mit stumpf dunkelgrünen, rundovalen, teils stachellosen B., von der Art gut unterschiedlich, Holz olivgrün, mit schönem, reichem Beerenansatz.				
» » **argenteo-variegata** *Hort*	30—40 cm hoch	5.—	45.—	—
Unterform mit rundovalen, silberberandeten B.				

	Höhe	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ilex (Fortsetzung):				
Aquifolium laurifolia *Kern.*	50—70 cm hoch	4.—	36.—	—
Form mit ganzrandigen, länglich-elliptischen, grünen, stachellosen B.	150—175 » »	12.—	—	—
	175—200 » »	14.—	—	—
	200—225 » »	16.—	—	—
» **longifolia argenteo-marginata** *Hort.* Form mit hübsch weiss gerandeten, schmalen B.	20—30 » »	3.—	27.—	—
» » **pyramidalis** *Hort.*	150—175 cm hoch	14.—	—	—
Form mit teils ganzrandigen, teils bestachelten B. von dicht pyramidalem Wuchs, zuverlässig überaus reich mit scharlachroten Beeren besetzt.	175—200 » »	16.—	—	—
» **Madame Briot** *Hort.* Form mit rundlichen, gelbbunten B., sehr schöne Erscheinung.	20—30 cm hoch	3.—	—	—
» **occidentalis platyphylloides** *Loes.* Form mit fast doppelt so grossen, leuchtend dunkelgrünen B. als die Art, etwas stachlig gezähnt, teils auch ganzrandig, wellig.	30—40 cm hoch	4.—	—	—
» **planifolia** *Hort. Hesse* Form ähnlich I. Aquifolium, B. aber ziemlich klein, oft fast ganzrandig, zumal an der unteren Hälfte des Blattes und an den Triebspitzen.	60—80 cm hoch	5.—	—	—
» **Watereriana** *Moore*	20—30 cm hoch	3.—	27.—	—
Form mit dunkelgrünen, kleinen B., die hellgrün gescheckt und unregelmässig gelblich gerandet und gezeichnet sind. Schwachwüchsig.	40—60 » »	5.—	—	—
cornuta *Ldl. & Paxt.* # ∧ . . . **m. Tb.** Strauch, dichtbuschig, immergrün, B. meist viereckig, vordere Ecken in starke Stacheln auslaufend, sonst nahe verwandt mit I. Aquifolium, Fr. gestielt, grösser als bei I. Aquifolium. Mittelostchina, bis 2 m, IV.	30—40 cm hoch	5.—	—	—
crenata *Thbg.* ◑ △ ♗ #	30—40 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Strauch, immergrün, etwas an dunkelgrünen Buchs erinnernd, B. ovalelliptisch, 1—3 cm lang, lederig, Blütenstände klein, grünlich, Fr. schwärzlich purpurn. In rauhen Lagen etwas Schutz. Japan, bis 2 m, V—VI.	40—50 » »	2.—	18.—	160.—
» **microphylla** *Rehd.* ◑ △ ♗ #	40—60 cm hoch	2.—	18.—	—
Form mit ganz kleinen, heller grünen Blättchen, an Lonicera nitida erinnernd.	60—80 » »	2.50	22.50	—
» **microphylla aurea-variegata** *Hort.* Unterform mit gelbbunten Blättchen.	15—20 cm hoch	1.—	9.—	—
Fargesii *Franch.* #	40—60 cm hoch	5.—	45.—	—
Strauch, immergrün, mit langen, schmalen, trübgrünen B., bis 15 cm lang, 2—4 cm breit, Bl. in Büscheln, Fr. kugelig, rot, in rauhem Klima Winterschutz! Westhupeh, bis 3 m, V—VI.	60—80 » »	7.—	—	—
glabra (*L.*) *Gray* (Prinos glaber *L.*) ◑ ● # Strauch, immergrün, B. dicht stumpf-eilanzettlich, oberseits glänzend frischgrün, unterseits heller, als Unterholz wertvoll, Fr. gestielt, schwarz. ON-Amerika, bis 1,5 m, VI.	30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
pedunculosa continentalis *Loes.* #	40—60 cm hoch	5.—	45.—	—
Strauch oder kleiner Baum, immergrün, einem Liguster nicht unähnlich, B. eielliptisch, kurz zugespitzt, glänzendgrün, bis 13 cm lang, Einzelbl. ca. 5 cm gestielt, weiss, einzeln in den Blattachseln, Fr. rot, langgestielt. Mittelchina, bis 10 m, VI.	80—100 » »	7.—	63.—	—
Perado *Ait.* #	100—120 cm hoch	6.—	—	—
Strauch oder Baum, immergrün, ähnlich I. Aquifolium, aber B. kurz dornzähnig, Bl. in den Blattachseln, Fr. schwarzrot. Kanaren, Azoren, bis 7 m, VI.	175—200 » »	14.—	—	—
⊛ **Pernyi** *Franch.* # . . . **m. Tb.** Strauch, in der Heimat auch Baum, immergrün, von dichtem Wuchs, B. kurz gestielt, glänzend frischgrün, oft fast viereckig, mit 1—3 starken Zahnpaaren, Blattspitze besonders derb und lang ausgezogen bestachelt, meist abwärts gebogen, Bl. gelblich in sitzenden Büscheln, Fr. rot, fast sitzend. Mittel-Westchina, bis 10 m, VII.	15—20 cm hoch	3.—	—	—
» **manipurensis** *Loes.* #	20—30 cm hoch	2.50	—	—
Form mit grösseren, mehr ovalen B. und kleinerem Spitzenstachel, 4—5 Seiten-Stachelpaare, Blattgrund rundlich.	40—60 » »	5.—	—	—
	100—125 » »	8.—	—	—
Sieboldi *Miqu.* Strauch, laubabwerfend, von dichtem, wirrem Wuchs, B. klein, elliptisch-lanzettlich, Bl. grünlich, unansehnlich, Fr. überaus zahlreich, klein, korallenrot. Japan, bis 4 m, VI.	Sträucher	—.80	7.—	60.—
⊛ **spinosissima** *Hort. Hesse* (I. Aquif. handsworthensis *Moore*) Form von I. Aquifolium, B. leuchtend grün, leicht gewellt und auffallend stark am Rande mit langen Stachelzähnen besetzt.	30—40 cm hoch	3.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ilex (Fortsetzung):			
verticillata *Gray* . . . . Sträucher Strauch, laubabwerfend, von lockerem Wuchs, B. größer als die von I. Sieboldi, Fr. doppelt so gross, leuchtend rot. Amerika, 2—3 m, VI—VII.	—.80	7.—	60.—
• **yunnanensis** *Franch.* # . . . . 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, von langsamem Wuchs, B. klein, eirund, gekerbt am Rande, stachellos, an I. crenata in der Blattform erinnernd, Fr. rot. Westchina, bis 4 m, VI.	3.—	27.—	—
Indigofera — Indigostrauch — Leguminosae.			
Gerardiana *Wall.* (I. dosua *Ldl.*) ○ △ . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige gerieft, B. 13—21, beiderseits anliegend grau behaart, Bl. purpurrosa, in dichten, bis 15 cm langen Rispen. Himalaja, bis 1 m, VII—IX.	2.—	18.—	—
Kirilowi *Maxim.* ♄ ○ △ Λ . . . . Strauch, laubabwerfend, aufrecht, steif verästelt, Zweige kantig, Bl. violettrosa, gross, in bis 12 cm langen Rispen, Blättchen 7—11, beiderseits behaart, treibt Ausläufer. Nordchina, Korea, bis 1 m, VI.	2.50	—	—
Potaninii *Craib.* ○ ♄ △ . . . . Strauch, laubabwerfend, Blättchen 5—9, beiderseits behaart, unterseits graugrün, Bl. lilarosa, in bis 13 cm langen Rispen. NW-China, bis 1,5 m, VI—VII.	2.—	—	—
purpurea *Hort.* ♄ ○ . . . . Strauch, starkwachsend, B. graugrün, gefiedert, Bl. leicht purpurrosa, zahlreich, in aufrechten, langen, schmalen Ährenrispen. Bis 2 m, VI—IX.	2.50	22.50	—
reticulata *Koehne* ♄ ○ △ Λ . . . . Strauch, laubabwerfend, Blättchen 5—11, Bl. weiss, treibt Ausläufer. China, bis 50 cm, VII.	2.50	—	—
Itea — Rosmarinweide — Saxifragaceae.			
virginica *L.* ○ ◑ ⊘ . . . . Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, Zweige rötlich, B. glänzendgrün, spitz länglich-elliptisch, 4—10 cm lang, Bl. klein, weiss, duftend, in aufrechten, endständigen, bis 15 cm langen, ährenartigen Trauben. Herbstfärbung schön rot. NO-Amerika, bis 2 m, VI—VII.	1.—	9.—	—
Jasminum — Jasmin — Oleaceae.			
Beesianum *Bees.* ⚴ △ . . . . 60—80 cm hoch Strauch, laubabwerfend, leicht schlingend, ausläufertreibend, starkwachsend, B. einfach, elliptisch, frischgrün, Bl. hell- bis weinrot, duftend, 1,5 cm breit. Westchina, bis 1,5 m, V.	—.80	7.—	—
floridum *Bge.* ⚴ # Λ . . . . **m. Tb.** Strauch, halbimmergrün, leicht schlingend, Zweige kantig, B. wechselständig, 3—5zählig, länglich-elliptisch, Bl. gelb, zu mehreren in endständigen Trugdolden, fast geruchlos. China, bis 1 m, VI—VIII.	1.—	9.—	—
nudiflorum *Ldl.* (J. Sieboldianum *Bl.*), Echter Jasmin △ . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, schlingend, Zweige vierkantig, B. gegenständig, 3zählig, Bl. einzeln, achselständig an vorjährigen Zweigen, sattgelb, duftend. Für Wandbekleidung vorzüglich. China, bis 5 m, I—III.	1.—	9.—	80.—
» **aureum** *Hort.* △ . . . . mit Ballen Form mit gelben B., sonst wie die Art.	1.—	9.—	80.—
stephanense *Hort.* (J. Beesianum × officin. grandiflor.) . . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, schlingend, B. gegenständig, 3—5zählig, Bl. zartrosa, stark duftend, gross, rundpetalig, in wenigblütigen Trugdolden. Hybride, bis 5 m, VI.	1.—	—	—
Juglans — Walnuss — Juglandaceae.			
cinerea *L.* Graue Walnuss, Butternuss ⚭ Hochstämme 16—18 cm Umfang	8.—	—	—
» 18—20 » » Baum mit tiefrissiger, grauer Rinde, laubabwerfend, B. schön gefiedert, Blättchen 11—19, beiderseits behaart, Fr. länglich, Nuss 6—8rippig. ON.-Amerika, bis 30 m, IV—V.	10.—	90.—	—
regia, Walnuss, siehe unter „Obstsortiment“.			
Kalmia — Berglorbeer, Kattunstrauch — Ericaceae.			
angustifolia *L.* Schmalblättrige Kalmie ○ ◑ ● ⚴ # . 40—50 cm hoch Strauch, immergrün, B. oberseits frischgrün, unterseits heller, Bl. schalenförmig, purpurn bis karminrot, in grossen Büscheln. ON.-Amerika, bis 1 m, V—VI.	3.—	27.—	—
» **pumila** *Bosse* ○ ◑ # . . . . 30—40 cm hoch Zwergform, von dichtbuschigem Wuchs, etwa 50 cm hoch werdend.	3.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Kalmia (Fortsetzung):			
angustifolia rosea *Rehd.* # . . . . . 40—50 cm hoch Form mit rosa Bl.	3.—	—	—
» **rubra** *Hort.* # . . . . . 40—50 cm hoch Form mit dunkelroten Bl.	3.—	27.—	240.—
glauca *Ait.* (K. polifolia *Wangenh.*) △ # . . . . . 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, B. gegenständig, lanzettlich, oberseits glänzendgrün, lederartig, unterseits bläulichweiss, Bl. lilapurpurn. ON.-Amerika, 50 cm, V—VI.	2.—	18.—	—
latifolia *L.* Breitblättrige Lorbeerrose ○ ◑ # . . . 20—30 cm hoch	2.50	22.50	—
30—40 » »	3.—	27.—	—
40—50 » » Strauch, immergrün, dichtbuschig, B. wechselseitig, lederartig, bis 10 cm lang, bis 5 cm breit, glänzend dunkelgrün. Bl. offen schalenförmig, rosa bis weiss, Knospen sehr zierend in vielblütigen, endständigen Doldentrauben. ON.-Amerika, bis 3 m, V—VI.	4.—	—	—
Kerria — Kerrie, Ranunkelstrauch, Frühlingsrose — Rosaceae.			
japonica *de Cand.* (Corchorus japonicus *Thbg.*) ● . . . . . Strauch, laubabwerfend, buschig, ausläufertreibend, grünzweigig, B. wechselständig, spitz eilänglich bis eiförmig, Bl. schön gelb, einzeln, bis 4 cm Durchmesser. China, bis 1,5 cm, V—VI.	—.80	7.—	60.—
» **argenteo-marginata** *Hort.* . . . . . Form mit beständig weissbunten B.	—.80	7.—	—
» **aureo-marginata** *Hort.* . . . . . Form mit gelbbunten B.	—.80	7.—	60.—
» **laciniata** *Hort.* . . . . . Form mit schmalen, scharf gezähnten und geschlitzten B., niedriger bleibend.	—.80	7.—	—
» **plena** *Schneid.* Mauerröschen . . . . . Form mit dicht gefüllten, kugeligen, grossen, goldgelben Bl., entlang vorjähriger Zweige, B. mit auffallend lang ausgezogener Spitze, doppelt gesägt.	1.50	13.50	—
Koelreuteria — Koelreuterie — Sapindaceae.			
paniculata *Laxm.* ○ . . . . . 30—50 cm hoch Baum oder Strauch, laubabwerfend, B. meist doppelt gefiedert, bis 40 cm lang, Endfiederblättchen auffallend dreieckig, Bl. in endständigen, gelben, aufrechten bis 30 cm hohen, lockeren Rispen. Japan, China, bis 8 m, VII—VIII.	1.50	13.50	—
Laburnocytisus, siehe Laburnum Adamii.			
Laburnum — Goldregen — Leguminosae.			
Adamii *Petz. & Kirch.* (Laburnocytisus, Laburnum vulgare × Cytisus purpureus) Geisskleebohnenbaum Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	3.—	27.50	—
» » » » 180—200 » 10—12 » » Baum oder Strauch, laubabwerfend, interessanter Pfropfbastard mit gelben Bl. und den B. des Laburnum vulgare, den roten Bl. und den B. des Cytisus purpureus und einer Zwischenform mit kleineren B. als Laburnum und trüb- bis hellpurpurnen Bl. in hängenden Trauben. VII.	4.—	36.—	—
vulgare Alschingeri *Rchb.* Höhe bis z. Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » » Form des gemeinen Goldregens mit stärker seidig behaarten B., unterseits blauer, Blütentrauben kürzer.	3.50	—	—
Watereri *Dipp.* (L. vulgare × alpinum) Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang Hybride mit ganz besonders langen, gelben Blütentrauben, in allen Teilen schwächer behaart als L. vulgare.	2.50	22.50	—
Lavandula, siehe unter „Stauden" und „Junge Laubhölzer".			
Ledum — Porst — Ericaceae.			
latifolium *Ait.* (L. groenlandicum *Ait.*) △ # ≌ . . . . 30—50 cm hoch Strauch, immergrün, junge Zweige braunfilzig, B. langelliptisch, glänzendgrün, unterseits weissfilzig, Bl. atlasweiss, in zahlreichen Doldentrauben. Nordamerika, bis 1 m, V—VI.	2.—	18.—	—
» **compactum** *Hort.* (L. groenland. comp. *Bean*) △ # . 30—40 cm hoch Form von breitem, niedrigem Wuchs, bis 50 cm hochwerdend.	2.—	18.—	—
palustre *L.* Sumpfporst △ # ≌ . . . . . 40—50 cm hoch Strauch, immergrün, B. linealisch, stark eingerollt, dunkelgrün, unterseits braunfilzig, Einzelblüten breit, weiss, in dichten, endständigen Blütenständen. Nordeuropa, bis 1 m, V—VI.	2.—	18.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lespedeza — Buschklee — Leguminosae.			
bicolor *Turcz* ♄ ○	1.50	13.50	—
Strauch, laubabwerfend, reichverzweigt, B. dreiteilig, oberseits sattgrün, unterseits graugrün, Bl. violett bis karminrot, achselständig, in langen Trauben. Nordchina, Mandschurei, Japan, bis 3 m, VII—IX.			
Weitere Arten, siehe auch Desmodium.			
Leucothoë — Traubenheide — Ericaceae.			
Catesbaei *A. Gr.* (Andromeda Catesbaei *Walt.*) △ ♯ ⌀ ≅ 30—40 cm hoch	1.50	13.50	120.—
40—50 » »	2.—	18.—	—
Strauch, immergrün, Zweige überhängend, jung rötlich, B. lanzettlich, glänzend dunkelgrün, Bl. achselständig, weiss in etwa 5 cm langen Trauben. Winterfarbe der Zweige auffallend dunkelrot. Südost-Nordamerika, bis 1,5 m, V—VI.			
Leycesteria — Buntdachblume — Caprifoliaceae.			
formosa *Wall.* ○ ∧ mit Ballen	1.50	13.50	—
Strauch, laubabwerfend, B. gegenständig, spitzoval bis lanzettförmig, sattgrün, Bl. rötlichweiss, in endständigen Scheinähren mit grossen, rotpurpurnen Hochblättern, Fr. schwarze Beeren. Himalaja, Südwestchina, bis 1,5 m, VIII—IX.			
Ligustrina, siehe Syringa.			
Ligustrum — Rainweide — Oleaceae.			
amurense *Carr.*	—.80	—	—
Strauch, starkwachsend, aufrecht, B. bis 6 cm lang, stumpfgrün, Bl. in kleinen, endständigen Rispen, weiss. Amurgebiet, bis 4 m, VI.			
californicum *Hort.*	—.80	7.—	—
Strauch, halbimmergrün, dicht verzweigt, B. elliptisch, lanzettlich, bis 7 cm lang, Bl. in bis 10 cm langen Blütenständen. China, bis 4 m, VII.			
ciliatum *Sieb.* (L. ibota *Zucc. nicht Sieb.*) △	—.80	—	—
Strauch, laubabwerfend, B. eirhombisch, oberseits sattgrün, unterseits heller, Blütenstand weiss, kopfartig. Japan, bis 2 m, VI.			
coriaceum *Carr.* (L. japonicum rotundifolium *Bl.*) ♯ ∧ **m. Tb.**	1.50	—	—
Strauch, immergrün, steif, kurztriebig, sehr langsam wachsend, B. gedrängt, stumpf rundlich-eiförmig, glänzend tiefgrün, derblederig, Bl. weiss, in dichten, bis 10 cm hohen Rispen. Japanische Gartenform, bis 1,5 m, VII.			
Delavayanum *Hariot* △ ♯ ∧	1.20	11.—	—
Strauch, immergrün, dichtbuschig, B. klein oval, bis 3 cm lang, glänzend dunkelgrün, Bl. in bis 5 cm langen, walzenförmigen Rispen. Westchina, bis 2 m, VI.			
ionandrum *Diels* ♯	1.20	11.—	100.—
Strauch, immergrün, dichtbuschig, B. elliptisch, nur bis 1,5 cm lang, rundlicher als die von L. Delavayanum, Bl. in nur 2 cm grossen, dichten Rispen. Westchina, bis 1,5 m, VI.			
japonicum *Thbg. (Hort.)* ♯ mit Ballen	1.20	11.—	—
Strauch, immergrün, B. rundlich bis eiförmig, Blütenrispen bis 10 cm lang, schön pyramidal. Japan, bis 3 m, VII—IX.			
lucidum *Ait.* ♯	1.—	9.—	—
Strauch, immergrün, B. eilanzettlich, 8—12 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, Bl. in bis 20 cm langen Rispen. China, Korea, Japan, bis 3 m, VIII—IX.			
ovalifolium *Hassk.* ● ♯ Sträucher 50—80 cm hoch, mit 5—10 Trieben	—.50	4.—	35.—
ZU HECKEN! » 70—100 » » » 10—20 »	—.60	5.—	45.—
Strauch, wintergrün, Wuchs straff aufrecht, üppig, B. oberseits dunkelgrün, unterseits heller, Bl. rahmweiss, in schönen pyramidalen, reichblütigen Rispen. Überall bewährte Heckenpflanze. Japan, bis 5 m, VII—VIII.			
» **aureo-elegantissimum** *Hort.* Sträucher	1.—	9.—	80.—
Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
Form mit besonders schön goldbunten Blättern.			
» **aureo-marginatum** *Hort.*	1.—	—	—
Form mit gelbgerandeten Blättern.			
» **elegans argenteum** *Hort.*	1.—	9.—	—
Form mit schön silberweiss-bunten Blättern.			
Purpusi *Hoefk.* mit Ballen	1.—	9.—	—
Strauch, laubabwerfend, Austrieb rot, sehr zierend, B. etwa 3 cm, hellgrün, wachsartig dicklich, Blütenrispen dicht. China, bis 2 m, VIII.			
Simoni tricolor *Hort.* ♯ ∧ mit Ballen	1.—	9.—	—
Strauch, immergrün, B. lang-elliptisch, schön rot, weiss und grün gefärbt.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ligustrum (Fortsetzung):			
species himalayense *Purp.* (L. compactum *Hook. f. & Thoms.*) . . . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs flott aufrecht, Triebe dunkelpurpurn, B. weidenblattartig, schmallanzettlich, bis 15 cm lang, gelblichgrün mit bräunlichem Rand. Himalaja, China, bis 5 m, VI—VII.	1.—	9.—	—
strongylophyllum *Hemsl.* △ ♯ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, langzweigig, B. sehr klein, bis 1,5 cm Durchmesser, fast kreisrund, dicklich lederartig, glänzend mittelgrün, Bl. langröhrig, in lockeren, endständigen Rispen. Für warme Lagen. China, bis 2,5 m, VII.	1.20	11.—	—
vulgare *L.* Gemeine Rainweide, Sträucher 60—80 cm hoch, mit 5—10 Trieben. ○ ● ♗ **ZU HECKEN!** Strauch, laubabwerfend, teils wintergrün, kleinblättrig, dichtbuschig, Bl. weiss in Rispen. Europa, bis 4 m, VI—VII.	—.50	4.—	35.—
» **atrovirens** *Hort.* ♗ . . Sträucher 60—80 cm hoch, mit 10—15 Trieben **ZU HECKEN!** Form, halbimmergrün, von straffem Wuchs, B. regelmässig gestellt, dunkelgrün bis dunkelpurpurbraun. Sehr beliebt als Heckenpflanze.	—.60	5.—	40.—
» **chlorocarpum** *Hort.* (L. vulg. fructu luteo *Hort.*) ஃ . . . . Form mit hellem Holz und Laub und gelben Früchten.	—.60	5.—	—
» **glaucum** *Hoefk.* (L. vulg. glauc. albo-marg. *Rehd.*) . . . . Form mit graugrünen B. und leicht weissem Rand.	—.60	5.—	—
» **italum** *Mill.* ♗ **ZU HECKEN!** . . . . 40—60 cm hoch Form von dichtem, starrem, niedrigem Wuchs, sehr schön dunkelgrün. Vorzüglich für mittelhohe, dichte, starke Hecken.	—.60	5.—	45.—
» **pyramidale** *Hort.* ♗ **ZU HECKEN!** . . . . Form von dichtem, aufrechtem Wuchs, B. dunkelgrün. Vorzüglich für dichte Hecken.	—.60	5.—	45.—
Lindera — Fieberstrauch — Lauraceae.			
praecox *Bl.* (Benzoin praecox *Sieb. & Zucc.*) . . . . mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. verkehrt lanzettförmig, bis 13 cm lang und 7 cm breit, oberseits freudiggrün, unterseits blaugrün, Bl. in gelblichgrünen Büscheln, sitzend, vor dem Austrieb der B., Herbstfärbung gelb. Japan, bis 8 m, III—IV.	2.50	—	—
sericea *Bl.* (Benzoin umbellatum sericeum *Rehd.*) . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, B verkehrt elliptisch, länglich zugespitzt, in der Jugend seidigfilzig, später oberseits angedrückt weichhaarig, unterseits weichzottig. Bl. mit Blattaustrieb, gelb. Japan, bis 3 m.	2.50	22.50	—
Linnaea — Zwillingsblüte — Caprifoliaceae.			
borealis canadensis *L.* ♯ . . . . **m. Tb.** Sträuchlein, immergrün, kriechend, B. fast kreisrund, dicklich, nach dem Stiel breit zulaufend, oberseits behaart, Bl. paarweise, endständig, rosa, glockig, Fr. dicke Beere, gelb. Nordeuropa, Asien, Amerika, VI—VIII.	3.—	—	—
Liquidambar — Amberbaum — Hamamelidaceae.			
styraciflua *L.* ∅ + ... Baum, laubabwerfend, mit pyramidaler Krone, Triebe korkig geflügelt, B. sattgrün, 5lappig, ahornähnlich, Herbstfärbung herrlich tiefrot. Fr. rundlich, den Winter über hängenbleibend. Baum Storax liefernd. Ost-Nordamerika, bis 40 m, V.	2.—	18.—	—
Liriodendron — Tulpenbaum — Magnoliaceae.			
tulipifera *L.* ♖ ∅ ♣ . . . . Pyramiden 200—250 cm hoch Baum, laubabwerfend, Krone locker, bis tief herab beweigt, B. entspringen tutenförmiger Blattscheide, meist eckig gelappt, Blattspitze fehlt, glänzend fettig hellgrün, unterseits bläulich bereift. Herbstfärbung prachtvoll goldgelb, Bl. einzeln, tulpenartig gross, gelblich weissgrün, bis 6 cm breit. Fr. zapfenartig. ON-Amerika, bis 50 m, VI—VII.	6.—	—	—
Lithospermum, siehe unter „Stauden".			
Loiseleuria — Zwergporst — Ericaceae.			
procumbens *Desv.* (Azalea procumbens *L.*) ■ ♯ . . . . **m. Tb.** Sträuchlein, rasig niederliegend, immergrün, B. lineal, 3—8 mm gross, zurückgerollt, kreuzgegenständig, Bl. rosa und weiss, zu 1—5 zusammmen, breitglockig. Polargebiet, Mitteleuropa, Nordasien, Amerika, VII—VIII.	5.—	—	—
Lonicera — Heckenkirsche — Caprifoliaceae. ♖ ♣ Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen".			
Alberti *Rgl.* (L. spinosa Alberti *Rehd.*) △ . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs niedergestreckt, B. zierlich, schmal, blaugrün, Bl. rosalila, wohlriechend, Fr. blaurötlich, bis fast weiss bereift. Wohl dornlose Form der L. spinosa aus Turkestan, 75—100, VI.	1.50	—	—

Lonicera (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alpigena *Nichols.*, Alpen-Heckenkirsche ꝏ . . . . Strauch, laubabwerfend, B. gross, bis 10 cm lang, dicklich, eiförmig, glänzend dunkelgrün, Bl. langgestielt, grünlichgelb mit Braunrot, Fr. sehr gross, kirschenähnlich, leuchtendrot. Mittel-Südeuropa, bis 2 m, V.	—.80	7.—	—
amoena alba *Zbl.* (L. floribunda × tatarica) . . . . Strauch, laubabwerfend, B. schmal oval, Bl. zu zweien, am Ende diesjähriger Kurztriebe, reinweiss, später gelblich, reichblühend. Hybride, bis 2 m, V—VI.	—.60	5.—	45.—
bella *Zbl.* (L. Morrowi × tatarica) Ø . . . . Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, B. tiefgrün, schmallänglich, etwa 6,5×3 cm, Bl. zu zweien, karminrosa, Herbstfärbung schön orange bis tief braunrot, Rückseiten schwefelgelb. Hybride, bis 4 m, V.	—.60	5.—	—
caucasica, siehe L. orientalis.			
chaetocarpa *Rehd.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. eilänglich behaart, Bl. weiss bis gelblichweiss mit dicker, sackartiger Röhre, Fr. borstig behaart, glänzend ziegelrot. Mittelchina, bis 1,5 m, V.	—.60	—	—
chrysantha turkestanica *Hort* (L. chrysantha latifolia *Korsh.*) . . . . . Form mit breiteren, weniger behaarten B., sonst wie die Art.	—.60	—	—
coerulea *L.* . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs straff aufrecht, B. bleich oder blaugraugrün, Bl. hellgelb, Fr. länglich, blau bereift. Nord- und Mitteleuropa, bis 1,5 m, IV—V.	—.60	5.—	—
» **dependens** *Rgl.* . . . . Form von sparrigem Wuchs, Äste herabhängend, B. oberseits hellgrün, unterseits bläulichgrün, Bl. grünlichgelb, Blattaustrieb bereits Anfang März.	—.60	5.—	—
» **Kirilowi** *Hort.* . . . . Form, steif aufrecht, rotzweigig, B. oval, oberseits freudiggrün, unterseits heller, Bl. grünlichgelb.	—.60	5.—	—
Ferdinandi *Franch.* . . . . Strauch, laubabwerfend, kräftig wachsend, langtriebig, elegant überhängend, Austrieb bräunlich, B. eilanzettlich, mit grossen, rundlichen Nebenblättchen, Bl. hellgelb, Fr. rot, von Hülle umgeben. Nordchina, bis 3 m, V—VI.	—.80	7.—	—
floribunda *Boiss. & Buhse* (L. Korolkowi floribunda *Nichols.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, stark verästelt, Zweige feinfilzig, B. eiförmig, oberseits graugrün, unterseits heller, breiter als die von L. Korolkowi, und Grund rundlicher, Bl. tief rosafarbig, zahlreich, Fr. gelbrot. Transkaukasien, bis 4 m, V—VI.	—.80	7.—	—
iberica *Bieb.* . . . . Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, rundlich, B. kurz gestielt, runzlig, derb, rundlich, graugrün, unterseits wolligfilzig, im Herbst sehr lange haftend, Bl. hellgelb, auffallend, Fr. rot. Südrussland, bis 2 m, VI.	1.—	—	—
involucrata *Banks.* ꝏ . . . . Strauch, laubabwerfend, Äste gelbbraun, kantig, B. frischgrün, dünn, Bl. goldgelb bis gelbrot, Fr. schwarzrot, umhüllt von grossen purpurnen Vorblättern. WN.-Amerika, bis 2 m, V—VI.	—.60	5.—	—
» **serotina** *Koehne* . . . . Form mit dunklerem Holz und Blattfarbe, Bl. orangegelb.	—.80	7.—	—
Korolkowi *Stapf.* (L. micrantha *Dipp.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, breitwachsend, B. eielliptisch, blaugrün, behaart, Bl. zartrosa, sehr zahlreich, Fr. rot. Turkestan, bis 3 m, V—VI.	—.80	7.—	—
Ledebouri *Eschsch.* Ledebours Heckenkirsche ● ꝏ . . . . Strauch, laubabwerfend, breitwachsend, B. dicklicher als die von L. involucrata, unterseits mehr behaart, Bl. gelbrot auf roten Stielen, von rötlichen Deckblättern gestützt, Fr. schwarzpurpurn mit noch haftenden Deckblättern. Kalifornien, bis 2 m, VI—VII.	—.80	7.—	—
Maacki *Maxim.* . . . . Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, B. gross, dunkelgrün, lanzettlich, Bl. gross, reinweiss, wohlriechend, sehr zahlreich, im Verblühen gelb, Fr. blutrot. Mandschurei, Korea, bis 4 m, VI.	—.80	7.—	—
» **podocarpa** *Franch.* . . . . Form, breitwüchsig, B. breiter, dunkelgrün, schön zugespitzt, Bl. weiss mit leicht rosa Rand, Fr. glänzendrot. West- und Mittelchina, bis 3 m, VI—VII.	—.80	7.—	—
micrantha, siehe L. Korolkowi.			
Morrowii *A. Gr.* △ Ø . . . . Strauch, laubabwerfend, buschig, Äste hängend, B. kurzgestielt, breit eirundlich, dunkelgrün, unterseits hellbläulich oder graugrün, weich behaart, Bl. weissgelb, Fr. blutrot. Herbstfärbung schön rotbraun. Japan, bis 2 m, V—VI.	—.60	5.—	—

Lonicera (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
myrtilloides *Purp.* △	—.60	5.—	45.—
Strauch, laubabwerfend, feinzweigig, Äste überhängend, Blättchen eiförmig, klein, 1—3 cm lang, Bl. gestielt, weiss, im Grunde rötlich, Röhre bauchig, wohlriechend, Fr. rotglänzend, kugelig, glasig. Himalaja, bis 1 m, V—VIII.			
Myrtillus *Hook. & Thoms.* △	—.60	5.—	45.—
Strauch, laubabwerfend, dichtzweigig, B. eiförmig, sehr klein, kleiner als die von L. myrtilloides, Bl. gelbweiss, duftend, Beeren orange. Himalaja, bis 1 m, V—VII.			
nigra pyrenaica *Dipp.* ●	—.60	5.—	—
Form der schwarzfrüchtigen Heckenkirsche mit kleineren B., oberseits dunkelblaugrün, unterseits hellbläulichgrün, Bl. rosa, kleiner als die der Art. Europa bis 1,5 m, V—VI.			
nitida *Wils.* △ ♣ # ∧ . . . **mit Ballen, 20—40 cm hoch**	—.80	7.—	60.—
» » 50—70 » »	1.—	9.—	—
Strauch, immergrün, schön fächerartige Verzweigung, Blättchen klein, eiförmig, hellgrün, myrtenartig, Bl. zu zweien, rahmweiss, duftend, Fr. erbsengross, purpurblau. Mittel- und Westchina, bis 1,5 m, V.			
orientalis *Lam.* (L. caucasica *Pall.*)	—.60	5.—	45.—
Strauch, laubabwerfand, buschig, Zweige kantig, B. breit eilänglich, lebhaft dunkelgrün, unterseits bläulichgrün, Bl. violett oder rosa mit becherartigem Kelch. Fr. schwarze Doppelbeere. Westasien, bis 3 m, V—VI.			
ovalis, siehe L. trichosantha.			
parvifolia *Hayne* (**L. tat. parvifolia** *Jaeg.*) △	—.60	5.—	—
Strauch, laubabwerfend, buschig, B. bis 6 cm lang, 2,5 cm breit, heller grün als die von L. tatarica, Bl. rahmweiss, auf violetten Stielen, Fr. kugelig, gelborange, bis 1,5 m, V—VI.			
pileata *Oliv.* ◑ △ :‖: # . . . **mit Ballen 20—30 cm hoch**	—.80	7.—	60.—
Strauch, immergrün, Wuchs niedergestreckt, Zweige steif, B. fiederartig, zweizeilig, länglich-elliptisch, grösser als die von L. nitida, saftiggrün, früh frisch treibend, Bl. zu zweien, grünlichgelb, Fr. schön glasig violett, aber ziemlich versteckt. Bedeutend härter als L. nitida. China, bis 50, V.			
» **yunnanensis** *Hort.* (L. ligustrina yunnanensis *Franch.*) ◑ △ ♣ # **Echt!** mit Ballen 30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
Form, immergrün, Wuchs mehr aufrecht, Zweige steif holzig, B. elliptisch, dunkelgrün, zweizeilig, gut unterschiedlich von L. nitida, Bl. grünlich, unauffällig, Fr. zahlreich, glasig rotviolett. Yunnan, bis 1,5 m, V.			
prostrata *Rehd.* △	—.60	5.—	—
Strauch, laubabwerfend, Wuchs niedergestreckt oder doch stark überhängend, B. an L. trichosantha erinnernd, Bl. gelblich. Westchina, bis 75, VI.			
purpurascens *Walp.*	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, Zweige jung behaart, B. kurz gestielt, oval bis länglich, unterseits behaart, Bl. paarweise, trübpurpurn, Röhre behaart, Fr. blauschwarz. Himalaja, bis 3 m, V.			
Purpusii *Rehd.* (L. fragrantissima × Standishi) ✿	—.80	7.—	60.—
Strauch, halbimmergrün, dichtzweigig, rund, B. gross, breitoval, rauh, lederig, Bl. rahmweiss, meist an entlaubten Zweigen, fein duftend, Fr. rot. Hybride bis 3 m, II—IV.			
quinquelocularis *Hardw.*	—.80	—	—
Strauch, laubabwerfend, ähnlich L. Xylosteum, Bl. gelb, Fr. glasig weiss. Himalaja, bis 2 m, VI.			
ramosissima *Franch. & Savat.*	1.—	9.—	—
Strauch, laubabwerfend, stark verzweigt, B. oval bis stumpf eiförmig, Bl. gelblich, zu zweien, Fr. purpurn. Japan, bis 1,5 m, VI.			
rupicola *Hook. & Thoms.* △	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, Zweige überhängend, B. bläulichgrün, stumpf eilänglich, 1,5—2,5 cm lang, Bl. behaart, hellila, duftend. Tibet, bis 1 m, VI.			
spinosa Alberti, siehe L. Alberti.			
syringantha *Max.* △ Duft!	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, ähnlich L. rupicola, Wuchs mehr aufrecht, B. blaugrau, 1—2,5 cm lang, Bl. hellila, nach Heliotrop duftend, Fr. scharlachrot. Westchina, 2 m, V—VI.			
tatarica *L.* ● ✿	—.60	5.—	45.—
Strauch, laubabwerfend, frühaustreibend, guter Gruppenstrauch, B. eilanzettlich, Bl. rosa, zahlreich, Fr. lebhaft rot. Russisch-Asien, bis 3 m, V—VII.			
» **alba** *Lois-Desl.*	—.60	5.—	45.—
Form mit grossen, weissen Bl.			
» **alba rosea** *Späth*	—.60	5.—	45.—
Form mit hellatlasrosa Bl.			

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lonicera (Fortsetzung):			
tatarica rosea grandiflora *Hort.*	—.60	5.—	45.—
Form mit besonders grossen, reinrosa Bl.			
tibetica *Bur & Franch* △	—.80	7.—	60.—
Strauch, laubabwerfend, Zweige lang überhängend, teils niederliegend, B. klein, dunkelgrün, glänzend, länglich-lanzettlich, 1—3 cm, unterseits weissfilzig, Bl. violettpurpurn, Fr. scharlachrot. Westchina, bis 2 m, V—VII.			
tomentella *Hook. et Thoms* △	—.80	7.—	—
Strauch, laubabwerfend, Zweige behaart, B. lederartig, eiländlich, 4 cm lang, 1,5 cm breit, unterseits graugrün, Bl. filzigbehaart, weiss, rötlich angehaucht, Fr. blauschwarz. Sikkim, bis 1 m, VI—VII.			
trichosantha *Franch.* (L. ovalis *Batal.*) ꝏ	—.60	5.—	—
Strauch, laubabwerfend, Wuchs ausgebreitet, B. langgestielt, lebhaft grün, eiförmig, Bl. tiefgelb, Fr. orangerot. Westchina, bis 1,5 m, VI.			
xerocalyx *Diels.*	—.60	5.—	—
Strauch, laubabwerfend, B. länglich-lanzettlich, stumpfgrün oberseits, runzlig, rauh, unterseits mit auffallend deutlich hervortretender Aderung, hellgrün, Bl. gelb, geruchlos, mit auffallend trockenem Kelch. Südwestchina, 3—4 m, VI.			
xylosteum *L.* gemeine Heckenkirsche	—.60	5.—	45.—
Strauch, laubabwerfend, kräftig wachsend, B. breit eiförmig, stumpfdunkelgraugrün, Bl. gelblich, Fr. hell- bis dunkelrot, früh abfallend. Europa, bis 3 m, V—IV.			
Lycium, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Lyonia — Lyonie — Ericaceae.			
calyculata *Rchbch.* (Chamaedaphne) Zwerglorbeer ● # 30—40 cm hoch	1.20	11.—	—
40—60 » »	1.50	13.50	—
Strauch, immergrün, stark verästelt, B. dunkelgrün, lederartig, bis 4 cm lang, 1,5 cm breit, Bl. in 4—12 cm langen Trauben am Ende der Zweige, weiss bis hellrötlich. Europa, Asien, Amerika, bis 1,5 m, IV.			
frondosa *Pursh.* (Andromeda frondosa *Pursh*) ◑ ≌ . . 30—40 cm hoch	1.20	—	—
Strauch, laubabwerfend, B. frischgrün, jung seidigsilbrig behaart, Bl. in Büscheltrauben, weiss. Amerika, bis 2 m, VI—VII.			
paniculata *Nutt.* (Andromeda paniculata *Ait.*). # . . 100—120 cm hoch	1.20	—	—
Strauch, immergrün, B. sattgrün, Bl. weiss, am Triebende gehäuft. Ost-Nordamerika, bis 1,5 m, VI.			
Maackia, siehe Cladrastis.			
Macludrania — Maclura × Cudrania — Moraceae.			
Andrei *Dode* (M. hybrida *André*) . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch	2.50	—	—
Strauch oder Baum, laubabwerfend, dornig, B. gross, oval, mit lang ausgezogener Spitze, glänzend grün. Hybride, bis 4 m.			
Maclura — Osagedorn — Moraceae.			
aurantiaca *Nutt.* (M. pomifera *Schneid.*) Osagen-Orange ◑ ꝏ	1.50	—	—
Strauch oder Baum, laubabwerfend, dornig, B. eiförmig, zugespitzt, bei Verletzung stark milchsaftgebend, Bl. ♂ ähren- oder traubenförmig, ♀ kugelig, Fr. orangenähnlich in Grösse und Farbe. Ost-Nordamerika, bis 20 m, V—VI.			
Magnolia — Magnolie — Magnoliaceae. Mit Ballen!			
acuminata *L.* Gurkenmagnolie . . . . 80—120 cm hoch	3.—	—	—
Baum, laubabwerfend, B. schön elliptisch, bis 25 cm gross, dunkelgrün, Bl. gelbgrün mit rotem Schein, unansehnlich, Fr. klein, unregelmässig, wie kleine Essiggurken. Amerika, bis 30 m, VI—VII.			
hypoleuca *Sieb. & Zucc.* (Honoki) ⊥ . . . . 70—100 cm hoch	8.—	—	—
200—250 » »	12.—	—	—
Baum, laubabwerfend. B. gross, ovalelliptisch, oberseits hellgrün, unterseits weisslich, Bl. bis 15 cm gross, schön rahmweiss, Staubfäden rot, Fr. sehr zierend, schindelförmig, zapfenartig bis 20 cm lang, 8—10 cm breit. Japan, bis 30 m, V—VI.			
Kobus *D. C.* ꝏ . . . . Pyramiden 150—200 cm hoch	5.—	45.—	—
» 200—250 » »	6.—	55.—	500.—
» 250—300 » »	8.—	70.—	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.—	55.—	500.—
» 8—10 » »	8.—	70.—	—
Baum, laubabwerfend, B. klein, elliptisch, Blütenknospen in weissfilziger Hülle im Herbst vorgebildet, den Winter über zierend, entfaltet sich kurz vor dem Ausbruch der B., den ganzen Baum in schneeiges Weiss hüllend. Bl. tulpenartig geschlossen. Japan, bis 10 m, IV—V.			
(N) » **borealis** *Sarg.* **NEUEINFÜHRUNG** . . . . 80—120 cm hoch	4.—	—	—
Form mit pyramidaler Krone, B. wie die der Art, Bl. rahmweiss, breiter, offener, flatteriger als die der Art. Sonst wie diese.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Magnolia (Fortsetzung):			
® **Loebneri** *Kache* (M. stellata × Kobus) . . . . 100—120 cm hoch Strauch von dichtem Wuchs, B. breiter als bei M. stellata, Bl. weiss, breitpetalig, flatterig, zahlreich, meist 12petalig. Hybride, bis 6 m, IV.	5.—	45.—	—
parviflora *Sieb. & Zucc.* . . . . 30—40 cm hoch Strauch von reichverzweigtem, breitem Wuchs, B. oval, kurz zugespitzt, oberseits glatt, unterseits leicht blau, anfangs wollig, Bl. glänzend atlasweiss, 7—10 cm breit, mit blutroten Staubfäden, angenehm duftend. Japan, bis 10 m, VI—VIII.	4.—	—	—
purpurea *Curt.* (M. liliiflora *Desrouss*) . . . . 40—60 cm hoch Strauch, laubabwerfend, B. ovalelliptisch, zugespitzt, bis 15 × 8 cm gross, Bl. vor oder mit dem Laubaustrieb, innen weiss, aussen purpurn. Petalen zurückgerollt. China, bis 3 m, V—VI.	4.—	36.—	—
salicifolia *Maxim.*, Weidenmagnolie . . . . 175—200 cm hoch	8.—	70.—	—
200—250 » »	10.—	90.—	—
Baum oder Strauch, laubabwerfend, Wuchs straff aufrecht, B. schmallanzettlich, unterseits silbergrau, Bl. zahlreich, sehr früh, vor dem Laubaustrieb, reinweiss, wohlriechend. Japan, bis 10 m, IV.			
stellata *Maxim.* (M. Halleana *Hort.*) Stern-M. △ . . . . . 40—60 cm hoch	6.—	54.—	—
150—175 » »	15.—	135.—	—
Strauch, laubabwerfend, Wuchs dicht rundlich, B. klein, stumpf hellgrün, schmallanzettlich, lorbeerartig, Bl. sternartig, 7—8 cm Durchmesser, vor dem Laubaustrieb, sehr zahlreich, reinweiss. Japan, bis 3 m, IV.			
» **rosea** *Veitch.* . . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch Form mit lebhaft rosa Knospen und stark rosa, nach kaltem Winter besonders intensiv gefärbten Bl. Bis 4 m.	5.—	—	—
tripetala *L.* (M. umbellata *Lam.*) Schirmmagnolie ⊥ . 70—100 cm hoch Baum, laubabwerfend, breitkronig, B. sehr gross, bis 60 cm lang und halb so breit, glänzend hellgrün, Bl. weiss, aufrecht, schmal bis 20 cm lang. Amerika, bis 12 m, V—VI.	2.50	22.50	—
Watsoni *Hook.* . . . . 20—30 cm hoch Baum, laubabwerfend, dichtkronig, B. dunkelgrün, mittelgross, Bl. ähnlich M. hypoleuca, aber von überaus starkem Duft. Japan, bis 8 m, VI—VII.	8.—	—	—
Yulan *Desf.* (M. denudata *Desrouss.*, M. conspicua *Salisb.*, M. precia *Correa*) ⊥ 60—80 cm hoch	5.—	45.—	—
80—100 » »	7.—	63.—	—
Baumartiger Strauch, Wuchs ausladend, laubabwerfend, B. länglich breit eiförmig, bis 15 cm lang, kurz zugespitzt, Bl. blendend weiss, wohlriechend, 12—15 cm gross. China, bis 15 m, IV—V.			
Hybriden (M. obovata × Yulan)			
alba superba *Hort.* (M. Soulangeana alba *Hort.*) . . . 60—80 cm hoch Form mit reinweissen Bl. von schöner Form.	5.—	—	—
Alexandrina *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch	5.—	45.—	—
80—100 » »	7.—	63.—	—
Bl. weiss, aussen rot angelaufen bis zum Grund, sonst ähnlich M. Soulangeana.			
amabalis *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch Form mit weissen, flach geformten Bl.	5.—	45.—	—
80—100 » »	7.—	63.—	—
angustifolia *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch Bl. weiss, leicht purpurrosa getönt.	5.—	45.—	—
80—100 » »	7.—	63.—	—
Lenneana *Topf.* (M. Soulangeana Lennei *Rehd.*) . . . 60—80 cm hoch Form mit grossen, aussen purpurroten, innen weissen Bl.	6.—	—	—
Norbertiana *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch Spätblühende Hybride, Bl. weiss mit Hellpurpur.	5.—	45.—	—
80—100 » »	7.—	63.—	—
rustica rubra *Bean.* . . . . 60—80 cm hoch Form ähnlich M. Lenneana, Bl. aber heller rot.	5.—	45.—	—
80—100 » »	7.—	63.—	—
Soulangeana *Soul.-Bod.* (M. denudata × liliiflora). . . 60—80 » » Hybride mit aufrechtstehenden, glockenförmigen Bl. von mehr oder weniger roter Aussenfärbung.	5.—	45.—	—
» **nigra** *Hort.* (M. liliiflora nigra *Rehd.*) . . . . . . 40—60 cm hoch Bl. breiter als die von M. purpurea, aussen dunkelrot, innen hellrot, bis 12 cm gross, reichblühend.	5.—	—	—
speciosa *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch	5.—	—	—
80—100 » »	7.—	—	—
Bl. weiss, aussen rot angelaufen, Petalen lang und schmal, spätblühend.			
triumphans *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch Form mit grossen, rötlich gefärbten Bl.	5.—	45.—	—
80—100 » »	7.—	63.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Mahoberberis — Mahonia aquifolium × Berberis vulgaris — Berberidaceae.			
Neubertii C. Schn. ‡ . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, B. lederig, graugrün, stark gezeichnet, teilweise einfach, teils gefiedert, starkwachsend.	2.—	—	—
Mahonia — Fieder-Berberitze — Berberidaceae.			
Aquifolium *Nutt.* ● ‡ ♧ . . . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch Strauch, immergrün, B. gefiedert, glänzendgrün, derblederig im Alter, dornig gezähnt, Austrieb glänzend rot, Blütenstände gross, Bl. leuchtend gelb, Fr. pflaumenblau bereift. Im Winter meist braune Blattfärbung. Nordamerika, 1,25 m, IV—V.	—.80	7.—	60.—
Bealii *Carr* (fälschlich als M. japonica im Handel) △ ‡ mit Ballen 30—50 cm hoch Strauch, immergrün, B. dick lederig, gefiedert, bis 30 cm lang, scharf dornig gezähnt, oberseits hellgrün, Mittelrippe gelb, unterseits weiss bereift, Bl. in endständigen, grossen Blütenständen, gelb. Himalaja, China, bis 2 m, IV—VI.	1.—	9.—	—
Malus — Apfelbaum — Rosaceae. ♧ +			
baccata Aldenham Purple *Hort. Angl.* **NEU!** . 80—120 cm hoch Baum, laubabwerfend, von kräftigem Wuchs, B. rötlich, leicht behaart beiderseits, reichblühend, Bl. tiefrot, Fr. purpurrot in reicher Zahl, essbar, von Frühling bis Herbst sehr wertvoller Zierbaum. Hybride, 4—6 m, V.	1.50	13.50	120.—
» **flavescens** *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch Kirschapfel mit gelben Fr., 2,5—3 cm Durchmesser.	1.50	—	—
» **fructu flavo** *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch Kirschapfel mit gelben Fr.	1.50	—	—
» **Hyslop** *Berkh.* (M. prunifolia Hyslop *Hort.*) . . . 100—120 cm hoch Sehr reichtragende Zierapfelform, Fr. bordeauxrot mit zart pflaumenblauem Reif, sonnenabgewendet gelb, im ganzen leicht hell punktiert, Grösse bis 5 cm Durchmesser, Stiel dünn, 2—3 cm lang, Kelch spitz zusammengedrängt in wässeriger Vertiefung. Fruchtgeschmack herbsäuerlich.	1.50	13.50	120.—
» **Lady Ilgen** *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch Fr. schön rot geflammt, 3—5 cm Durchmesser.	1.50	13.50	—
» **nigra** *Hort.* . . . . 80—120 cm hoch Fr. dunkelrot, 2,5—3 cm Durchmesser.	1.50	13.50	120.—
» **Orange** *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch Fr. orangegelb, 4 cm Durchmesser.	1.50	13.50	—
» **pulchella** *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch Kleiner, weissgelber Zierapfel, 3 cm Durchmesser.	1.50	—	—
» **Ringo** *Hort.* (M. prunifolia rinki *Rhed.*) . . . . . . 100—120 cm hoch Form von sparrigem Wuchs, B. unterseits behaart, Bl. blasslilarosa, 4—5 cm Durchmesser, Knospe lebhaft rosa, Fr. gelblich, bis 5 cm Durchmesser.	1.50	13.50	—
Eleyi *Hort.* (M. purpurea Eleyi *Rehd.*) . . . . 80—120 cm hoch Baum mit rotem Austrieb, B. elliptisch, Bl. leuchtend weinrot, Fr. dunkelpurpurrot, 1,5 cm Durchmesser, ca. 3 cm dünn- und langgestielt, eiförmig.	1.50	13.50	120.—
Excellenz Thiel, siehe unter „Trauerbäume".			
floribunda *Sieb.* . . . . 80—100 cm hoch Baumartiger Strauch mit dichter Krone, schlankzweigig, B. eiförmig, scharf gesägt, Bl. sehr zahlreich, in Büscheln am vorjährigen Holz, zartrosa, ca. 3 cm Durchmesser, Knospen dunkelrot, Fr. erbsengross, gelb mit roter Backe. Japan, bis 3 m, V.	1.50	13.50	120.—
» **Arnoldiana** *Rehd.* (Malus Arnoldiana *Sarg.*) (M. floribunda × baccata) 60—80 cm hoch Strauch im Wuchs wie M. floribunda mit schlanken, ausladenden Zweigen, diese im Herbst glänzend braunrot, B. breiter, ovaler, scharf, fast doppelt gesägt, Bl. grösser, einfach blassrosa, auf 3—4 cm langen Stielen mit dem Laubaustrieb, Fr. gelb, 1 cm Durchmesser. Hybride, bis 2 m, V.	1.50	—	—
» **purpurea** *Hort.* (M. floribunda × Niedzwetzkyana) 100—120 cm hoch B. im Austrieb purpurrosa, später in bronziertes Dunkelgrün übergehend, Bl. zahlreich, breit, karmesin- bis kirschrot, Knospen blutrot, Fr. in Büscheln von 2—5, dunkelblutrot, bei Vollreife scharlachrot, ca. 2—3 cm Durchmesser.	1.50	13.50	120.—
Frau Luise Dittmann *Hort.* . . . . 70—100 cm hoch Form von aufrechtem Wuchs, Bl. sehr gross, pfirsichrot mit Weiss, grösser als M. Scheideckeri, halbgefüllt. Japan, frühblühend.	1.50	13.50	—

Malus (Fortsetzung):

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
magdeburgensis *Schoch.* (M. spectabilis×dasyphylla) . 80—120 cm hoch Wertvoller Zierapfel, B. breiter als bei M. spectabilis, unterseits behaart, Bl. etwas grösser als bei M. Scheideckeri, halbgefüllt, lilarosa, lange haltend, Knospen leuchtendrot, Fr. fast kugelig, grösser als bei M. baccata. Reichblühende Hybride.	1.50	13.50	—
micromalus *Mak.* . . . . 80—120 cm hoch Strauchartige Kulturform, B. eilanzettlich bis länglich, derb, sattgrün, Bl. lebhaftrosa, 4 cm breit, in 3—7 zähligen Büscheln, Knospen karmesin, Fr. flachkugelig, langgestielt, etwa 1,5 cm Durchmesser, hellrot, lange haftend. Japan, China, IV—V.	1.50	13.50	—
Niedzwetzkyana *Dieck.* . . . . 80—120 cm hoch Baum, von sparrigem Wuchs, mit braunroter Rinde, B. braunrot, Bl. dunkelrosa, Fr. sehr gross, kalvillenähnlich bis birnförmig, dunkelrot, auch Fleisch stark gerötet, wohlschmeckend. Sibirien, Turkestan.	1.50	13.50	—
Oekonomierat Echtermeyer *Hort.*, siehe unter „Trauerbäume".			
prunifolia Hyslop, siehe M. baccata Hyslop.			
⊛ **purpurea aldenhamensis** *Rehd.* . . . . **Neu!** 80—120 cm hoch Hybride (M. floribunda×Niedwetzkyana), B. oval bis elliptisch, unterseits behaart, mit roter Mittelrippe, Bl. halbgefüllt, weinrot, 2,5—3 cm breit, Fr. tiefrot, rundlich, mit bleibendem Kelch. V.	1.50	13.50	—
Sargentii *Rehd.* △ Ø . . . . 50—70 cm hoch Strauch, langsam wachsend, dicht waagrecht verzweigt, oft dornig, B. eiförmig, teilweise dreilappig, an Weissdorn erinnernd, Herbstfärbung orangegelb, Bl. reinweiss, 3 cm lang gestielt, in 6 blütigen Doldentrauben am vorjährigen Holz, Einzelblüten flach geöffnet, 2 cm Durchmesser, Fr. kugelig, dunkelrot, leicht bereift, 1 cm Durchmesser, werden nicht von Vögeln gefressen. Japan, bis 2 m, V.	1.50	13.50	—
Scheideckeri *Zbl.* (M. floribunda×prunifolia) . . . . 60—80 cm hoch Baum, von straff aufrechtem Wuchs, B. eiförmig, dunkelgrün, Bl. sehr zahlreich, bis 3 cm lang gestielt, herrlich hell- bis dunkelrosa, halbgefüllt, bis 3,5 cm breit, Knospen lebhaft karminrosa, ziemlich spätblühend, Fr. kirschgross, langgestielt.	1.50	—	—
Sieboldi calocarpa *Rehd.* . . . . 70—100 cm hoch Strauch oder Baum, von aufrechtem Wuchs, Blütenknospen rot, Bl. weiss, Fr. ziemlich klein, kugelig, ca. 1—1,5 cm Durchmesser, dunkel- bis hellrot, langgestielt, in Büscheln.	1.50	13.50	—
spectabilis rosea plena *Th. Moore* (M. spect. Riversii *Nash.*) Form mit grösseren B. und Bl. als die Art, Bl. 80—100 cm hoch gefüllt, schön hellrosa, Knospen dunkelrosa.	1.50	13.50	—
toringoides *Hughes* . . . . 100—130 cm hoch Strauch oder Baum, Zweige nur in der Jugend behaart, B. 3—8 cm, meist mit 2 tiefen Lappen, kerbig gesägt, Bl. weiss bis 2,5 cm breit, Fr. etwa 1 cm dick, gelb mit Rot. Westchina, bis 8 m, V.	1.50	13.50	—

Marlea — Alangiaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
begoniifolia *Roxb.* (Alangium chinense *Rehd.*) ∧ . . . . **m. Tb.** Baumartiger Strauch, laubabwerfend bis wintergrün, B. wechselständig, gestielt, oval, ganzrandig, 8—10×7—8 cm gross, oberseits samtig glänzendgrün, unterseits blasser, kurz wollig behaart, Bl. achselständig, weiss, in lockeren, 3—5 blütigen Trauben. China, bis 2 m, VII.	2.—	—	—
platanifolia *Sieb. & Zucc.* (Alangium platanifolium *Harms*) ∧ . . **m. Tb.** Baumartiger Strauch, laubabwerfend, B. rundlich gelappt, an Platanen erinnernd, Bl. achselständig, weiss in 1—4 blütigen Trauben, wohlriechend. China, Japan, bis 2 m, VI—VII.	2.—	—	—

Menispermum, siehe unter „Schlingpflanzen".

Meratia — Winterblüte — Calycanthaceae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
praecox *Rehd. & Wils* (Calycanthus praecox *L.*, Chimonanthus fragrans *Ldl.*) Strauch, laubabwerfend, B. spitzeilanzettlich, 7—15 cm gross, glänzend hellgrün, rauh, Bl. am alten Holze, gelblich, innen purpurbraun, stark duftend. Nordchina, bis 3 m, II—III.	1.50	—	—

Microglossa — Rutenaster — Compositae.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
albescens *Clarke* (Amphirapis albescens *DC.*) ♄ △ ∧ . . . . **m. Tb.** Halbstrauch, Wuchs aufrecht, filzig, B. gelbgrün, breitlanzettlich, Bl. klein, lila mit gelber Mitte, zu bis 15 cm breiten, endständigen Doldenrispen vereinigt. Himalaja, bis 1 m, VII—VIII.	1.50	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Morus — Maulbeerbaum — Moraceae.			
alba *L.* Futter für Seidenraupen ○ ⚵ ☘ + Sträucher 100—150 cm hoch Baum oder Strauch, laubabwerfend, Holz graubraun, Zweige gelblichgrün, B. lebhaftgrün, breit eiförmig, meist gelappt, grob gezähnt, wertvoll als Futter für Seidenraupen. Bl. in hängenden, achselständigen Kätzchen, Fr. brombeerartig, weiss, von Geschmack fade. China, bis 12 m, V.	—.60	5.—	45.—
Muehlenbeckia — Polygonaceae.			
nana *Hort.* (M. axillaris *Walp.*) △ # . . . . **m. Tb.** Strauch, kriechend, immergrün, Blättchen wechselständig, rundlich, glänzend dunkelgrün, Bl. gelblich, unscheinbar. Neuseeland, 5—10 cm, V—VI.	—.70	6.—	50.—
varians, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Myrica — Wachsmyrte — Myricaceae.			
cerifera *L.* ⚵ △ ☘ ⊘ . . . . mit Ballen Strauch oder baumartig, fast immergrün, B. glänzend dunkelgrün, spitzlanzettlich, würzig, Bl. in Kätzchen, Fr. mit weissem Wachsüberzug. Amerika, bis 6 m, III—IV.	—.80	7.—	60.—
Myricaria, siehe Tamarix.			
Neillia — Traubenspiere — Rosaceae.			
affinis *Hemsl.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. wechselständig, breit eiförmig, Bl. in dichten, 3—8 cm langen Trauben, rötlich. Westchina, bis 2 m, V—VI.	—.80	7.—	—
thyrsiflora *D. Don.* ⊘ . . . . Strauch, laubabwerfend, Triebe kantig, Äste rotbraun, B. herzeiförmig, doppelt gesägt, meist dreilappig, lebhaftgrün, Blütentrauben achselständig, auch an den Zweigspitzen, dicht, weiss, Herbstfärbung tiefbraungrün mit feurigem Schein. Himalaja, bis 1 m, VI—VIII.	—.80	7.—	—
Torreyi, siehe Physocarpus.			
Neviusia — Schneelocke — Rosaceae.			
alabamensis *A. Gr.* △ . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, B. wie Rhodotypus, Bl. in beblätterten Scheintrauben, unscheinbar hellgrün mit zahlreichen, auffallenden, schneeweissen Staubfäden. Alabama, bis 1 m, VI—VII.	1.50	13.50	—
Nothofagus — Scheinbuche — Fagaceae.			
antarctica *Oerst.* . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch Baum, laubabwerfend, B. wechselständig, dichtstehend, klein, stark gewellt, leicht gezähnt. Chile, bis 35 m.	2.—	18.—	—
» **uliginosa** *Reiche* △ . . . . mit Ballen 50—70 cm breit Form von mehr flachem Wuchs, Blättchen weniger engsitzend und weniger gewellt.	1.50	13.50	—
Orixa — Orixa — Rutaceae.			
japonica *Thbg.* (Evodia ramiflora *A. Gr.*) . . . . 50—70 cm hoch Strauch, laubabwerfend, Zweige hellgraugrün, B. kurzgestielt, länglich, lebhaftgrün, durchsichtig drüsig punktiert, Bl. grünlich, in 5—10blütigen Trauben. Japan, bis 3 m, V.	1.20	11.—	—
Osmanthus — Duftblume — Oleaceae. #			
Aquifolium *Sieb. & Zucc.* (O. ilicifolins *Mouillef.*) mit Ballen 40—60 cm hoch	4.—	36.—	—
» » 60—80 » »	5.—	—	—
Strauch, immergrün, B. lederig, am Rande dornig gezähnt, dunkelgrün, unterseits gelbgrün, an Ilex Aquifolium erinnernd, Bl. weiss, duftend, in achselständigen Büscheln, Fr. eiförmig, blauschwarz. Japan, bis 1 m, VI—VII.			
» **albo-marginatus** *Hort.* (O. ilicifolius variegatus *Rehd.*) ∧ mit Ballen 30—40 cm hoch Form mit weissgerandeten B., im Austrieb gelbbunt.	3.—	27.—	—
» **ilicifolius purpureus** *Hort.* (O. ilicifolius purpureus *Rehd.*) ∧ mit Ballen 30—40 cm hoch Form mit tiefrotem Austrieb, ältere B. schwärzlichgrün.	3.—	27.—	—
armatus *Diels.* . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, Zweige grau, B. länglich-lanzettlich, auffallend stark buchtig dornzähnig, bis 15 cm lang und 3 cm breit, stumpf dunkelgrün, Bl. rahmweiss, wohlriechend. Westchina, bis 5 m, IX—X.	5.—	45.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Oxycoccus — Moosbeere — Ericaceae. △			
macrocarpus *Pursh.* (Vaccinium macrocarpum *Ait.*) Amerik. Moosbeere # ♣ ⚘ ≏ ☐ + ... mit Ballen Strauch, niederliegend, kriechend, immergrün, B. stumpfoval, unterseits weisslich, Bl. fuchsienartig, hellpurpurn, Fr. bis 2 cm Durchmesser, weisslichgrün bis scharlachrot. Nordamerika, V—VI.	—.60	5.—	45.—
quadripetalus *Hort.* (Vaccinium Oxycoccus *L.*, Oxycoccus palustris *Pers.*) Gemeine Moosbeere ● # . . . . mit Ballen Strauch vollkommen angeschmiegt niederliegend, immergrün, Blättchen sattgrün, unterseits bläulich, Bl. zu 1—4, hellpurpurn, Fr. bis 10 mm dick, weisslich bis purpurn bei Vollreife. Europa, V—VII.	—.80	7.—	60.—
» **microcarpus** *Turcz.* (O. palustris pusillus *DC.*) ● # . . mit Ballen Form in allen Teilen kleiner, zierlicher als die Art.	—.80	7.—	—
Pachysandra, siehe unter „Stauden".			
Pachystigma — Dicknarbe — Celastraceae.			
myrsinites *Raf.* ● △ # . . . . mit Ballen Strauch, buschig, immergrün, Äste bräunlich, rundlich, B. lederig, hellgrün, breitelliptisch, bis 3 cm lang, bisweilen fein gesägt, Bl. achselständig, unansehnlich. NW-Amerika, bis 50 cm, V—VII.	2.—	18.—	—
Paeonia, siehe unter „Stauden".			
Parrotia — Parrotie — Hamamelidaceae.			
Jacquemontiana *Decne.* (Parrotiopsis Jaquem. *Rehd.*) Scheinparrotie Ø Strauch, laubabwerfend, B. an Corylus erinnernd, aber etwas kleiner, Blütenstände mit grossen, weisslichen, häutigen Hochblättern umgeben. Herbstfärbung gelb. Kaschmir, Afghanistan, bis 4 m, V—VII.	2.50	—	—
persica *C. A. Meyer* Ø . . . . Strauch, auch baumartig, laubabwerfend, B. jung rotbraun gerandet, rundoval, an Hasel oder Erlen erinnernd, Bl. vor Laubausbruch in kurzen gelbroten köpfchenartigen Ähren. Herbstfärbung rot-gelb-oliv. Persien, bis 5 m, III—IV.	2.50	22.50	—
Parthenocissus, siehe Ampelopsis unter „Schlingpflanzen".			
Paulownia — Blauglockenbaum — Scrophulariaceae.			
imperialis *Sieb. & Zucc.* (P. tomentosa *Steud.*), Kaiserbaum ⊥ 30—50 cm hoch Baum, von stattlicher Erscheinung, laubabwerfend, Triebe dichtfilzig, B. sehr gross, gegenständig, breit eiförmig, teils herzförmig, teils 3lappig, unterseits filzig, frischgrün, Bl. in grossen, aufrechten Rispen, violett mit Gelb, wohlriechend. China, IV—V, bis 15 m.	2.50	—	—
Pavia, siehe Aesculus.			
Pernettya — Torfmyrte — Ericaceae. ◑ △ # ♣ ∧			
mucronata *Gaud.* (P. phillyreaefolia *DC.*) . . . . 20—30 cm hoch	1.50	13.50	120.—
30—40 » » Strauch, reichverzweigt, immergrün, ausläufertreibend, B. klein, eilanzettlich, stachelspitzig, glänzend dunkelgrün, Myrtenersatz, Bl. weisslich, Fr. rot. Chile, bis 50 cm, V—VI.	2.—	18.—	150.—
» **alba** *Davis* . . . . 15—20 cm hoch Form mit reichem Ansatz schneeweisser Früchte.	1.50	13.50	—
» **coccinea** *Davis* . . . . 20—30 cm hoch Form mit leuchtend hellroten Früchten.	1.50	13.50	—
30—40 » »	2.—	18.—	—
» **purpurea** *Davis* . . . . 20—30 » » Form mit prächtig violettpurpurnen Früchten.	1.50	13.50	120.—
30—40 » »	2.—	18.—	150.—
» **rosea** *Davis* . . . . 20—30 » » Form mit rosa Früchten.	1.50	13.50	120.—
30—40 » »	2.—	18.—	150.—
ⓐ **tasmanica** △ # ♣ ∧ . . . . **Neu!** 30—50 » » Zwergstrauch, an Gaultheria erinnernd oder Oxycoccus, immergrün, niederliegend, wurzelnd, Trieb hellgrün, B. nur bis 5 mm lang, 2—3 mm breit, dicklich, spitz, Bl. weiss, unauffällig, Fr. weisslich, rosa bis korallenrot, auffallend gross, bis 9 mm Durchmesser. Neuseeland, 5 cm, V—VI.	2.50	—	—
Perowskia — Labiatae. ♄			
abrotanoides *Karol.* ○ △ . . . . **NEU! m. Tb.** Halbstrauch, Zweige grün, B. doppelfiederschnittig zerteilt, graugrün, stark aromatisch, Bl. in langen, endständigen Ähren, hellblau. Bis 1 m, VIII.	3.—	—	—
atriplicifolia *Benth.* ○ △ . . . . **m. Tb.** Halbstrauch, Zweige schlank, weisswollig, B. silbergrau, stark aromatisch, Bl. in langen Ähren violettblau, Kelch violett behaart. Himalaja, bis 1 m, VIII—IX.	3.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Phellodendron — Korkbaum — Rutaceae.			
amurense *Rupr.* . . . . Hochstämme 12—14 cm Umfang Baum, laubabwerfend, breitkronig, mit korkiger, grauer Rinde, B. gefiedert, 25—40 cm lang, stark aromatisch, oberseits dunkelgrün, unterseits blaugrün, Bl. unansehnlich, grüngelb, Fr. kugelig, schwarz, erbsengross, B. früh abfallend. Mandschurei, 15—18 m, VI.	3.—	—	—
japonicum *Maxim.* . . . . Hochstämme 14—16 cm Umfang Baum, laubabwerfend, buschig, Rinde dunkelbraun, nicht korkig, feiner als bei Ph. amurense, B. gefiedert, aromatisch, Fiederchen 9—13, oben stumpfgrün, unterseits zottig behaart, B. viel länger haftend als die von Ph. amurense. Mitteljapan, bis 10 m, VI.	4.—	—	—
Philadelphus — Falscher Jasmin — Saxifragaceae.			
Billiardi *Koehne* (P. pubescens × cordifolius, P. insignis *Carr.*) . . . . . . Strauch, laubabwerfend, starkwachsend, sehr reichblühend, B. breit eiförmig, oberseits glänzendgrün, unterseits etwas zottig behaart, Bl. reinweiss, bis 3 cm Durchmesser, becherförmig, rispig, wenig duftend. Wertvoller Spätblüher. WN-Amerika, bis 4 m, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
californicus *Benth.* . . . . Strauch, laubabwerfend, Triebe stark, tiefrot, B. breitoval, glänzend sattgrün, Bl. weiss, bis 2,5 cm breit, geruchlos. Kalifornien, bis 3 m, VI—VII.	—.60	5.—	—
coronarius *L.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. 5—8 cm lang, schmal eiförmig bis länglich, unterseits graugrün, Bl. rahmweiss, stark duftend, in 6—8blütigen Trauben. Steiermark, Italien, Südrussland, 1—2 m, V—VI.	—.60	5.—	—
» **aureus** *Rehd.* . . . . Form mit schön goldgelbem Austrieb, später gelblichgrün.	—.80	—	—
Delavayi *Henry* . . . . Strauch, laubabwerfend, kräftig und hochwachsend, Triebe dick, anfangs rötlichbraun, bereift, später grau. Austrieb bronzefarbig, B. gross, leicht herzförmig bis oval, mit lang ausgezogener Spitze, dick, oberseits matt dunkelgrün, weichhaarig, unterseits fast weissfilzig, Bl. 3—4 cm breit, sehr stark duftend, Knospe rosa, später reinweiss. Yunnan, bis 5 m, V—VI.	—.80	7.—	—
Falconeri *Sarg.* (P. coronarius × laxus?) . . . . Strauch, laubabwerfend, Zweige rotbraun, schlank übergeneigt, B. eilanzettlich, hellgrün, Bl. in wenigblütigen Trauben, reinweiss, kurzgestielt, 3—4 cm Durchmesser, mit schmalen, zugespitzten und gewellten Petalen, daher sternförmig, leicht duftend. Hybride?, 2—3 m, VI.	—.60	5.—	45.—
gloriosus *Bead.* . . . . Strauch, laubabwerfend, sehr stark wachsend, B. gross, Bl. gross, weiss.	—.60	5.—	—
Gordonianus *Ldl.* ● . . . . Strauch, laubabwerfend, starkwachsend, B. eirund, beiderseits behaart, Bl. reinweiss, kugelig, glockig, in bis 9blütigen Trauben, bis 4 cm Durchmesser, reichblühend. WN-Amerika, über 3 m, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
grandiflorus *Willd.* ● . . . . Strauch, laubabwerfend, B. 4—7 cm lang, auffallend gelbgrün, Ränder leicht hoch gebogen, Bl. sehr gross, einfach, weiss, bis 5,5 cm Durchmesser, stark duftend, meist in der Form viereckig, sehr reichblühend. SO-Nordamerika, bis 3 m, Mitte VI.	—.60	5.—	45.—
hirsutus *Nutt.* . . . . Strauch, laubabwerfend, von gefälligem, breitem Wuchs, Trieb dicht rauh behaart, B. breitoval, stumpfgrün, unterseits grauzottig behaart, Bl. zierlich, schneeweiss, duftlos, einzeln oder zu dreien an Kurztrieben, 2—3 cm Durchmesser. SO-Nordamerika, bis 1,5 m, Anfang VI.	—.60	5.—	45.—
latifolius *Schrad.* . . . . Strauch, laubabwerfend, starkwüchsig, B. spitz eielliptisch, unterseits dicht grau behaart, Bl. bis 6 cm breit, milchweiss, stark duftend, in langen, locker besetzten Trauben. Tennessee, Alabama, bis 3 m, VI.	—.60	5.—	45.—
laxus *Schrad.* . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs überhängend, B. 3—6 cm, etwas hängend, eilanzettlich, unten striegelhaarig, gezähnelt. Bl. sehr gross, duftlos, bis 4 cm Durchmesser. Georgia, bis 1,5 m, Anfang VI.	—.60	5.—	—
Lemoinei Albâtre *Lem.* (Alabaster) . . . . Form ähnlich „Virginal“, sehr reichblühend, Bl. reinweiss gefüllt, in dichter Rispe. Zweige zierlich überhängend.	—.70	6.—	55.—
» **Belle Etoile** *Lem.* (Schöner Stern) . . . . Form von üppigem Wuchs, sehr blühwillig, Bl. sehr gross, einfach, gut geöffnet, milchweiss mit purpurrosa Mitte.	—.70	6.—	55.—
» **Bicolore** *Lem.* . . . . Form mit schön ausgebildeten Bl., weiss mit karminrotem Fleck am Grunde der Petalen.	—.70	6.—	55.—
» **Boule rose** *Lem.* (Rosenkugel) . . . . Form mit halbgefüllten Bl., weiss mit rosa Mitte, wohlriechend.	—.70	6.—	55.—

Philadelphus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lemoinei Candelabre *Lem.* △ . . . . . . Form mit grossen, gefüllten, reinweissen Bl., wohlriechend und reichblühend.	—.80	—	—
» **Conquête** *Lem.* . . . . . . Form mit dünnen, biegsamen Zweigen, Bl. gross, gefüllt, wohlriechend, reichblühend.	—.80	—	—
» **densiflorus** *Lem.* (Ph. Avalanche *Lem.*) . . . . . . Form mit bogig überhängenden Blütenzweigen, Bl. dichtstehend, gross, milchweiss, einfach, flach, bis 3,5 cm Durchmesser, wohlriechend, reichblühend.	—.70	—	—
» **Dresden** *Löbn.* (P. Lemoinei erectus × latifolius) . . . . . . Form von niedrigem, buschigem Wuchs, B. ziemlich gross, Bl. einfach schneeweiss, sehr blühwillig.	—.80	7.—	—
» **Enchantement** *Lem.* (Zauber) . . . . . . Form mit langen, aufgerichteten Zweigen, Bl. weiss gefüllt, in dichten Trauben. Verbesserte „Bouquet blanc".	—.70	6.—	55.—
» **erectus grandiflorus** (Ph. Montblanc *Lem.*) . . . . . . Form des straff aufrechtwachsenden P. erectus, Bl. grösser, weiss, wohlriechend, bis 2 m, Mitte VI.	—.60	5.50	50.—
» **Favourite** *Lem.* (Liebling) △ . . . . . . Form mit einfachen Bl., reinweiss, bis 7 cm breit, mit auffallend gelben Staubgefässen.	—.80	7.—	—
» **fimbriatus** *Lem.* △ ♗ . . . . . . Form mit bogigen Zweigen, bedeckt mit grossen, weissen, einfachen Bl. mit gedrehten Petalen, tief sägeartig eingeschnitten. Nur 70—80 cm hoch werdend.	—.80	7.—	—
» **Girandole** *Hort. Lem.* (Apotheose) . . . . . . Form von schön gedrungenem Wuchs, Bl. dicht gefüllt, milchweiss, in dichten Trauben entlang den Zweigen, bis 5 cm Durchmesser, schon als junge Pflanze auffallend blühwillig.	—.80	7.—	—
» **Glacier** *Lem.* (Gletscher) . . . . . . Form von aufrechtem Wuchs, Bl. ziemlich klein, milchweiss, gefüllt, in 5—7blütigen, dichten Trauben, spätblühend.	—.70	6.—	—
» **Norma** *Lem.* . . . . . . Form von straffem Wuchs, Bl. einfach, 5—6 cm breit, öfters halbgefüllt, reinweiss, Petalen leicht zurückgebogen, etwa 1,5 m hoch.	—.70	6.—	55.—
» **ochroleucus** *Hort.* (Manteau d'Hermine = Hermelinmantel) . . . . . Form von buschigem Wuchs, nur mässig hoch, Bl. halb- bis gefüllt, rahmweiss, ziemlich klein, fast geruchlos, 3 cm Durchmesser, in kleinen, wenigblütigen Trauben, aber sehr zahlreich. VII.	—.60	5.—	—
» **plenus** *Hort.* (Boule d'Argent = Silberkugel) . . . . . . Form von niedrigem, buschigem, dünntriebigem Wuchs, sehr reichblühend, Bl. gut gefüllt, etwa 3,5 cm Durchmesser, rahmweiss, sehr wohlriechend, in kleinen, wenigblütigen Trauben.	—.80	—	—
» **Sylviane** *Lem.* . . . . . . Form mit sehr grossen, edlen, einfachen Bl., schön offen, mit breiten Petalen, weiss, im Grunde zartrosa getönt.	—.80	7.—	—
» **Virginal** *Hort. Lem.* (Jungfrau) (P. virginalis *Lem.*) . . . . . . Form, starkwachsend mit hübschen, dunkelgrünen B., Bl. bis 6 cm gross, gut gefüllt, reinweiss, zu 5—7 in grossen Blütentrauben entlang der Zweige. Sehr reichblühend, Duft mässig stark. Remontiert oft im Herbst, dann aber mit einfachen Bl.	—.70	6.—	55.—
» **Voie lactée** *Lem.* (Milchstrasse) (Ph. microphyllus × nepalensis) . . Form mit grossen, flachen, milchweissen Bl., bis 7 cm breit, Staubbeutel lebhaft goldgelb, sehr edle Form.	—.80	7.—	—
Magdalenae *Koehne* . . . . . . Strauch, laubabwerfend, buschig, junge Triebe behaart, B. behaart, eilanzettlich, Nerven unterseits leuchtend rot, Bl. weiss, kreisrund, etwas glockig nickend, duftlos, 2,5 cm breit, reichblühend. Westchina, 3 m, VI.	—.70	6.—	55.—
microphyllus *A. Gr.* △ ♗ . . . . . . Strauch, laubabwerfend, von niedrigem Wuchs, dicht, feinzweigig, B. klein, spitzoval, Bl. klein, weiss, spitzpetalig, wohlriechend. Kalifornien, bis 75 cm, V—VI.	1.—	9.—	—
nivalis *Hort.* (Ph. pubescens × coronarius) . . . . . . Strauch von üppigem Wuchs, laubabwerfend, Bl. in bis 11blütigen Trauben, weiss, bis 5 cm breit, duftend, flach becherförmig, sehr reichblühend. Hybride, bis 3 m.	—.60	5.—	45.—
» **spectabilis plenus** *Hort.* (Ph. nivalis plenus *Rehd.*) . . . . . . Form mit gefüllten Bl., schneeweiss.	—.60	5.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Philadelphus (Fortsetzung):			
nivalis subplenus *Hort.* . . . . Form von dichtbuschigem Wuchs, B. dunkelgrün, Rand gezähnt, Bl. milchweiss, 3—4 cm breit, halbgefüllt, sehr wohlriechend, in wenigblütigen, beblätterten Trauben.	—.60	5.—	45.—
pekinensis *Rupr.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. ziemlich klein, sehr spitz, oberseits dunkelgrün, runzlig, unterseits graugrün, Blattstiele purpurn, Bl. rahmweiss, leicht duftend, bis 3 cm breit, in bis 9blütigen, dichten Trauben. NW-China bis Korea, bis 2 m, VI.	—.60	5.—	—
» **kansuensis** *Rehd.* (Rock Nr. 13687) . . . . Form mit stärker rauhhaarigen B., sonst wie die Art.	—.60	—	—
pubescens *Loisl.*, ● . . . . Strauch, laubabwerfend, Holz im Winter fast weiss, B. stark weissgrau behaart, Bl. einfach, milchweiss, bis 6 cm breit, sehr wohlriechend, reichblühend. Amerika, 3—4 m, VI.	—.60	5.—	45.—
Satsumi *Sieb.* . . . . Strauch, laubabwerfend, mit graubraunen, aufreissenden Zweigen, B. breiteiförmig, lang zugespitzt, Bl. reinweiss, 3 cm breit, duftend, in 5—11blütigen, lockeren Dolden. Japan, bis 2,5 m, VI.	—.60	—	—
» **Yokohamae** *Hort.* . . . . Form, kräftig wachsend, schlank, B. langoval, an Blütentrieben fast lanzettlich, Bl. meist fünfblütig, kurz und dichtgedrängte Trauben, milchweiss, bis 3,5 cm breit, geruchlos, Mitte VI.	—.60	5.—	45.—
sericanthus *Koehne* . . . . Strauch, laubabwerfend, mit rotblau bereiften, jungen Trieben, straff aufrecht, B. länglich, Bl. nach Heu duftend, weiss, in 5—9blütigen Trauben. China, bis 4 m, VI.	—.60	5.—	—
» **Rehderianus** *Koehne* . . . . Form mit grösseren B., sonst wie die Art.	—.60	5.—	—
tomentosus *Wall.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. jung beiderseits dicht filzig behaart, Bl. mittelgross, rahmweiss, zu 5—7 in Trauben, gut duftend. Himalaja, bis 2 m, VI—VII.	—.60	5.—	—
undulatus *Hort.*, ● . . . . Strauch, laubabwerfend, locker wachsend, schlank überhängend, B. graugrün, an den Zweigen nahezu anliegend, Bl. sehr zahlreich, milch- oder rahmweiss, bis 4 cm breit, glockig, gut duftend, in kurzen, vielblumigen Trauben. Ab Mitte VI.	—.60	5.—	—
verrucosus *Schrad.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. ziemlich schmal, stark gezähnt, Bl. zu 5—7, etwa 3 cm breit. Illinois, bis 3 m, Mitte bis Ende VI.	—.60	5.—	—
Zeyheri *Schrad.* (P. coronarius × inodorus oder grandiflorus) . . . . . . Hybride, starkwachsend, Zweige tiefbraun, grossblättrig, sehr reichblühend. Bl. bis 7 mm gestielt, 5 cm breit, von fast quadratischer Form, milchweiss, in dichten Trauben, sehr wohlriechend. Hybride, bis 3 m, VI.	—.60	5.—	45.—
Phillyrea — Steinlinde — Oleaceae. #			
latifolia *L.* ∧ . . . . mit Ballen 60—80 cm hoch. Strauch, immergrün, sparrig verästelt, B. dicklederartig, 1—5 cm lang, breit eiförmig, gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits mattgrün, Bl. grünlichweiss, Fr. fast kugelig, blauschwarz. Mittelmeergebiet, dort baumartig, V—VI.	2.50	—	—
myrtifolia *Hort.* ∧ . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch. Strauch, immergrün, von sehr dichtem Wuchs, B. klein, bis 3 cm lang, 1 cm breit, schön dunkelgrün. Gartenform.	2.50	22.50	—
Vilmoriniana *Boiss. & Ball.* (Ph. decora *Boiss. & Bal.*, P. laurifolia *Hort.*) ◑ mit Ballen 60—80 cm hoch. Strauch, immergrün, von geschlossenem Wuchs, Zweige in der Jugend olivgrün, später aschgrau, B. bis 16 cm lang und bis 5 cm breit, meist ganzrandig, oberseits glänzendgrün, unterseits gelblichgrün, lorbeerartig, krankheitsfrei, Bl. klein, achselständig, hübsch weiss, duftend, Fr. olivenartig, rot bis schwarzpurpurn. Kaukasus, bis 3 m, IV—V.	2.50	22.50	—
Photinia — Kirschenmispel — Rosaceae.			
villosa *DC.* (Sorbus villosa *Zbl.* Pourthiaea villosa *Dcne.*) ✿ ⊘ 60—80 cm hoch. Strauch oder baumartig, laubabwerfend, B. verkehrt eiförmig, dunkelgrün, unterseits hellgelbgrün, zottig behaart, Bl. weiss in lockeren Doldentrauben, Fr. scharlach, lange haftend, bis 8 mm Durchmesser. Japan, Korea, China, bis 5 m, VI.	—.80	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Phyllodoce — Moosheide — Ericaceae.			
taxifolia *Salisb.* (**Bryanthus taxifolius** *Gray*, P. coerulea *Bab.*) **Taxusblättrige Moosheide** ◑ △ ♯ . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, heideähnlich, B. linealpfriemlich, frischgrün, Bl. krugförmig, zu 2—6 am Ende der Triebe, leuchtend bläulich purpurn. Europa, Amerika, Asien, bis 20 cm, VII.	1.75	16.—	—
Physocarpus — Blasenspiere — Rosaceae.			
amurensis *Maxim.* . . . . Strauch, laubabwerfend, B. eiförmig bis 5lappig, bis 10 cm lang, sehr früh austreibend, Bl. weiss, in halbkugeligen, mehrblütigen Doldentrauben. Amurgebiet, bis 3 m, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
intermedius parvifolius *Rehd.* ♗ . . . . Form, dichtzweigig, aufrecht, B. klein, saftig glänzendgrün, Bl. klein, rosa, in dichten Büscheln. Sehr reichblühend. Gartenform, 1 m, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
opulifolius *Raf.* ● **Fasanenfutter!** . . . . Strauch, laubabwerfend, stark- und hochwachsend, Zweige längsrissig, später abblätternd, B. herzförmig rundoval, 2—7 cm Durchmesser, 3lappig, kerbzähnig, Bl. gelblichweiss. ON-Amerika, bis 4 m, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
» **luteus** *Kirch.* . . . . Form mit im Austrieb goldgelben B., später hellgrün, im ganzen etwas schwächer wachsend als die Art.	—.60	5.—	—
pauciflorus *Piper* (Ph. malvaceus *Ktze.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, ähnlich Ph. opulifolius, aber von langsamem Wuchs, B. und Blütenstände kleiner. Amerika, bis 2 m, VI—VII.	—.60	—	—
Torreyi *Maxim.* (**Neillia Torreyi** *Wats.*) △ . . . . Strauch, laubabwerfend, Wuchs überhängend, B. sehr klein, 1,5—3,5 cm, 3—5lappig, ähnlich Ribes alpinum, B. weiss, 5—10blütig in kleinen Dolden. Amerika, bis 80 cm, V—VI.	—.60	5.—	—
Picrasma, siehe Rhus.			
Pieris, siehe Andromeda.			
Pirus, siehe Malus.			
Pittosporum — Klebsame — Pittosporaceae.			
heterophyllum *Franch.* ○ △ ♯ ∧ . . . . . . 20—30 cm hoch **m. Tb.** Strauch, immergrün, etwas niederliegend, B. oval, zugespitzt, glänzendgrün, Bl. lichtgelb, an Kurztrieben. Westchina, bis 80 cm, VII.	2.—	—	—
Plagiospermum, siehe Prinsepia.			
Planera, siehe Zelkowa.			
Platanus — Platane — Platanaceae.			
acerifolia pyramidalis *Schneid.* ♗ . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Form der Hybride P. occidentalis × orien- » 10—12 » »	3.50	31.50	—
talis, mit aufrechtem, pyramidalem Wuchs, » 12—14 » »	4.—	36.—	—
laubabwerfend, Rinde abblätternd, B. hell- » 14—16 » »	4.50	40.—	—
grün, kaum über 15 cm breit, kahl, kurz 3lappig, Fr. kugelig zu 1—2, bis 4 cm dick. Altbewährter Strassenbaum. Bis 35 m.			
Polygala — Kreuzblume — Polygalaceae.			
Chamaebuxus *L.* **Buchsbaum-Kreuzblume** △ ♯ [K] . . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, an Vaccinium erinnernd im Wuchs, B. klein wie Buchs, Bl. gelbweiss, leguminosenartig. Mitteleuropa, bis 20 cm, IV—VI fast immerblühend.	1.—	9.—	80.—
Vayredae *Costa* ○○ △ ♯ [K] . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, niederliegend, ausgebreitet, B. schmallineal, glänzend, Bl. sehr zahlreich, wie kleine Schmetterlinge, mit karminroten Flügeln und goldenem Leib. Treibt unterirdische Ausläufer. Spanien, bis 10 cm, VI—VII.	1.50	—	—
Polygonum, siehe unter „Stauden“ und „Schlingpflanzen“.			
Populus — Pappel — Salicaceae. ♗ ♗			
alba Bolleana *Lauche* (P. alba pyramidalis *Bge.*) ≃ Pyramiden 150—200 cm hoch Form der Silber- oder Weisspappel, Wuchs streng pyramidal, B. unterseits weiss weichfilzig, oberseits dunkelgrün, bis 20 m.	2.—	—	—
» **nivea** *Hort.* ≃ . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang Form der Silberpappel, B. oberseits jung graufilzig, später glänzend dunkelgrün, unterseits ganz auffallend schneeweiss, für tiefgründigen Boden in feuchter Lage, bis 30 m.	2.50	22.50	—

Populus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
angulata cordata robusta *Sim.-L.* . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	160.—
Männliche Form der P. angulata *Ait.* von » 8—10 » »	2.50	22.50	200.—
besonders kräftigem, schnellem Wuchs, B. » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
hellgrün, Zweige kantig.			
angustifolia *James* ≌ . . . . 200—250 cm hoch	1.50	—	—
Balsampappel von weidenartigem Aussehen und pyramidalem Wuchs, B. 4—8 cm lang, 3—4 cm breit, dunkelgrün. Amerika, bis 20 m.			
berolinensis *Dipp.* (P. laurifolia × nigra) . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Hybride von breit pyramidalem Wuchs, B. » 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
dunkelgrün, Zweige rundlich, gelbgrau, schöner Strassenbaum, bis 25 m.			
canadensis *Moench.* (P. balsamifera × nigra) Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	—
Bekannter, hoher, starkwüchsiger und anspruchsloser Baum, für Strassenbepflanzung.			
» **betulifolia** *Koehne* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	—	—
» **laevigata** *Ait.* (P. balsamifera × nigra) Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	—
Hybride von starkem Wuchs, schlank aufstrebend, B. fast wie die von P. nigra, im Johannistrieb mehr wie die von P. balsamifera. Bis 40 m.			
candicans *Ait.* (P. balsamifera candicans *Gray.*) Ontariopappel			
Breitkroniger Baum, B. gross, dicklederig, Heister 150—200 cm hoch	1.—	9.—	80.—
unterseits auffallend graugrün. Nord- » 200—250 » »	1.20	11.—	100.—
amerika, bis 30 m.			
(N) **Carreiriana** *Dode* . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	—	—
Noch neuere, seltene Art mit leicht blaugrauem Schimmer auf dem Laub, B. an der Basis fast gerade, dicht kerbig sägezähnig, an jungen Trieben kraus, Triebe stark kantig.			
caudina *Ten.* (P. sizilica) . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	—
B. mehr rhombisch, Spitze lang ausgezogen, oberseits frischgrün, unterseits heller, Rand kerbig gesägt, sehr elegant. Italien.			
charkowiensis *Schwed. & Hitsch.* . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	16.—	—
Baum von aufstrebendem, aber etwas breiterem Kronenbau als die Pyramidenpappel, viel stärker wachsend, die langen Blattstiele gerötet. Amerika.			
Eucalyptus *Hort.* (P. balsamifera *L.* ♀) . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	—	—
Baum sehr starkwüchsig, B. breit, Holz gelblichgrün.			
generosa *Henry* (P. angulata × trichocarpa) . . . . . . 250—300 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	—	—
Hybride von auffallend schnellem Wachstum, B. oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits blaugrün, herzförmig, gross, mit durchscheinenden Rändern, grob gesägt.			
(N) **incrassata** *Dode* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.75	—	—
Baum mit kurzen Ästen, B. schön herzformig, gross, Triebe kantig, der P. angulata sehr nahestehend, starkwüchsig.			
koreana *Rehd.* . . . . **NEU!** Heister 120—150 cm hoch	1.50	13.50	—
Baum von eigenartiger Schönheit, » 150—200 » »	1.75	16.—	—
Wuchs pyramidal, früh austreibend, Hochstämme 16—18 cm Umfang	4.—	—	—
B. gross, oberseits glänzendgrün, Mittelrippe auffallend rot, unterseits fast weiss, länglichoval, 7—15 cm lang, bis 8,5 cm breit. Junge Triebe klebrig drüsig. Korea, bis 25 m.			
(N) **lasiocarpa** *Oliv.* . . . . 80—120 cm hoch	1.20	11.—	—
120—150 » »	1.50	13.50	—
Baum von pyramidalem Wuchs, B. sehr gross, eirund, herzförmig, 15—30 cm Durchmesser, graugrün, Stiel und Nervatur rot, Austrieb dicht gelblich braunfilzig, später alles kahl, Triebe sehr stark, olivgrün mit unregelmässig langen, graugelben Lenticellen. China, bis 15 m			
nigra *L.* Schwarzpappel ≌ . . . . **Echt!** 200—250 cm hoch	1.50	13.50	125.—
Baum mit stielrunden Zweigen, eiförmiger Krone, B. beiderseits glänzend grün. Für tiefgründigen, feuchten Boden. Europa, bis 30 m.			
» **fastigiata** *Desf.* (P. nigra italica *Dur.*) ≌ Italienische Pyramidenpappel			
Form der Schwarzpappel, mit Pyramiden 200—250 cm hoch	2.25	20.—	180.—
pyramidalem, säulenförmigem » 250—300 » »	2.75	25.—	230.—
Wuchs, B. beiderseits glänzend- » 300—350 » »	3.—	27.50	250.—
grün, bekannter Strassen- und Solitär- » 450—500 » »	6.—	—	—
Alleebaum, bis 30 m.			
» **fastigiata plantierensis foemina** *Hort.* Pyramiden 120—150 cm hoch	1.20	11.—	—
Form der Pyramidenpappel mit langgestielten, breit dreieckigen B. Wüchsig.			
» **fastigiata plantierensis mascula** *Hort.* Pyramiden 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Form der Pyramidenpappel mit auffallend kleinen B. Wüchsig.			
Przewalskii *Maxim.* (P. suaveolens Przewalski *Schneid.*)			
Form der wohlriechenden Pappel, B. unter- Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	—	—
seits weiss, stärker behaart als die Art. » 300—350 » »	2.50	—	—
NW-China, Tibet, bis 30 m.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Populus (Fortsetzung):			
Roegneriana *Hort.* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang Sehr wüchsig, ziemlich grossblättrig, langgestielt, sehr früh austreibend.	1.75	—	—
rosea *Dode* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang Baum, wohl Hybride zwischen amerikanischer und europäischer Art mit rosa Petiolen. Nordamerika.	1.75	—	—
Simoni *Carr.* Chinesische Pappel . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang Baum, frühaustreibend, schnellwüchsig mit pyramidalen bis kugeligen Kronen, Zweige kantig, B. kurzgestielt, oberseits lebhaftgrün, unterseits bläulich weissgrün, eielliptisch, 6—12 cm lang bei 3—8 cm Breite, lange am Baum haftend. Schöner Strassenbaum. China, 15—20 m.	2.—	18.—	—
» **fastigiata** *Schneid.* . . . . Pyramiden 100—120 cm hoch	1.50	13.50	—
» 150—200 » »	2.—	—	—
Form der chinesischen Pappel von streng pyramidalem Wuchs, schöner Ersatz für die italienische Pyramidenpappel, wegen des frühen Austriebs und des lange sitzenden Laubes empfehlenswert.			
szechuanica *Schneid.* . . . . 200—250 cm hoch Baum mit rötlichem Austrieb, Triebe scharfkantig, B. kurz rot gestielt, oberseits lebhaft grün, eilänglich, 11—20 cm lang, bei 5—11 cm Breite, an Prunus erinnernd, unterseits silbergrau, Adern gelbrot, Knospen gross, dick, mit lang ausgezogener, gekrümmter Spitze.	1.50	13.50	—
tremula *L.*, Zitterpappel, Aspe, Espe . . . . 80—100 cm hoch Baum mit rundlicher Krone, B. eirund, kerbig, mit sehr langem Stiel, junge Triebe und B. seidig behaart. Europa bis Orient, bis 30 m.	1.—	9.—	—
» **purpurea** *Sim.-L.* . . . . 80—100 cm hoch Rotblättrige Form der Zitterpappel, B. derb, oberseits rotoliv, 2—3 cm gestielt, unterseits blaurot.	1.—	9.—	—
trichocarpa *Torr. & Gray.* . . . . 200—250 cm hoch Baum mit lockerer Krone, B. oberseits glänzendgrün, unterseits weisslich, bis 16 cm lang und 8 cm breit. Nordamerika, bis 30 m.	1.50	13.50	—
Wilsonii *Schneid.* . . . . 80—120 cm hoch	1.50	13.50	—
200—250 » »	3.—	—	—
Baum von breit pyramidalem Wuchs, Holz glänzend, B. 8—20 cm lang und 7—16 cm breit, breit eiförmig, oberseits stumpfgrün, unterseits rötlich, teils fast rund oder herzförmig, Rand kerbzähnig, Blattstiele rötlich, leicht gerieft, bis 10 cm lang. Westchina, bis 25 m.			
Wislizenii *Sarg.* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang Baum breitkronig, B. dreieckig, kurz zugespitzt, oberseits hellgrün, an rötlich überlaufenden Trieben. SW.-Amerika.	1.75	16.—	—
yunnanensis *Dode* . . . . 80—120 cm hoch Baum mit lorbeerartig anmutendem Laub, oberseits saftiggrün, Rand scharf doppelt gesägt, leicht wellig, ovalelliptisch, unterseits silbrig mit grünlichgelber, deutlicher Aderung. Südchina.	1.20	11.—	—
Potentilla — Fünffingerstrauch — Rosaceae.			
dahurica *Nestl.* △ ∧ . . . . Strauch, dicht kissenartig, B. zu 5, lebhaft dunkelgrün, unterseits blaugrau, Bl. gelblich, einzeln. Nordchina, Sibirien, bis 30, V—VI.	1.50	13.50	120.—
Farreri *Hort.* . . . . **NEU!** Strauch von aufrechtem Wuchs, B. ziemlich klein, 7 blättrig, hellgrün, Bl. goldgelb. 80—100, VI—X.	—.80	7.—	60.—
fruticosa *L.* Gemeiner Fünffingerstrauch . . . . Strauch von aufrechtem Wuchs, dichtbuschig, B. graugrün, Bl. lebhaftgelb, wertvoll für Vogelschutz. Europa, Asien, Nordamerika, bis 150, V—X.	—.60	5.—	45.—
» **albescens** *Hort. Gibbs.* . . . . Form von buschigem Wuchs, Holz glänzenddunkelgrün, B. dunkelgrün, Bl. weiss, sehr lebhaften Kontrast mit den B. bildend. 50—80, V—X.	—.80	7.—	60.—
» **Friedrichsenii** *Rehd.* (P. dahurica × fruticosa) . . . . Hybride, groblaubig, unterseits bläulich, Bl. hellgelb, Rückseite heller. Bis 1,5 m, V—IX.	—.80	—	—
» **mandschurica** *Maxim.* △ . . . . 30—40 cm hoch und breit Form von übergebogen niedergestrecktem Wuchs und sehr frühem Austrieb, deshalb gegen Frühlingssonne schützen. B. graugrün, Bl. reinweiss. Mandschurei, bis 50, VII—X.	—.80	7.—	60.—
» **micrandra** *Schneid.* △ . . . . Form von niedrigem, breitgehendem Wuchs, B. mattgrün, Bl. tiefklar kanariengelb, sehr reichblühend. Bis 50, V—VIII.	—.80	7.—	—
» **ochroleuca** *Bean.* . . . . Form im Wuchs wie die Art, B. hellgrün, Bl. crême gefärbt.	—.80	7.—	60.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Potentilla (Fortsetzung):			
fruticosa parvifolia *Wolf.* . . . . Form ziemlich kleinlaubig, Bl. schwefelgelb.	—.80	7.—	60.—
» **Purdomii** *Rehd.* . . . . NEU! Neuere Einführung aus China, B. leicht graublau, Bl. blassgelb in reicher Fülle.	—.80	7.—	60.—
» **Veitchii** *Bean.* (P. Veitchii *Wils.*) Δ . . . . Form von dichtem Wuchs, B. graugrün, Bl. schneeweiss, sehr reichblühend. Bis 100, V—X.	—.80	7.—	60.—
» **Vilmoriniana** *Komar.* . . . . Form von aufrechtem Wuchs und dicht zottig behaarten Trieben, B. oberseits wie unterseits silberweiss behaart, Bl. bleichgelb oder crème bis fast weiss. Bis 100.	1.50	—	—
Prinsepia (Plagiospermum) — Rosaceae.			
uniflora *Batal.* . . . . 30—40 cm hoch Strauch von buschigem Wuchs und hellgrauen Zweigen, B. schmal-länglich, leicht gesägt, dunkelgrün, Bl. weiss, Fr. schwarz, bereift. NW-China, bis 1,5 m, IV—V.	1.50	13.50	—
Prunus — Kirsche und Pflaume — Rosaceae.			
acida plena . . . . Büsche 40—60 cm hoch	1.—	9.—	80.—
» 60—80 » »	1.20	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	13.50	—
» » » » 140—160 »	1.75	16.—	—
Form der Sauerkirsche mit schön dichtgefüllten, weissen Bl. an langen Stielen. V.			
americana *Marsh.* . . . . 60—80 cm hoch Baumartiger Strauch. Bl. klein, weiss, Fr. kirschgross, lebhaft rot. Amerika, bis 6 m, V.	1.—	9.—	—
avium plena *Schneid.* . . . . Büsche 60—80 cm hoch	1.20	11.—	—
» 80—100 » »	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.75	—	—
» » » » 140—160 »	2.—	—	—
Form der heimischen Vogelkirsche mit schön geformten, dicht gefüllten, reinweissen Bl. zu dreien an langen Stielen. V.			
blireiana plena *André* (Pr. Pissardi × Mume roseiplena) 80—120 cm hoch B. purpurrot, Bl. gefüllt, hellrosa, in Form und Farbe an Pr. triloba plena erinnernd. IV.	1.20	11.—	100.—
caproniana ranunculiflora plena *Hort.* . . . Büsche 60—80 cm hoch	1.20	11.—	—
» 100—120 » »	1.50	13.50	—
Form der Sauerkirsche mit halbgefüllten, mattweissen Bl., B. mehr nach Pr. avium gehend.			
Conradinae *Koehne* . . . . 60—80 cm hoch Baum mit fuchsroten bis grauen Trieben, B. fast herzförmig, doppelt gesägt, 10 × 5,5 cm gross, Bl. zu dreien, weiss, etwa 2 cm Durchmesser, Petalen eingeschnitten und ausgenagt gezähnt. China, bis 8 m, V.	1.20	—	—
dasycarpa salicifolia *Hort.* . . . . Büsche 80—100 cm hoch Form der Pflaumenaprikose mit schmalen, am Rande gekrausten B., Bl. weiss, 3 cm gross. IV.	1.20	11.—	—
graeca *Desf.* (Pr. Fontanesiana, P. avium × Mahaleb) Büsche 20—40 cm hoch Kleiner Baum mit ausgebreiteten Ästen und behaarten, graubraunen Zweigen, B. kleiner und breiter als bei Pr. avium, Bl. einfach weiss, zu 4—10, fast traubig, mit der Entfaltung der B., Fr. klein, bitter. IV.	1.20	—	—
japonica alba plena *Lem.* (P. sinensis alba plena, Pr. glandulosa alba plena) . . . . Sträucher Feinzweigig und reichblühender Strauch, Bl. weiss, gut gefüllt, bis 3 cm Durchmesser und bis 2 cm lang gestielt, Kelchzipfel fein gesägt, waagerecht oder zurückgeschlagen.	1.20	11.—	—
» **gracillima** *Koehne* . . . . Sträucher Form mit ausgebreitet überhängenden Zweigen, B. im Grunde herzförmig, lang zugespitzt, an der Spitze besonders lang gezähnt, Bl. einfach weiss.	1.20	11.—	—
» **rosea plena** *Hort.* . . . . Sträucher Form mit rosa gefüllten Bl.	1.20	—	—
Lannesiana Miyako *Wils.* . . . . 60—80 cm hoch Form einer japanischen Zierkirsche, Bl. gefüllt, weiss mit rosa Hauch, sehr spätblühend, duftend.	1.50	—	—
Laurocerasus *L.* **Kirschlorbeer** ● ♯ . . . . . 40—60 cm hoch Strauch oder baumartig, immergrün, B. glänzend, lebhaft dunkelgrün, als Zwischenpflanzung bei Koniferen und als Kübelpflanzen wertvoll. SO-Europa, Orient, Transkaukasien, bis 6 m, VII.	2.—	18.—	—

Prunus (Fortsetzung):

	Höhe	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
⊛ **Laurocerasus magnoliaefolia** *Hort. Gibbs.* # . Form mit auffallend grossen, glänzend hellgrünen B. oft bis 25 cm lang und 10 cm breit.	30—50 cm hoch	2.—	18.—	—
» **parvifolia** *Nichols.* # . . . . Kleinblättrige Form, 3—4 cm lang bei 1 cm Breite.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
» **rotundifolia** *Nichols.* # . . . . Form mit etwas kürzeren und daher rundlicheren B. als die Art.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
	40—60 » »	2.—	18.—	—
	125—150 » »	6.—	—	—
» **schipkaënsis** *Späth* # . . . . Strauch, immergrün, von zuverlässiger Winterhärte, B. lanzettförmig, schmal, dunkelgrün, Bl. weiss, in aufrechten, dichten Trauben. Bulgarien, bis 2 m, V.	30—40 » »	1.50	13.50	—
	40—50 » »	2.—	18.—	—
» » **compacta** *Klenert* # . . . . Form von dichtem, niedrigem, breitgehendem Wuchs, hart und blühwillig.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	120.—
» » **Mischeana** *Späth* # . . . . Form mit schräg aufstrebenden Zweigen mit kurzen, ovalen B. dicht besetzt.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
	40—50 » »	2.—	18.—	—
» » **Reynvanii** *Hort.* # . . . . Form von kompaktem Wuchs und grosser Widerstandsfähigkeit, B. schmal, dunkelgrün, reicher Blütenansatz.	30—40 » »	1.50	13.50	120.—
	40—60 » »	2.—	18.—	—
» » **rufescens** *Klenert* . . . . Form mit braunrötlichem Austrieb, B. verkehrt lanzettförmig, später glänzend dunkelgrün.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
» » **Zabeliana** *Spaeth* # . . . . Form von zierlichem Wuchs, B. weidenähnlich, länglich-lanzettlich, an schlanken, schräg aufstrebenden Zweigen. Sehr hart.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
	40—60 » »	2.—	—	—
» **serbica** *Pančić* . . . . Niedrigbleibende Form mit breiten, dunkelgrünen B.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
	60—80 » »	2.50	—	—
lusitanica *L.* **Portugiesischer Kirschlorbeer** # . . . . Baumartiger Strauch, immergrün, B. lorbeerartig, eiförmig spitz, sehr dunkel und glänzendgrün, ziemlich gleichmässig eng gezähnt, Bl. in lockeren milchweissen Trauben, endständig, 15—20 cm lang, wohlriechend. Spanien, Portugal, bis 20 m, VI.	40—60 cm hoch	2.—	18.—	—
	60—80 » »	2.50	—	—
	80—100 » »	3.—	—	—
» **pyramidalis** *L.* ♙ # . . . . Wuchsform von dichtpyramidalem Bau mit kleineren, ganz dunkelgrünen B. Als Kübelpflanze sehr wertvoll.	30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
	40—60 » »	2.—	18.—	—
	60—80 » »	2.50	22.50	—
	80—100 » »	3.—	27.—	—
	100—120 » »	4.—	—	—
» **variegata** *Nichols.* # . . . . **m. Tb.** Form mit weissbunten B., die meist klein und etwas unregelmässig geformt sind.	20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
Mahaleb *L.*, Weichselkirsche . . . . Strauch bis kleiner Baum, Holz wohlriechend, Triebe feinfilzig, leicht überhängend, B. breit- bis rundlich-eiförmig, 3—6 cm gross, glänzendgrün, Bl. weiss, duftend, in 6—10blütigen Doldentrauben, Fr. eiförmig, erst gelbrot, dann schwarz, sehr herb. Europa bis Turkestan, bis 10 m, IV—V.	Sträucher 60—100 cm hoch	—.50	4.50	40.—
monticola *K. Koch* . . . . Strauch, an Pr. Pissardi erinnernd, B. lebhaftgrün, glänzend, kurzgestielt, Bl. reinweiss, mit der Entfaltung der B., Fr. rot, bis 3 m, IV—V.	80—120 cm hoch	1.20	11.—	—
Myrobalana variegata *Hort.* . . . . Form der Kirschpflaume mit weissgezeichneten B.	70—100 cm hoch	1.20	11.—	—
orthosepala *Koehne*, Texanische Scheinpflaume . . . . Strauch mit glänzend rotbraunen Zweigen, B. schmal, graugrün, Bl. weiss in 3—4blütigen Büscheln, Fr. kugelig, bis 2,5 cm Durchmesser, blauschwarz, bereift. Hybride, bis 2 m, V.	70—100 » »	1.20	11.—	—
Padus *L.* Traubenkirsche ● ♣ . . . . Strauch oder baumartig, B. elliptisch bis breit verkehrt eiförmig, 6—12 cm lang, tiefgrün, unterseits blaugrau, Bl. weiss in bis 12 cm langen, lockeren, hängenden Blütentrauben, Holz eigenartig streng riechend, daher auch „Faulbaum“ genannt, Fr. glänzendschwarz, leicht abfallend. Europa, Orient, bis 15 m, V.	100—120 cm hoch	—.60	5.—	45.—
Pissardi *Carr.*, Blutpflaume . . . . Zierbaum, von rundlich, buschigem Wuchs, B. dunkelrot, Bl. weiss mit Laubausbruch, sehr reichblühend.	80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
⊛ » **Hessei** *Hesse* . . . . Form der Blutpflaume, B. schmal, unregelmässig eingeschnitten und gesägt, rot mit grünlichgelbem, rötlichem oder goldigem Rand, Bl. zahlreich, an Kurztrieben, zirka 2 cm Durchmesser, reinweiss.	60—80 cm hoch	1.20	11.—	—

Prunus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pissardi Moseri plena *Hort.* . . . . 80—120 cm hoch Form mit grossen, rosa gefüllten Bl., einzeln an Kurztrieben, bis 3 cm Durchmesser, B. grösser als die der Stammart und mehr dunkelpurpurrot.	1.20	11.—	100.—
» **nigra** *Hesse* . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
Form mit glänzend schwarzpurpurn gefärbten B., Bl. leicht lilarosa getönt. Sehr wirkungsvolle, konstante Blattfärbung.			
» **Purpusi** *Hesse* . . . . 100—120 cm hoch Form, deren dunkelrote B. mit leuchtend gelben und rosa Farbtönen durchsetzt sind.	1.20	11.—	—
Pseudocerasus alba plena *Hort.* . . . . 70—100 cm hoch Zierkirsche mit grossen, weissgefüllten Bl., an Rankrosenblüten erinnernd.	1.50	13.50	—
» **Naden** *Hort.* (Pr. Sieboldi *Wittm.*) . . . . 50—70 cm hoch Baumartig, B. geschwänzt zugespitzt, scharf gesägt, Bl. gross, weiss, leicht rosa überhaucht, halbgefüllt, an verzweigten Blütenständen, vor oder mit Blattaustrieb, reich- und frühblühend.	1.50	13.50	—
» **rosea plena** *Hort.* . . . . 50—70 cm hoch Form mit grossen, dunkelrosa, meist halbgefüllten Bl. in grossem Blütenstutz.	1.50	13.50	—
pumila *L.* Sandkirsche △ . . . . Sträucher Strauch von schlank aufrechtem Wuchs, Triebe rotbraun, B. graugrün, verkehrt eilanzettlich, an der Spitze leicht gesägt, Bl. weiss, Fr. eirund, schwarzpurpurn, Herbstfärbung prächtig rot mit grauem Schein.	1.—	9.—	—
» **depressa** *Bean.* Für Böschungen △ . . . . Sträucher Strauch, niederliegend, B. dünn, unterseits gut bläulich, Bl. weiss. Ontario, IV.	1.20	11.—	—
Sargenti *Rehd.* (Pr. serrulata sachalinensis *Mak.*) Sargent-Kirsche 100—150 cm hoch Baumartig, Rinde glänzendkirschbraun, B. schön bronziert im Austrieb, sehr grob gezähnt, Bl. hellrosa, einfach, 3 cm Durchmesser, vor oder mit dem Laubausbruch, sehr früh- und reichblühend. Japan, bis 30 m, IV.	1.20	11.—	100.—
serotina *Ehrh.* Deutscher Lorbeer ● . . . . 80—120 cm hoch Späte Traubenkirsche. Baumartig, schnellwüchsig, B. lorbeerartig, glänzend dunkelgrün, länglich eiförmig, Bl. weiss, in aufrechten oder waagerechten Trauben, Fr. erbsengross, schwarzpurpurn. Ost-Nordamerika, bis 30 m, V—VI.	—.60	5.—	45.—
serrula tibetica *Koehne* . . . . 50—70 cm hoch Baumartig, Rinde herrlich leuchtend seidig rotbraun, abblätternd, B. lanzettlich, scharf gesägt, sattgrün, Bl. zu 1—3, weiss, Fr. oval, rot. Westchina, bis 10 m, IV—V.	2.50	—	—
serrulata *Lindl.*(Pr. serr. albaplena *Schneid.*) weiss gefüllt 70—100 cm hoch In der Tracht Pr. Pseudocerasus ähnlich, mit grossen, weissgefüllten Bl. Japan, China, Korea, bis 25 m, IV—V.	1.50	13.50	—
» **Hisakura** *Koehne* . . . . 60—80 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Höhe bis zur Krone 100—120 cm	1.75	16.—	—
» » » » 120—140 »	2.—	18.—	—
» » » » 140—160 »	2.25	20.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
» » » » » 200 » 8—10 » »	3.—	27.50	250.—
» » » » » 200 » 10—12 » »	3.50	33.—	—
Baum oder Strauch mit sehr grossen bis 5 cm Durchmesser haltenden, gefüllten Bl. von schön heller oder dunkler rosa Färbung, langgestielt, in zierlichen Büscheln hängend, sehr reichblühend. Junger Laubaustrieb von prachtvollem, rötlichem Bronzeton.			
» **James Veitch** *Hort.* (P. serr. Fugenzo *Wils.*) . . . 60—80 cm hoch Form mit bis 5 cm grossen, dichtgefüllten, rosafarbenen, gewellten und gefransten Bl. in 3blütigen, 3—5 cm gestielten Büscheln, Kelchzipfel mit tief zerschlitztem Rand, Nebenblätter an Blatt- und Blütentrieben auffallend tief geschlitzt.	1.50	—	—
» **Mount Fuji** *Hort.* . . . . 50—70 cm hoch Form mit reinweissen, halbgefüllten, breiten und wohlriechenden Bl. Sehr edle Blütenform.	1.50	13.50	—
» **Shidare Sakura** *Koehne*, Hängekirsche . . . . . 50—70 cm hoch	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	18.—	—
» » » » 140—160 »	2.25	20.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	3.—	—	—
Form mit stark hängenden Ästen, Bl. gross, rosa, dicht gefüllt.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Prunus (Fortsetzung):			
serrulata Ukon *Hort.* (P. Lannesiana grandiflora *Wils.*) 60—80 cm hoch. Form mit 4 cm grossen, halbgefüllten, grünlichweissen Bl., sehr eigenartige, feine Färbung.	1.50	13.50	—
» **Yoshino** *Koehne* . . . 60—80 cm hoch. Kräftig wachsende Form mit grossen, einfachen, weisslichrosa Bl., zu dreien auf 1,5 cm langem Stiel, bis 4,5 cm Durchmesser, Blütenblättchen vielfach zerrissen und geschlitzt.	1.50	13.50	120.—
Sieboldi, siehe Pr. Pseudocerasus Naden.			
Simonii *Carr.* . . . 80—100 cm hoch. Strauch mit schlanken, aufrechten Trieben, B. ähnlich einem Pfirsichblatt, sattgrün, unterseits bläulich, Bl. weiss, kurz vor oder mit dem Laubaustrieb. Nordchina, bis 3 m, IV—V.	1.20	11.—	—
sinensis, siehe Pr. japonica.			
spinosa purpurea *Hort.* . . . Sträucher. Form der Schlehe mit dunkelroter Belaubung, dichtbuschig und weniger dornig, Bl. rosa, Fr. blauschwarz, bereift.	1.—	9.—	80.—
» **varbossania** *Maly* . . . Sträucher. Form der Schlehe mit braungelben bis fleischfarbig rosa Fr. von ca. 1 cm Durchmesser. Neue Mutation, gefunden in der Nähe von Sarajewo bei dem Bistum Vrhbosna.	1.20	11.—	—
subhirtella *Miqu.*, japanische Frühlingskirsche . . . 60—80 cm hoch. Baum oder Strauch mit hängender Verästelung, Zweige borstig behaart, B. tiefgrün, behaart, Bl. weiss bis rosa in lockerer Anordnung. Japan, bis 10 m, IV—V.	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.—	—	—
» **plena** *Hort. Dahlem.* . . . **Neu!** 60—80 cm hoch. Form von auffallend früher Blüte, Bl. weiss, rosalila angehaucht, gefüllt, bis 3 cm Durchmesser. IV. Genaue Beschreibung siehe „Der Blumen- u. Pflanzenbau" 1936, Seite 67.	2.50	22.50	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	3.—	27.—	—
tomentosa *Thbg.* . . . Sträucher. Strauch von dichtem Wuchs, Zweige dicht filzig, schwärzlich rotbraun, B. eirund, stachelspitzig, gesägt, hellgraugrün filzig, Bl. einzeln, weiss oder rosa, kurz vor dem Laubaustrieb. China, Japan, bis 2 m, IV—V.	—.80	7.—	—
» **endotricha** *Koehne.* . . . Strauch mit dicht filzigen, jungen Trieben, B. 2—4 mm gestielt, elliptisch bis länglich, 3—5×1—2,5 cm gross, kerbig gesägt, oberseits spärlich, unterseits dicht behaart bis auch graufilzig. Bl. einzeln, schön weiss, zahlreich, Fr. kirschgross, fuchsrot. Bis 3 m, III—IV.	1.50	—	—
triloba atrovirens plena *Hesse* . . . Sträucher. Form von kräftigem, straff aufrechtem Wuchs, B. schmäler als die der Art, lackartig glänzend, tiefgrün, Bl. flach gebaut, klein aber gut gefüllt, hellrosa.	1.—	—	—
» **plena** *Dipp.* Mandelbäumchen . . . Sträucher. Strauch oder als Bäumchen veredelt, B. hellgrün, Bl. schön rosa, klein, rosenähnlich dicht gefüllt, an den vorjährigen Trieben entlang, Starker Rückschnitt nach der Blüte erforderlich. IV—V.	1.—	9.—	80.—
hoch Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	—	—
» » » 140—160 »	2.50	—	—
virginiana *L.* Virginische Traubenkirsche . . . 80—120 cm hoch. Strauch oder baumartig, Austrieb bronzeartig, B. ähnlich Pr. Padus, Bl. in dichten, abstehenden Trauben, weiss, später als Pr. Padus, Fr. glänzendrot. ON-Amerika, bis 10 m, V—VI.	—.60	5.—	45.—
150—200 » »	—.70	6.—	50.—
Ptelea — Lederblume — Rutaceae.			
Baldwini *Torr.* (Pt. angustifolia *Benth.*) . . . Sträucher. Strauch, laubabwerfend, stark und aufrechtwachsend, von starkem, unangenehmem Geruch, B. dreizählig, Blättchen dunkelgrün, unterseits heller, dicht belaubt, Bl. grösser, Fr. kleiner als bei Pt. trifoliata, nur 1,5 cm breit, mit kleiner Spitze versehen. Kalifornien, 2 m, VI.	1.50	—	—
trifoliata *L.* . . . Sträucher. Strauch oder baumartig, dichtbuschig, B. frischgrün, drüsig, gepunktet, 3zählig, Blättchen 6—12 cm lang, Bl. 1 cm gross, in breiten Dolden, grünlichweiss, wenig ansehnlich, Fr. breit geflügelt, grün, spät abfällig. Amerika, bis 8 m, VI.	—.60	5.—	45.—
» **aurea** *Behnsch* . . . Sträucher. Form mit schön goldgelber Belaubung.	1.50	13.50	—
» **fastigiata** *Bean.* . . . Sträucher. Form mit aufgerichteten Zweigen von schön pyramidalem Wuchs.	1.50	13.50	—
Pterocarya — Flügelnuss — Juglandaceae.			
fraxinifolia *Spach.* (Fr. caucasica *C. A. Mey.*) . . . 200—250 cm hoch. Zierbaum, mit breiter, runder Krone, bildet zahlreiche Stämme, B. eschenartig gefiedert, Blättchen 11—15, scharf gesägt, Bl. grün, unscheinbar, Fr. in lang herabhängenden, 20—45 cm langen Fruchtständen mit abgerundeten Fruchtflügeln. Kaukasus, 20 m, IV.	2.—	18.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pterocarya (Fortsetzung):			
fraxinifolia dumosa *Schneid.* . . . . 100—130 cm hoch	2.—	—	—
Strauchige Form, Holz gelbbraun, B. kleiner, Wuchs dicht.			
rhoifolia *Sieb. & Zucc.* . . . . 80—120 cm hoch	1.20	11.—	—
Baum von flottem, aufrechtem Wuchs, Holz rotbraun, B. bis 50 cm lang, 10—12 paarig, Fr. breit geflügelt, Trauben 20—30 cm lang. Japan, bis 30 m, IV.			
sinensis *Hort.* (Pt. stenoptera *DC.*) . . . . 200—250 cm hoch	2.—	—	—
Baum von stark aufrechtem Wuchs, junges Holz dunkelbraun mit dichter, gelber Behaarung, B. bis über 40 cm lang, bis 25 fiederig, scharf gesägt, matt dunkelgrün, unterseits heller, Fr. mit länglichen Flügeln, in 20—30 cm langen Trauben. China, bis 30 m, IV.			
Pterostyrax — Flügelstorax — Styracaceae.			
corymbosa *Sieb. & Zucc.* . . . . Sträucher 60—80 cm hoch	2.—	—	—
Strauch oder Baum, B. oval bis elliptisch, borstig gezähnt, Bl. breitrispig, gelblichweiss, locker, Fr. geflügelt. Japan, bis 6 m, V.			
Pyracantha — Feuerdorn — Rosaceae.			
coccinea *Roem.* (Crataegus Pyracantha *Borckh.*)			
○ △ ♙ ⌗ ஃ . . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Strauch, immergün, bedornt, ausgebreitet mit Ballen 30—50 » »	2.—	18.—	160.—
verästelt, B. spitz-elliptisch, 2—4 cm gross, » » 50—70 » »	2.50	22.50	—
eng kerbsägig berandet, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, Bl. weiss, doldentraubig, Fr. zahlreich, leuchtendrot. Italien, Osteuropa, Orient, bis 2 m, VI.			
» **Lalandii** *Dipp.* (P. coccinea latifolia *Zbl.*), ○ △ ♙ ⌗ ஃ 20—30 cm hoch **m. Tb.**	2.—	18.—	—
Form von üppigem, aufrechtem Wuchs und besonderer Reichblütigkeit, B. breiter als bei der Art, Fr. grösser und hellorangerot.			
Gibbsi *A. B. Jacks.* ○ △ ♙ ⌗ ஃ . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
Strauch, immergrün, von gut dichtem Wuchs, B. glänzend dunkelgrün, grösser als bei P. coccinea, Bl. sehr zahlreich, weiss, Fr. sehr üppig, erbsengross, lebhaftrot. China, bis 3 m, V—VII.			
Ⓝ **Rogersiana aurantiaca** *Hort. Gibbs.* . . . mit Ballen 60—80 cm hoch	2.50	22.50	—
Form mit besonders schönen, orangefarbenen bis goldgelben Früchten und schmalen Blättern. Yunnan.			
Pyrus, siehe Malus.			
Quercus — Eiche — Fagaceae.			
agrifolia *Née* ⌗ . . . . 40—60 cm hoch	4.—	—	—
60—80 » »	5.—	—	—
Baum oder auch strauchartig, Zweige filzig, B. 3—7 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, Fr. sitzend. Kalifornien, bis 30 m.			
ajudaghensis *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch	4.—	—	—
Qu. Hartwissiana nahestehend, B. kraus und gesägt, zu Q. pubescens (Qu. lanuginosa) gehörend.			
altissima *Hort.* . . . . 150—180 cm hoch	6.—	—	—
250—300 » »	8.—	—	—
Sehr schöne Art, junges Holz filzig, wohl zu Qu. pubescens gehörig, B. oberseits glänzend grün, unterseits vollkommen filzig. Blattform, ähnlich Qu. Cerris.			
ambigua *Mchx.* (Qu. borealis *Mchx.*) Roteiche. ⌀ . . . 100—125 cm hoch	4.—	—	—
150—200 » »	7.—	—	—
200—250 » »	8.—	—	—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	10.—	—	—
Baum, schnellwüchsig, B. gross, spitz, Herbstfärbung schön rot. NO.-Amerika, 20—25 m.			
Ambrozyana *Simk.* ⌗ . . . . 60—80 cm hoch	4.—	36.—	—
Baum, zur Cerris-Gruppe gehörend, B. bis 12 cm lang, meist schmallänglich, regelmässig spitzlappig, oberseits glänzend frischgrün, unterseits weissgraufilzig. Ungarn.			
austriaca sempervirens *Hort.* ⌗ . . . . 40—60 cm hoch	3.—	27.—	—
(Qu. Pseudo-Turneri *Schneid.*) 60—80 » »	4.—	36.—	—
Kleiner Baum, buschig pyramidal wachsend, B. 120—150 » »	6.—	—	—
dunkelgrün, derb, den ganzen Winter haftend, 200—250 » »	8.—	—	—
länglich verkehrt eiförmig.			
Cerris *L.* Zerr-Eiche. ⌀ . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
Baum mit lockerer Krone, in Kultur » 10—12 » »	4.—	36.—	—
oft auch strauchig, B. länglich ellip- » 12—14 » »	5.—	45.—	—
tisch, 6—12 cm lang, oberseits tief- » 14—16 » »	6.—	—	—
grün, kahl, unterseits hellgrün, be- » 16—18 » »	8.—	—	—
haart, Herbstfärbung gelbbraun. » 18—20 » »	10.—	—	—
M.-SO.-Europa, bis 35 m.			

Quercus (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cerris crispa *Booth.* Form mit kraus gelappten B., schmäler als die Art, 5—8 cm lang, unterseits weissfilzig. Rinde stark korkig.	60—80 cm hoch	4.—	—	—
» **karlsruhensis** *Hort.* Form mit zierlich gekräuselten B.	250—300 cm hoch	8.—	—	—
» **Lucombeana** *Loud.* (Qu. Cerris × suber). #	40—60 cm hoch	3.—	27.—	—
Baum mit pyramidaler Krone, B. schmäler und länger als die der Art, meist 7 Lappenpaare mit grossen, dreieckigen Zähnen, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgraugrünfilzig, derb lederartig. Bis 30 m.	60—80 » »	4.—	—	—
coccinea *Wangenh.* Scharlacheiche. Ø . . . . . **Echt!**	40—60 cm hoch	3.—	—	—
Baum auch noch für trockene Böden. B. tiefgelappt, lange hängend, Herbstfärbung scharlachrot. O-N-Amerika, bis 30 m.	60—80 » »	4.—	—	—
conferta, siehe Qu. pannonica.				
dentata *Thbg.* (Qu. Daimio *Hort.*) Baum, in Kultur meist Strauch, Zweige grau behaart, B. gross, schön, oberseits dunkelgrün, anfangs filzig, später glatt, am Qu. Prinus erinnernd, unterseits anfangs graufilzig, später mehr hellgrün und schwach filzig. Japan, Westchina, bis 25 m.	20—30 cm hoch	3.—	—	—
Garryana *Dougl.* Oregon-Eiche. Baum mit behaarten Zweigen, von dichtem Wuchs, orangerot, B. 8—14 cm gross, grob gelappt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün und meist behaart. Kalifornien, bis 30 m.	60—80 cm hoch	5.—	—	—
Hartwissiana *Stev.* Der Qu. pubescens (Qu. lanuginosa) nahestehende Form.	100—150 cm hoch	6.—	—	—
Ilex *L.* Stecheiche, # ∧ Strauchartiger Baum, immergrün, B. spitzeiförmig bis lanzettlich, 3—7 cm gross, oft ganzrandig, glänzend tiefgrün, Trieb filzig. Südeuropa.	40—60 cm hoch	4.—	—	—
ilicifolia *Wgh.* (Qu. Banisteri Mchx.) △ Ø Strauch mit dicht hellgrau filzigen Zweigen, B. tief dunkelgrün, buchtig gelappt, 5—12 cm lang, unterseits weisslich behaart. Herbstfärbung dunkelbraunrot. Amerika, bis 3 m.	80—100 cm hoch	5.—	—	—
Libani *Oliv.* #	40—60 cm hoch	3.—	—	—
Meist baumartiger Strauch, immergrün, B. länglich lanzettlich, ungelappt, glänzend grün, 5—10 cm lang, stark gezähnt. Kleinasien, bis 10 m.	200—250 » »	8.—	—	—
» **angustifolia** *Dipp.* Form, dicht und feinzweigig, B. sehr schmal, länglich lanzettlich, scharf gesägt, dunkelgrün, unterseits heller.	200—250 cm hoch	8.—	—	—
macranthera *Fisch. & Mey.* Baum, einjährige Zweige wollig behaart, B. gross, dunkelgrün; bis 15 cm lang und 9 cm breit, kerbzähig gelappt, unterseits weich behaart. Ost-Kaukasus, bis 20 m.	120—150 cm hoch	6.—	—	—
macrocarpa *Mchx.* Kletteneiche. Baum mit schon in der Jugend korkigen Zweigen, B. 10—24 cm gross, unterseits behaart, oberseits dunkelgrün, unregelmässig gelappt. O-N-Amerika, bis 30 m.	40—60 cm hoch	4.—	—	—
macrophylla Alberti *Hort.*	40—60 cm hoch	3.—	—	—
Stattlicher Baum, B. dunkelgrün, glänzend, lederartig,	60—80 » »	4.—	—	—
bis 40 cm lang und 20 cm breit.	120—150 » »	6.—	—	—
	200—250 » »	10.—	—	—
marilandica *Muenchh.* (Qu. nigra *Wgh.*, Qu. ferruginea *Mchx.*). Ø Baum mit grosser Belaubung, B. bis 22 cm breit, oberseits glänzend tiefgrün, unterseits rostig behaart. Herbstfärbung gelb oder braun. Amerika, bis 10 m.	60—80 cm hoch	4.—	—	—
monticola caroliniana *Hort. Musk.*	60—80 cm hoch	4.—	—	—
Eine der Qu. prinus ähnelnde, schönbelaubte Eiche. B. länglich oval mit nur geringen Einbuchtungen, derb lederig, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits leicht bläulichgrün.	80—100 » »	6.—	—	—
palustris *L.* Sumpfeiche Ø ≅	Heister 150—200 cm hoch	2.—	18.—	—
Baum mit breitpyramidaler Krone und	Hochstämme 8—10 cm Umfang	4.—	36.—	—
durchgehendem Mitteltrieb, B. klein,	» 14—16 » »	6.—	54.—	—
tief fiederspaltig, Herbstfärbung lebhaft rot, aber spät. Für frische, feuchte Niederungsböden. ON-Amerika, bis 30 m.	» 16—18 » »	8.—	—	—
pannonica *Booth* (Qu. **conferta** *Kit.*) Ungar-Eiche Ø Baum von dichtem, straffem Wuchs, B. gross, regelmässig fiederspaltig gelappt, glänzend dunkelgrün. Mit das schönste Eichenblatt, Herbstfärbung gelb. Ungarn, bis 30 m.	30—50 cm hoch	3.—	—	—

Quercus (Fortsetzung):

	Grösse	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
pedunculata *Ehrh.* (Qu. Robur *Sm.*) ≌ Hochstämme	8—10 cm Umfang	4.—	36.—	—
Stieleiche, Sommereiche »	10—12 » »	4.50	40.—	—
Beliebter Alleebaum von raschem Wuchs, für tiefgründigen, feuchten Boden. B. ziemlich klein, bis 14 cm lang, oberseits tiefgrün, unterseits bläulich. Europa, bis 50 m.				
» **argenteo-marginata** *Hort.*	60—80 cm hoch	4.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
Form der Stieleiche mit hübsch weiss gerandeten Blättern.				
» **atropurpurea** *Kirchn.* Bluteiche	60—80 cm hoch	6.—	—	—
Form der Stieleiche mit beständig purpurrotem Laub, Wuchs etwas schwächer als die Art.				
» **Concordia** *Kirchn.* Gold-Eiche Ø	40—60 cm hoch	4.—	—	—
Form der Stieleiche mit vollständig gold-	80—120 » »	6.—	—	—
gelben B.	120—150 » »	8.—	—	—
» **crispa** *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
Form der Stieleiche mit wellig gelappten B.	200—250 » »	8.—	—	—
» **fastigiata** *Loud.* (**Q. pyramidalis** *Gmel.*), Pyramiden	80—100 » »	4.—	36.—	—
Pyramiden-Eiche »	150—180 » »	5.—	45.—	—
Form der Stieleiche mit streng auf- »	250—300 » »	8.—	—	—
rechtem, der Pyramidenpappel ähnl. »	300—350 » »	12.—	110.—	—
Wuchs, Laub meist sehr lange haftend. »	400—450 » »	18.—	160.—	—
» » **cupressoides** *Hort.* »	80—100 » »	4.—	—	—
Unterform der Pyramideneiche, dichtzweigig mit schmäleren B., daher im Wuchs noch dichter und straffer erscheinend.				
» » **purpurea** *Klenert* Pyramiden	60—80 cm hoch	4.—	36.—	—
Unterform der Pyramideneiche mit herrlich glänzend purpurrotem Austrieb und Johannistrieb, später dunkelgrün werdend.				
» **grandifolia cucullata** *Hort.*	60—80 cm hoch	4.—	—	—
Form der Stieleiche mit aufgeblasenen,	300—350 » »	12.—	—	—
wellig gelappten, zum Teil verkrüppelten	350—400 » »	15.—	—	—
B., bildet grosse, breite, runde Kronen.				
» **heterophylla cucullata** *Hort.*	200—250 cm hoch	8.—	—	—
Form der Stieleiche mit fein zerteilten, schmalen B., deren Rand nach unten gebogen ist, so dass die B. aufgeblasen erscheinen.				
» **maculata** *Hort.*	60—80 cm hoch	4.—	36.—	—
Form der Stieleiche mit gelblichweiss gefleckten B.				
» **nigricans** *Hort.*	60—80 cm hoch	4.—	—	—
Form der Stieleiche von kräftigem Wuchs,	100—120 » »	5.—	—	—
Austrieb dunkelbraunrot, später bläulich	200—250 » »	7.—	—	—
dunkelgrün.				
» **pectinata** *Kirchn.*	80—100 cm hoch	5.—	—	—
Form der Stieleiche mit hellgrünen B., tief kammartig eingeschnitten.				
» **picta** *Hort.* Silbereiche	80—100 cm hoch	5.—	—	—
Form der Stieleiche mit sehr schönen, weiss-	200—250 » »	8.—	—	—
bunten B., Färbung des ersten Austriebes	250—300 » »	10.—	—	—
dunkelgrün und nur wenig weiss gezeichnet, Johannistrieb dagegen auffallend vieltriebig, rosa im Austrieb, B. dann sehr schön silberweiss gezeichnet. Feiner Kontrast zu den älteren, mehr grünen B.				
» **scolopendriifolia** *Kirchn.*	120—150 cm hoch	6.—	—	—
Form der Stieleiche mit lang ausgezogen	200—250 » »	10.—	—	—
unregelmässig gelappten B., mitunter am Rand wie ausgefressen und vielfach blasig aufgetrieben.				
Phellos latifolia *Hort.*, **breitblättrige Weiden-Eiche** Ø ≌	100—125 cm hoch	5.—	45.—	—
Form der Weideneiche mit breiteren B.,	200—250 » »	8.—	—	—
Herbstfärbung gelb. Bis 20 m.				
» **microcarpa** *Dipp.* Ø ≌	100—125 cm hoch	5.—	45.—	—
Form der Weideneiche mit meist kurzlappi-	200—250 » »	10.—	—	—
gen, unterseits filzigen B., Herbstfärbung gelb.				
pontica *Koch.*	20—30 cm hoch	4.—	—	—
Meist strauchartig, B. 10—15 cm lang, tiefgrün,	80—100 » »	10.—	—	—
scharf sägezähnig, hellgraublau unterseits, an die B. von Castanea vesca erinnernd. Armenien, Kaukasus.				
prinus parvifolia *Dipp.*	60—80 cm hoch	4.—	—	—
Form der Bergkastanieneiche, B. pergamentartig, schmäler als bei der Art, länglich bis verkehrt eilänglich, mit meist langer Spitze, regelmässig grob kerbsägezähnig, 10—18 cm lang, 4—9 cm breit, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits matt hellgrün.				
Pseudo-turneri, siehe Qu. austriaca sempervirens.				
pyramidalis, siehe Qu. pedunculata fastigiata.				

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Quercus (Fortsetzung):				
repanda *Hort. Musk.* (*non Mchx.*)	60—80 cm hoch	4.—	—	—
Form der Färbereiche mit tiefgelappten B., ober-	120—150 » »	6.—	—	—
seits lebhaft dunkelgrün, unterseits gelblich-grün, an den Nerven gelbfilzig.	200—250 » »	8.—	—	—
robur, siehe Qu. pedunculata und Formen.				
rubra *L.* Roteiche. ♀ ∅ . . . . Hochstämme	6—8 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Baum mit sehr grossen, spitzgelapp-	» 8—10 » »	3.50	33.—	280.—
ten B., Herbstfärbung schön rot.	» 10—12 » »	4.50	40.—	360.—
Amerika, bis 30 m.	» 12—14 » »	5.50	50.—	450.—
	» 14—16 » »	6.—	—	—
	» 16—18 » »	8.—	—	—
	» 18—20 » »	10.—	—	—
	» 20—25 » »	15.—	—	—
» **aurea** *Hort.*	60—80 cm hoch	4.—	36.—	—
Form der Roteiche mit schön gelbfarbigen B., Wuchs üppig.				
» **magnifica** *Hort.* ∅	40—60 cm hoch	3.—	—	—
Form der Roteiche, sehr starkwachsend,	60—80 » »	4.—	36.—	—
B. gross, prächtig rotbraun austreibend, Herbstfärbung schön rot.	80—100 » »	5.—	—	—
» **Schrefeldii** *Dipp*	60—80 cm hoch	4.—	36.—	—
Form der Roteiche, B. sehr gross, grob buchtig, mit sägezähnigen Lappen und breiteren oder schmäleren, häufig auch nur schmalen Einschnitten.	200—250 » »	8.—	—	—
Schochiana *Dieck.* (Qu. palustris × Phellos).	100—125 cm hoch	5.—	45.—	—
Hybride in Blattform zwischen beiden Eltern	200—250 » »	10.—	—	—
stehend.	250—300 » »	12.—	—	—
serrata *Thbg.*	60—80 » »	4.—	—	—
Kleiner Baum, B. bis 14 cm lang und 6 cm breit, grob gesägt, glänzend freudiggrün, lange haftend. Japan, bis 15 m.	80—100 » »	6.—	—	—
sessiliflora laciniata crispa *Hort. Musk.*	60—80 cm hoch	4.—	—	—
Form der Traubeneiche, B. mehr oder weniger stark unregelmässig eingeschnitten und gelappt, oft ganz schmal.	100—120 » »	6.—	—	—
» **pungens** *Freyn*	120—150 cm hoch	8.—	—	—
Form der Traubeneiche, von stattlichem Wuchs und sehr reich fruchtend. Istrien.				
stellata *Wgh.* (Qu. obtusiloba *Mchx.*)	40—60 cm hoch	4.—	—	—
Baum mit vielen kurztriebigen Zweigen, B. mit 2 oder 3 Lappenpaaren, mittleres auffallend gross, oberseits sattgrün, unterseits braunfilzig. Amerika, bis 20 m. Für trockene Lagen.				
tinctoria *Bartr.* Färber-, Schwarz-Eiche ∅ . . Heister	200—250 cm hoch	3.—	—	—
Mittelhoher Baum, Rinde schwarzgrau, B. gross, tief fiederspaltig gelappt, hellgrün, Herbstfärbung schön rot, aber spät. ON-Amerika, bis 30 m.				
toza *Bosc.* (Qu. pyrenaica *W.*)	120—150 cm hoch	5.—	—	—
Baum mit gelbfilzigen Zweigen, B. schön tief 5—6lappig, 6—14 cm lang, unterseits filzig. Für trockene Böden. SW-Europa, bis 15 m.	250—300 » »	8.—	—	—

Raphiolepis — Traubenapfel — Rosaceae.

		1 Stück	10 Stück	100 Stück
japonica *Sieb. & Zucc.* (R. umbellata *Mak*) # ∧ . . **m. Tb.**	15—20 cm hoch	2.—	—	—
Strauch, immergrün, B. lederig, dunkelgrün, Bl. weiss, rispig oder einfach traubig, stark nach Orangen duftend, Fr. kugel- bis eiförmig, stumpf purpurbraun, leicht filzig. Japan, bis 4 m, V—VI.				

Raphithamnus — Nadelstrauch — Verbenaceae.

		1 Stück	10 Stück	100 Stück
cyanocarpus *Miers.* (Citarexylon cyanocarpus *Hook. & Arn.*) # ∧ **m. Tb.**	20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
Kleiner Strauch mit dornig behaarten Zweigen, immergrün, B. dunkelgrün, Bl. lila in dichten Rispen, Fr. hellblaue, erbsengrosse Beere. Chile, bis 6 m.				

Rhamnus — Faulbaum, Wegdorn — Rhamnaceae. ♀

		1 Stück	10 Stück	100 Stück
cathartica *L.* Gemeiner Wegdorn oder Kreuzdorn ● ✱ + ...		—.60	5.—	45.—
Strauch von sparrigem Wuchs, laubabwerfend, B. oval, dunkelgrün, Bl. gelblichgrün in den Blattwinkeln, Fr. erbsengross, schwarz, Rinde zum Grün- und Gelbfärben benutzt. Europa, Asien, bis 6 m, V—VI.				
Frangula *L.* Faulbaum, Pulverholz ● ஃ ✱ ≅		—.60	5.—	45.—
Strauch oder kleiner Baum mit schwarzer, weiss gepunkteter Rinde, B. ganzrandig, breitoval, Bl. weisslich, in den Blattwinkeln sitzend, Fr. anfangs rot, zuletzt violettschwarz. Europa, Westasien, Nordafrika, bis 4 m, V—VI.				

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Rhamnus (Fortsetzung):			
leptophylla *C. S.* ♲ . . . . Strauch, sparrig, dornig, Holz glänzend, B. glänzend dunkelgrün, sehr lange haftend, Fr. einzeln, 1 cm gestielt, glänzend schwarz, rund, 3—5 mm dick. China, bis 2 m.	1.—	9.—	—
pumila *L.* Zwerg-Kreuzdorn △ . . . . **m. Tb.** Strauch von niedergestrecktem Wuchs, knorrig, B. 2—5 cm lang, glatt, Bl. gelbgrün, Fr. blauschwarz. Alpen, bis 50 cm, V—VII.	1.50	—	—
Rhododendron — Alpenrose — Ericaceae. ● § #			
arboreum- und Catawbiense-Hybriden, einschl. **Catawbiense grandiflorum.**			
Schaupflanzen in Sorten meiner Wahl, 80—90 cm hoch	12.—	110.—	—
90—100 » »	15.—	135.—	—
110—120 » »	25.—	230.—	—
Freilandpflanzen mit Knospen, gedrungen, von unten an verzweigt			
Aus nachfolgenden, winterharten Sorten ausgewählt, nach meiner Wahl: 30—40 cm hoch	2.50	22.50	200.—
40—50 » »	3.—	27.—	240.—
50—60 » »	3.75	34.—	290.—
60—70 » »	4.50	40.—	360.—
70—80 » »	5.50	50.—	450.—
80—100 » »	10.—	90.—	—
100—120 » »	15.—	140.—	—
2jährige Veredelungen in Sorten meiner Wahl . . 20—30 cm hoch	—	—	100.—
3 » » » » » » . . 30—35 » »	—	—	120.—

Rhododendron arboreum-Hybriden.

Alexander Adie, hell kirschrot
Ascot brillant, blutrot [lach
Atrococcineum, dunkelschar-
Atrosanguineum, dunkel kirschrot
Auguste van Geert, hell violettrosa
Blandianum, karminrosa
Boule de Neige, reinweiss
Brayanum, amarantrot
Bylsianum, lebhaft rosa
Carl Mette, leuchtend rot
Charles Noble, rosenrot
Comte de Gomer, weiss
Concessum, hellrosa
Cunningham's White, weiss
Cynthia, rosakarmin [karmin
Duc Adolf von Nassau, lila-
Francis Dickson, scharlach
Illuminata, rosalila
Jago, purpur
John Walter, kirschrot
John Waterer, amarantrot
Josef Withworth, dunkel weinrot
Käte Waterer, frischrosa
Lady Eleonore Cathcart, lebhaft rosa
Lord Clyde, dunkel blutrot
Mad. Carvalho, weiss
Michaël Waterer, lackrot
Minnie, weiss
Moerloosi, violettrosa [rot
Mrs. R. J. Holford, rot bis lachs-
Mrs. John Waterer, karminrosa
Mrs. Millner, karmesin
Nero, dunkelpurpur
Nirens, helllila
Pink Pearl, rosa, grossblumig
Prince Camille de Rohan, rosaweiss
Sir Charles Buttler, rosaweiss
Sir John Clutton, weiss
Sir Robert Peel, kirschkarmin
The Earl of Shannon, kirschrot
The Maroon, blutrot
The Queen, inkarnat
William Austin, purpur

Rhododendron Catawbiense-Hybriden.

Adalbert, leuchtend rot
Agnes, karminlilarot, gefleckt, gross [zeichnet
Alarich, karmesin, dunkel ge-
Albert, zartlila
Alfred, violett
Allah, hell karminrosa
Anna, hellviolett
Annedore, hell karminrot
Anton, hellviolett
Armin, purpurrot
Arno, blasslila
August, dunkelrosa
Bast, blasslila
Bibber, karminrot
Bismarck, weisslich lila
Botha, lilarosa
Bride of Apios, lilarosa
Britannia, scharlach, grossblu-
Camilla, rosa [mig
Candidissimum, reinweiss
Caractacus, purpurkarmin
Carmen, rosa
Carola, karminrosa
Catawbiense album, weiss
» **album elegans,** weisslich lila
» **Everestianum,** hell violettrosa
» **fastuosum plenum,** gefüllt lila
» **grandiflorum,** lila
Charles Dickens, dunkelrot
Christian, blassrosa
Cosima, rosa
Daisy, hell karminrot
Delicatissimum, rosa
Desiderius, karminrot leuchtd.
Donar, hell karmesinrot
Doncaster, leuchtend rubinrot, glänzend
Duc of York, rosa, grossblumig
Dürer, purpurrot
Effner, dunkelviolett
Ella, karminrot
Emil, reinweiss
Emma, karmesinrot
Fichte, dunkelrosa
Frau von Wolffersdorff, karminrosa
Genoveva, weiss
Gertrud, karminrot [rosa
Gloria gandavensis, blass-
Granat, karminrot
Holbein, dunkel karminrosa
Homer, reinrosa
Kettledrum, rötlich purpur
Lady Armstrong, hellrosa getüpfelt
Lee's dark purple, dunkelblauviolett
Moses, violett
Oldewig, rot
Pearsons Gloriosum, rosa
Roseum elegans, rosa bis hellrot
Roseum superbum, rot
The Warrior, hellkarmin, schwarz punktiert

Rhododendron caucasicum-Hybriden.

Ganz winterharte, sehr frühblühende, niedrige Hybriden.

Pflanzen mit einzelnen Knospen besetzt . . . . 40—50 cm hoch 1 St. M. 3.—, 10 St. M. 27.—
» » » » » . . . . 50—60 » » 1 » » 3.75, 10 » » 34.—
» » » » » . . . . 60—70 » » 1 » » 4.50, 10 » » 40.—

Calliope, rosa
Diane, weiss
Erato, weiss
Euterpe, kirschrot
Melpomene, zartrosa
Mnemosyne, karminrosa
Terpsychore, atlasrosa

Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:

Siehe auch unter „Azalea".

Art / Beschreibung	Größe	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
ambiguum *Hemsl.* #	50—60 cm hoch	3.—	27.—	—
Strauch, dicht verzweigt, immergrün, anspruchslos, B. lanzettlich, bis 8×2,5 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits grau mit gelben bis braunen Schilfern, aromatisch, Bl. breitglockig, bis 5 cm breit, schön hellgelb zu 5—6. Westchina, bis 4 m, V.	80—100 » »	5.—	—	—
amoenum normale, siehe Azalea Hatsugiri.				
arboreum *Smith* #	40—50 cm hoch	3.—	—	—
Strauch, in der Heimat hoher Baum, immergrün, B. spitzlanzettlich, bis 18 cm lang, lederartig, oberseits hellgrün, unterseits weiss oder bräunlichfilzig, Bl. in Dolden in rot, rosa, purpur, weiss und karmin Tönungen. Himalaja, bis 8 m, IV—V.				
» **album** *Wall.* #	30—40 cm hoch	3.—	—	—
Form mit unterseits rotbraunen B. und weissen, purpurn gefleckten Bl.				
» **Blood red** #	30—40 cm hoch	2.50	—	—
Eigentliche Stammform des immergrünen Himalaja-Rhododendron von blutroter Blütenfarbe.				
argyrophyllum *Franch.* #	20—30 cm hoch	2.50	22.50	—
Strauch von gedrungenem Wuchs, immergrün, junge Triebe mit weissem Flaum. B. länglich, etwa 12×3 cm gross, oberseits gelblichgrün, unterseits silberweiss. Bl. hellrosa, zu 7—10, glockigröhrig, 3 cm breit. Westchina, 2,5—6 m, V.	30—40 » »	3.—	—	—
Aucklandii *Hook.* (Rh. Griffithianum *Wight*) #	30—40 cm hoch	2.50	22.50	—
Strauch, immergrün, mit dicken, braunroten Zweigen. B. sehr derb, etwa 20×8 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau, Bl. weiss in wenigblütigen Dolden. Himalaja, 1—3 m, V—VI.	40—50 » »	3.—	27.—	—
	60—70 » »	4.50	40.—	—
	80—100 » »	8.—	70.—	—
brachycarpum *G. Don.* #	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
Strauch, immergrün, mit graufilzig jungen Trieben, B. kurzgestielt, lederartig, glänzend dunkelgrün, bis 15×5 cm gross, stumpfoval, unterseits etwas rostig. Bl. rahmweiss, 3—5 cm Durchmesser, in dichten Blütenständen. Japan, 1—4 m, VI.	40—50 » »	3.50	31.50	—
	60—70 » »	5.—	45.—	—
calophytum *Franch.* #	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
Strauch, immergrün, starkwachsend, Rinde der Zweige zimtrot, B. rosettig, bis 30 cm gross, meist schmalelliptisch, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Bl. gross, rosarot, in grossem, lockerem Stutz, zu 15—25, auf roten Stielen. Westchina, bis 15 m, V.	40—50 » »	4.—	—	—
campanulatum *G. Don.* #	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
Strauch, immergrün, gedrungen wachsend, breitgehend, Trieb kahl. B. dunkelgrün, lederartig, unterseits rotorangefilzig Bl. breit glockenförmig, 5 cm breit, blasslila, zu 8—15. Osthimalaja, bis 4 m, VI.	50—60 » »	4.50	40.—	—
canadense, siehe Rhodora canadensis.				
carolinianum *Rehd.* #	40—50 cm hoch	2.50	22.50	—
Strauch, immergrün, mit rotem Holz, von dichtem Wuchs. B. rotgestielt, kräftig lederig, ovallanzettlich, 5—8 cm lang, unterseits rotbraun, Bl. rosa, oberer Lappen leicht punktiert, zu 5—10, 3—4 cm breit. Nordcarolina, bis 2 m, V—VI.				
caucasicum *Pall.* △ #	15—20 cm hoch	1.50	—	—
Strauch von niedrigem, dichtem Wuchs, immergrün. B. spitzelliptisch, unterseits rotbraun, oberseits frischgrün, bis 10 cm lang. Bl. strohgelb mit grünlichen Flecken, zu 7—10 in dichtsitzendem Stutz. Kaukasus, bis 60 cm, V.				
dahuricum *DC.* △	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
Strauch von lockerem Wuchs, laubabwerfend. B. stumpfoval, bis 3 cm lang, dünn, azaleenartig. Bl. rosenrot, ziemlich flach tellerförmig. Sibirien, Grönland, bis 2 m, I—II.				
Davidsonianum *Rehd. & Wils.* ○	30—40 cm hoch	2.—	18.—	—
Strauch, meist laubabwerfend. B. 2,5—6×1—2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits bläulich, Rand leicht zurückgebogen. Bl. schön rosa, glockig-trichterig, 5lappig. Westchina, bis 100, V.	40—50 » »	3.—	—	—
decorum *Franch.* # . . . . **Neu!**	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
Strauch, in der Heimat baumartig, immergrün. B. länglich eiförmig, bis 15×5 cm gross, tiefgrün glänzend, unterseits blaugrau. Bl. weiss bis rosa, breitglockig, mit meist 7—8 Zipfeln, Blütenstand locker, wachsartig fleischig, essbar, bis 5 cm breit, duftend, sehr haltbar. Westchina, bis 2,5 m, VI.	50—60 » »	5.—	—	—
	60—70 » »	6.—	—	—
discolor *Franch.* #	20—30 cm hoch	2.50	22.50	—
Strauch, immergrün, mit gelblichen Trieben, spät austreibend. B. schmaloval, bis 20 cm lang, oberseits satt-, unterseits bleichgrün, purpurn gestielt. Bl. rosa bis weisslichrosa, bis 7 cm lang und breit, 7—9lappig, in vielblumiger Dolde. Mittelchina, 3—4 m, VI.	30—40 » »	3.—	—	—

Rhododendron (Fortsetzung):	Höhe	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
fastigiatum *Franch.* △ # . . . . Ähnlich Rh. impeditum, jedoch Laub graugrün, mehr aufrecht wachsend, Blüten fast veilchenblau.	15—20 cm hoch	2.—	18.—	160.—
	20—30 » »	2.50	22.50	200.—
ferrugineum *L.*, echte Alpenrose △ # ⚘ . . . . Strauch, immergrün, mit graubraunen Zweigen, B. dicklich lederartig, spitzelliptisch, 3×1,5 cm gross, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits rostbraun, Bl. tiefrosa, klein, an Daphne erinnernd. Alpen, bis 100, VI—VII.	15—20 cm hoch	2.—	18.—	160.—
	20—30 » »	2.50	22.50	—
Fortunei *Ldl.* # . . . . Strauch oder baumartig, breitbuschig. B. bis 16 cm lang, unterseits blaugrau. Bl. hellviolett, zu 8—10, würzig duftend, 7lappig. Ostchina, bis 2 m, V—VI.	30—40 cm hoch	3.—	—	—
	40—50 » »	5.—	45.—	—
	50—60 » »	6.—	—	—
fragrans *Max.* (Rh. azaleoides × Catawbiense) # . . . . Strauch mit leuchtend schwefelgelben Jungtrieben. B. breit lanzettförmig, dunkelgrün, teilweise gelbgefleckt. Bl. gross, hellrosa, duftend. Hybride.	40—50 cm hoch	2.50	22.50	—
fulgens *Hook.* # ∧ . . . . Strauch, Rh. campanulatum nahestehend, B. dick, oval, rundlicher, oberseits glänzendgrün, unterseits dick, weich braunfilzig. Bl. blutrot bis karminrot. Himalaja, bis 3 m, VI.	20—30 cm hoch	2.50	—	—
Gowenianum *Sweet.* (Rh. Catawbiense × nudiflorum) # Hybride mit lebhaft lilarosa Bl. in dichtem Stutz, trichterig, innen heller.	70—80 cm hoch	3.50	31.50	—
grande *Wght.* (Rh. argenteum *Hook. f.*) # . . . . Strauch, in der Heimat baumartig, immergrün, B. sehr gross, 14—30 cm lang, bei 8—13 cm Breite, oberseits tiefgrün, unterseits silberweiss. Bl. in dichtem Stutz, glockig, 5—8lappig, anfangs rosa, später in Weiss übergehend, 5—8 cm gross. Himalaja, bis 9 m, VI.	50—60 cm hoch	4.—	—	—
Griffithianum, siehe Rh. Aucklandii.				
hippophaëoides *Balf. f. & W. W. Sm.* ◑ △ # ≌ . . . . Strauch mit dichtbehaarten Trieben, B. trübgraugrün, oval, 3×1 cm gross, Bl. lavendelblau, zu 8—10. Westchina, bis über 1 m, VI.	40—50 cm hoch	3.—	27.—	—
hirsutum *L.* △ [K] Almrausch # . . . . Strauch mit bräunlichen Zweigen, B. oberseits dunkelgrün, unterseits drüsig punktiert, hellgrün, Ränder lang gewimpert, 10—25×5—10 mm gross, Bl. blassrosa, klein. Ostalpen, bis 1 m, V—VI. Verträgt Kalk!	15—20 cm hoch	2.—	18.—	—
imbricatum *Hort.* ꝏ △ # . . . . Strauch von dichtem Wuchs, immergrün, B. glänzend dunkelgrün, dachziegelig übereinanderliegend, Bl. satt rötlichviolett, in ziemlich grossen, hohen, lockeren Dolden. Hybride, V—VI.	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
	40—50 » »	3.50	—	—
	50—60 » »	5.—	—	—
impeditum *Balf. fil. & W. W. Sm.* ◑ △ # . . . . Echter Hochgebirgsstrauch, immergrün, von niedrigem, dichtem Wuchs, B. klein oval, dunkelgrün, 8×4 mm gross, Bl. hübsch tieflilapurpurn, fast veilchenblau. Westchina, 15—30, VI—VII.	15—20 cm hoch	2.—	18.—	160.—
indicum macranthum, siehe Azalea.				
insigne *Hemsl. & Wils.* # . . . . Strauch mit dicken, geraden Zweigen, B. stark lederig, länglich-lanzettlich, 9—13 cm lang, bei 3—5 cm Breite, Bl. hell- bis dunkelrosenrot, breit 5-lappig, glockig, zu 8 und mehr in einem Stutz. Westchina, 1,5—3 m, V—VI.	15—20 cm hoch	2.50	—	—
Kaempferi, siehe Rh. obtusum Kaempferi.				
Keiskei *Miqu.* △ # . . . . Strauch, fast immergrün, junge Triebe dunkelrot, Wuchs niederliegend, aufstrebend, B. im Austrieb rötlich, später grasgrün, elliptisch-lanzettlich, bis 6×2 cm gross, unterseits heller grün, Bl. hellgelb, azaleenartig, zu 2—5, mit langen Staubfäden. Japan, 1—3 m, V.	15—20 cm hoch	2.50	—	—
König Albert *Hort.* # . . . . Hybride von Rh. Falconeri, starkwachsend, mit grosser, dichter, glänzendgrüner Belaubung, sehr blühwillig.	20—30 cm hoch	3.—	—	—
Königin Carola *Hort.* # . . . . Hybride von Rh. grande *Wght.*, B. gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell, Bl. in dichten Dolden, lila bis violett. V—VI.	30—40 cm hoch	3.—	—	—
lacteum *Franch.* # . . . . Strauch, in der Heimat Baum, starkwachsend, mit dicht braunfilzigen Trieben, B. oberseits tiefgrün, kahl, unterseits dicht rotgelbfilzig, Bl. rosa, später milchweiss in vielblumigen, dichten Blütenständen, 7lappig, rundlich, rückwärts gebogen, röhrig mit blutrotem Saftmal. Westchina, 3—9 m, V—VI.	20—30 cm hoch	3.—	—	—
Luscombei *Wats.* (Rh. Fortunei × Thompsoni) # . . . Hybride mit frühem Austrieb, Bl. rosa mit blutroter Zeichnung, gross, gut duftend, 8—9 cm Durchmesser.	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
	80—100 » »	8.—	70.—	—

Rhododendron (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
lutescens *Franch.* # . . . . 30—40 cm hoch	2.50	22.50	—
Strauch, immergrün, gutwachsend, B. lanzettlich, glänzend hellgrün, im Austrieb rot, unterseits grau, mit gelblichen Schilfern, Bl. blassgelb, etwa 2,5 cm breit. Westchina, bis 2 m, V—VI.			
Manglesi *Veitch.* (Rh. Catawbiense × Aucklandii) # . . 30—40 cm hoch	3.—	—	—
Hybride von aufrechtem, straffem Wuchs, B. verkehrt langoval, 15×5 cm gross, mit scharfer Spitze, oberseits lebhaftgrün, unterseits gelbgrün, Bl. in grossen Sträussen, gross, rosa, süss duftend. VI—VII.			
Metternichi *Sieb. & Zucc.* # . . . . 20—30 cm hoch	3.—	—	—
Strauch, immergrün, von dichtem, breitem Wuchs, B. länglich-lanzettlich, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits rostfarben, filzig behaart, 15×5 cm gross, Bl. rosa, grossglockig, zu 8—15 in schöner Dolde vereinigt, meist 7lappig. Japan, bis 1 m, V—VI.			
» **pentamerum** *Max.* # . . . . 20—30 cm hoch	4.—	36.—	—
Form mit längeren, nach unten schmal eingerollten, dichtgestellten, im neuen Trieb schön weissfilzigen B., Bl. meist 5lappig, rosa wie die der Art.			
Mrs. Gill # . . . . 30—40 cm hoch	3.—	—	—
B. schön gross, unterseits weissfilzig, Bl. karmin- 40—50 » »	3.50	—	—
rot in enorm grossen Dolden. 50—60 » »	5.—	—	—
mucronatum, siehe Azalea ledifolia leucantha.			
Nobleanum *Ldl.* (Rh. caucasicum × arboreum) # . . . 30—40 cm hoch	4.—	—	—
Hybride, immergrün, von breitem Wuchs, Trieb rötlich, B. gross, oberseits mattgrün, unterseits fast glänzend gelblichbraun, Bl. dunkelrosa, sehr früh II.			
obtusum japonicum *Wils.* „Kurume-Azalee" . . . . . 10—15 cm hoch	2.—	18.—	—
Zwergstrauch, laubabwerfend, dicht, B. dunkelgrün, Herbstfärbung orange bis scharlachrot, Bl. hochrot. Japan, ca. 50 cm, IV—V.			
» **Kaempferi** *Wils.* (Rh. Kaempferi *Planch.*) ⊘ . . . 30—40 cm hoch	3.—	—	—
Strauch mit rostig behaarten, jungen Trieben, meist laubabwerfend, Bl. ebhaftgrün, etwa 5×2 cm gross, lanzettlich bis oboval, Herbstfärbung scharlachorange, Bl. hellorangerot bis rosa, zu 2—4, vor oder mit dem Laubaustrieb, 3—5 cm breit. Japan, 1—3 m, IV—V.			
ochraceum *Rehd. & Wils.* # . . . . 20—30 cm hoch	3.—	—	—
30—40 » »	4.—	—	—
Strauch, dem Rh. strigillosum nahestehend, B. 5—8 cm lang und 1—2,5 cm breit, jung behaart oberseits, später glatt, unterseits rötichgelb filzig. Bl. kirschrot, glockenartig, 5lappig, in kurzer, 8—12blütiger Dolde. Westchina, bis 2,5 m, V.			
ovatum *Hort.* (Rh. hirsutum × minus) # . . . . 20—30 cm hoch	3.—	—	—
Hybride von dichtem Wuchs. B. ovalelliptisch, 2,5—6 cm gross, frischgrün. Bl. zartrosa, einzeln, bis 1,5 m, V—VI.			
phoeniceum tebotan, siehe Azalea Tebotan.			
praecox *Carr.* (Rh. dahuricum × ciliatum) △ [K] # . . . 30—40 cm hoch	3.—	27.—	250.—
40—50 » »	4.—	36.—	—
Strauch von gedrungenem Wuchs, meist immergrün. B. lichtgrün, glänzend, oval, dicht, Rand gewimpert, unterseits braunschilferig. Bl. bläulichkarmin, Knospen lebhaft karminrot, bis über 4 cm breit. Hybride, bis 1 m, III—IV. Auch für kalkhaltigen Boden!			
Przewalskii *Maxim.* # . . . . 20—30 cm hoch	2.50	22.50	—
Strauch, dichtbuschig, Triebe kahl, gelb, B. oval, 5—10 cm, unterseits flockig behaart, zuweilen kahlend. Bl. weiss mit purpurnen Flecken, breitglockig, 3—4 cm breit. Westchina, 0,5—3 m, VI—VII.			
punctatum *Andr.* (Rh. minus *Michx.*) △ # . . . . 20—30 cm hoch	2.50	22.50	—
Strauch von lockerem Wuchs. B. spitz lanzettlich-elliptisch, 4—10 cm gross, unterseits dicht rotbraun beschuppt. Bl zu 6—8, etwas röhrig-glockig, rosapurpurn, grünlich gefleckt. SN-Amerika, bis 3 m, VI—VII.			
racemosum *Franch.* (Rh. rigidum *Hort.*) △ # . . . . . 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
30—40 » »	2.—	18.—	—
Strauch, immergrün, niedrig, buschig. B. klein, lederig, unterseits blaugrau, oval bis oboval, bis 3 cm gross. Bl. weiss bis zartrosa, klein, aber zahlreich in dichten Ständen, schon an jungen Pflanzen sehr reichblühend. Mittel-Westchina, bis 2 m, IV—V.			
Rosamundi *Hort.* # . . . . 60—70 cm hoch	4.—	36.—	—
Hybride von dichtem, niedrigem Wuchs, 70—80 » »	5.—	45.—	—
immergrün. B. auffallend frischgrün. Bl. **extra breit**, 80—100 » »	6.—	—	—
rosa in Weiss übergehend.			
rubiginosum *Franch* △ # . . . . 30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
Strauch straff aufrechtwachsend, immergrün, Zweige 40—50 » »	3.50	31.50	—
etwas warzig. B. oberseits dunkelgrün, unterseits mit 50—60 » »	4.—	36.—	—
rötlichen Punkten besetzt, schmal eielliptisch, bis 6 cm lang. Bl. ziemlich klein, lilarosa, bis zu 12 in einer Dolde, 2—3 cm Durchmesser. Westchina, bis 1 m, III—IV			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Rhododendron (Fortsetzung):			
rufum *Batal.* ⌗ . . . . 20—30 cm hoch Strauch, in der Heimat auch baumartig, immergrün, Knospen filzig. B. länglich, hellgrün, Blattrippe und Unterseite filzig fuchsrot. Bl. weiss bis rosa, 6—10 blütige Dolde. Westchina.	2.50	22.50	—
Searsiae *Rehd. & Wils.* △ . . . . 50—60 cm hoch Strauch, gut wachsend, mit roten, gelblich beschilferten Trieben. B. lanzettlich, oberseits glänzend sattgrün, unterseits silbrigweiss. Bl. mittelgross, hell lilaviolett, in lockeren Ständen. Westchina, bis 1,5 m, V.	3.—	27.—	—
Smirnowii *Trautv.* ⌗ . . . . 20—30 cm hoch	2.50	—	—
30—40 » »	3.—	—	—
Strauch, immergrün, von üppigem Wuchs, B. keilförmig länglich, unterseits weissfilzig, bis 15×5 cm gross. Bl. zartrosa, gross, in dichten Blütenständen. SW-Kaukasien, bis 3 m, V—VI.			
Vaseyi, siehe Azalea Vaseyi.			
Wallichi *Hook. f.* ⌗ . . . . 15—20 cm hoch Wohl Form von Rh. campanulatum *Don*, Bl. tief dunkellila mit hellem Auge. Sikkim, 2—3 m, VI.	2.50	—	—
White Gem *Hort.* ⌗ . . . . 30—40 cm hoch Schöne Varietät mit dunkelgrünen B., Bl. weiss mit	3.—	—	—
schwachgrünlicher Tönung, cattleyenfarbig gerandet, 40—50 » »	4.—	—	—
in grossen Dolden. V. 50—60 » »	5.—	—	—
Williamsianum *Rehd. & Wils.* △ ⌗ . . . . 20—30 cm hoch Strauch mit dünnen Trieben und waagerechten Zweigen, in der Jugend spärlich drüsenhaarig, später kahl, hellgraublau. B. lederartig, oval bis rundlich oval, Spitze rundlich, stachelspitz, 1,7—4,2 × 1,3—3,2 cm gross. Bl. hellrosa, zu 3—5 in Doldentrauben, offen glockig, 5lappig. Westchina, bis 1,5 m, V.	3.—	27.—	—
Wilsoni *Nutt.* (Rh. ciliatum × glaucum) △ ⌗ . . . . . . 20—30 cm hoch	2.—	18.—	—
40—50 » »	3.—	27.—	—
Niedrigbleibende Alpenrose, B. schmal, bis 9 cm lang, ähnlich Ligustrum vulgare, glänzend hellgrün, unterseits gelbgrün. Bl. dunkelrosa, in der Grösse wie die von Rh. punctatum, in vielblütiger Dolde, trichterig, schön wellig, schwach nickend. Hybride, V.			
yanthinum *Fr.* ⌗ . . . . 50—60 cm hoch Strauch mit rötlichen, aufrechten Trieben mit goldbraunen Schilfern. B. langoval, 3—6 cm lang, oberseits glänzend sattgrün, unterseits hell bläulichweiss. Bl. rosapurpurn, röhrig, glockig, 4—5 cm breit. China, bis 3 m, V—VI.	3.—	27.—	—
yedoënse poukhanense *Nakai* △ ⊘ . . . . 20—30 cm hoch Strauch von niedrigem Wuchs, Triebe anliegend behaart, meist laubabwerfend. B. dünn, azaleenartig, lanzettlich, 3—8 cm lang, Herbstfärbung schön karmin und orange. Bl. lilapurpurn mit purpurblauer Zeichnung, duftend, 5 cm breit. Korea, bis 1,5 m, V.	1.50	13.50	—
Rhodora — Sumpfrose — Ericaceae.			
canadensis *L.* (Rhododendron canadense *Zbl.*) △ ⊘ ≌ . 50—70 cm hoch	3.—	27.—	—
80—100 » »	4.—	36.—	—
Strauch, laubabwerfend, B. lanzettlich, bis 6 cm gross, graugrün, Herbstfärbung oliv. Bl. violettrosa fein zerschlitzt mit langen Staubfäden, vor dem Laubaustrieb, zu 5—6 gebüschelt. ON-Amerika, bis 1 m, IV—V.			
Rhodotypus — Scheinkerrie — Rosaceae.			
kerrioides *Sieb. & Zucc.* ● ஃ . . . . Strauch mit lebhaft dunkelgrüner Belaubung. Bl. gross, schneeweiss, ähnlich Philadelphus, Fr. glänzend schwarz. Japan, bis 8 m, V.	—.60	5.50	50.—
Rhus — Sumach — Anacardiaceae.			
ailantoides *Bunge.* (Picrasma ailantoides *Planch.*) ∧ . . 80—100 cm hoch Strauch bis Baum, dessen junge Triebe und Blattstiele mit leuchtend purpurrosa gefärbtem, dichtem Filz und langen Haaren bedeckt sind. B. fast doppelt so gross als die von Rh. typhina, schön gelbgrün, Spitze hellbraunrot. Japan, bis 1,5 m, IV.	1.20	—	—
Cotinus *L.* (Cotinus coggygria *Scop.*) **Gemeiner Perückenstrauch** ○ ⊥ ஃ ⊘ Strauch, dichtbuschig, laubabwerfend, B. langgestielt, länglich verkehrt eiförmig, fast kreisrund. Bl. zuletzt federartig, mit purpurvioletten Härchen bekleidet, Blüten- und Fruchtstände sehr zierend. Südeuropa, China, bis 5 m, VI—VII. Nicht giftig!	1.20	11.—	—
» **foliis atropurpureis** *Hort.* (Cotinus coggygria rubrifolia *Spaeth*) ○ ⊥ ஃ ⊘ . . . . Form mit leuchtend dunkelroten B. und sehr schönen, roten Blütenständen. Sehr zierende Erscheinung.	3.50	30.—	—

Rhus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
elegans superba *Demck.* ♣ . . . . 100—120 cm hoch	1.20	—	—
Form von Rhus elegans (Rh. glabra) mit in der 150—200 » »	1.50	13.50	—
Jugend rosa gefärbten Zweigen, von dichtbuschigem Wuchs. B. mit roten Stielen. Nicht giftig!			
semialata *Murray* (Rh. javanica *L.*) Λ in der Jugend. 80—100 cm hoch Baumartiger Strauch, mit gelblichen Zweigen, dunkelgrünen Fiederblättern, unterseits bräunlich behaart, Bl. gelblichweiss in schönen, pyramidalen Blütenständen. China, Japan, bis 8 m, VIII—IX. Nicht giftig!	1.50	—	—
sinica *Diels.* (Rh. punjabensis sinica *Rehd. & Wils*) . . . 100—120 cm hoch Baumartiger Strauch, B. gefiedert, mit 7—11 Fiedern, Bl. weisslich in filzigen, 12—20 cm langen Trauben. Westchina, bis 12 m, VI—VII. Nicht giftig!	2.—	—	—
Toxicodendron *L.* Gift-Sumach +! . . . . 40—60 cm hoch Strauch mit unterirdischen Ausläufern, ziemlich behaart. B. dreigeteilt, je 12—13 cm lang und bis 9 cm breit, länglich oval, ganzrandig. Bl. in den Blattachseln in Büscheln. Nordamerika, Japan, bis 1 m, V—VI. Stark giftig!	1.50	13.50	—
typhina *L.* Hirschkolbensumach, Essigbaum ♣ . 150—200 cm hoch Baum mit bis 50 cm langen, 10—13 fiederigen, glänzend grünen B., die sich im Herbst leuchtendrot färben. Sehr zierend sind die grossen, kolbenartigen, karmesinroten Fruchtstände, die auch den Winter über haften. Amerika, bis 10 m, VI—VII. Nicht giftig!	1.50	13.50	120.—
vernicifera *DC.* Lackbaum +! . . . . 100—120 cm hoch Strauch oder Baum, nur in der Jugend behaart, später graugelb, kahl. B. bis gut 50 cm lang, Blättchen 7—13, eilänglich, 7—20 × 3—7 cm gross, Bl. gelblichweiss in bis 20 cm langen, hängenden Rispen. Fr. strohgelb. Japan, bis 10 m, V. Giftig!	1.50	—	—

Ribes — Stachelbeere, Johannisbeere — Saxifragaceae. ●

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alpinum *L.* . . . . Sträucher mit 8—15 Trieben, 50—70 cm hoch Kleiner Strauch, B. glänzendgrün, früh austreibend und spät abfallend. Bl. grünlichweiss, Fr. scharlach. Europa, Orient, bis 1,5 m, IV.	—.70	6.—	50.—
ciliatum *Humb. & Bompl.* ○ △ □ . . . . Strauch mit hellbraunem Holz, dicht mit dunklen, warzigen Borsten besetzt, von strengem Geruch. B. ziemlich klein, Bl. in hängenden Trauben, 6—12blütig, grünlichweiss, Fr. rund, glatt, schwarz. Mexiko, bis 1 m, IV-V.	1.50	—	—
diacantha inermis *Pall.* △ . . . . Stachellose Form der sibirischen Bergbeere, sonst ähnlich R. alpinum.	1.—	9.—	—
floridum *L'Hérit* (R. americanum *Mill.*) ◑ . . . . Strauch von mittelstarkem, ausgebreitetem Wuchs, Triebe schlank, gelblichgrau. B. 3—5lappig, 9×10 cm gross, 4 cm lang gestielt. Herbstfärbung schön rötlichorange bis feuerrot. Bl. reich in gelblichweissen Trauben. NO-Amerika, bis 1,5 m, IV—V.	—.80	7.—	—
Gordonianum *Lem.* (R. odoratum × sanguineum) . . . . Hybride mit 6—9 cm langen, aufrechten, orangefarbenen Blütentrauben, Knospen feuerrot, Mitte der Bl. gelblich. Bis 3 m, V.	—.80	7.—	—
Grossularia *L.* Gemeine Stachelbeere . . . . Strauch mit 3—5lappigen, ziemlich kleinen B., kleine, verwaschen rote Bl. meist zu zweien, Fr. kugelig, in Behaarung und Farbe nicht einheitlich. Europa, bis 1 m, IV—V.	—.60	5.—	45.—
laurifolium *Jancz.* # Λ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, B. oval, derb, dunkelgrün, rötlich getönt, 5—10 cm gross, Bl. hell grünlichgelb, in 6—12 blütigen, hängenden Trauben. Fr. schwarz, 1,5 cm dick. Westchina, bis 1,5 m, V.	2.—	18.—	—
nevadense *Kell.* . . . . mit Ballen Strauch mit violett überlaufenen, jungen Zweigen. B. mittelgross, 3—5lappig, dünn, tiefgrün. Bl. rosenrot bis rötlichkarmin, in 12—20 blütigen, meist leicht aufwärtsgerichteten Trauben. Fr. blau, stark bereift. Kalifornien, bis 1,5 m, V.	1.20	—	—
oxyacanthoides *L.* Amerikanische Gebirgs-Stachelbeere △ . . . . . . Niedriger Strauch mit schön übergebogenen Zweigen, Dorne etwa 1 cm lang. B. rundlich bis herzförmig, 2—4 cm Durchmesser, 5lappig, Abschnitte kerbzähnig, glänzendgrün, jung flaumhaarig. Bl. weisslich, klein, meist zu dreien. Fr. blaurot, glatt. NO-Amerika, bis 1 m, IV—V.	—.60	—	—
sanguineum *Pursh.*, Blutjohannisbeere . . . . Strauch mit behaarten, jungen Zweigen. B. oberseits dunkel- bisweilen auch graugrün, unterseits weisslich filzig. Bl. blutrot, in hängenden Trauben, reichblühend, Fr. klein, blauschwarz. WN-Amerika, bis 3 m, IV.	—.70	6.—	50.—
» **atrorubens** *Loud.* . . . . Form mit besonders tief dunkelroten Blüten in schönen Blütentrauben.	—.70	6.—	50.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ribes (Fortsetzung):			
sanguineum carneum *Benth.* . . . . Form mit langen Blütentrauben von fleischfarbigen bis rosenroten Blüten, IV.	—.70	6.—	50.—
» **grandiflorum** *Hort.* . . . . Form mit sehr grossen, blutroten Blüten in schönen, dichten Trauben.	—.70	6.—	50.—
Robinia — Robinie, falsche Akazie — Leguminosae.			
hispida *L.* **Borstige Robinie** . . . . **Büsche 40—60 cm hoch**	1.20	11.—	—
Strauch, ausläufertreibend, leicht **» 60—80 » »**	1.50	13.50	—
überhängend, mit braunrot, steif- **Höhe bis zur Krone 100—120 cm**	2.50	22.50	—
borstig behaarten Zweigen. B. fiederig, mit 7—13 Fiedern. Bl. gross, rosenrot, zu 4—8 in lockeren, borstig behaarten Trauben, sehr blühwillig. Als Hochstamm veredelt sehr schön. SO-Nordamerika, bis 1 m, V-VIII.			
Holdtii Britzensis *Späth* (R. neomexicana × Pseudacacia)			
Hybride von aufstrebend überhängendem Wuchs, **125—150 cm hoch**	1.—	9.—	80.—
Zweige stachelig. B. graugrün, Bl. weisslich- **150—200 » »**	1.50	13.50	—
hellrosa, duftlos, in lockeren Trauben. VI—IX.			
neomexicana *A. Gr.* . . . . **120—150 » »**	1.50	13.50	—
Kleiner Baum mit prächtigen, lilarosa, dichten, **150—200 » »**	2.—	18.—	—
aufrechten Blutentrauben. Neumexiko, bis 10 m, VI—IX.			
Pseudacacia Decaisneana *Carr.* . . . . **125—150 » »**	1.—	9.—	—
Kräftig wachsende Form der amerikanischen, **150—200 » »**	1.50	13.50	—
stacheligen, falschen Akazie, mit schön blassrosa fleischfarbenen Blütentrauben. V—VI.			
Rosa, siehe unter „Rosen".			
Rosmarinus — Rosmarin — Labiatae.			
officinalis *L.* △ # + ... **m. Tb.** Strauch, immergrün, dicht verzweigt und dicht beblättert. B. stark aromatisch duftend, schmallanzettlich, zurückgerollt, unterseits weissfilzig, Bl. in kurzen, achselständigen Trauben, violettblau. Südeuropa, bis 1 m, IV—V. Für den Küchengarten!	1.50	13.50	—
Rubus — Himbeere, Brombeere — Rosaceae.			
bambusarum *Focke* # + ... mit Ballen Schlingstrauch, schnellwüchsig, immergrün, mit weisswolligfilzigem Austrieb, stark hakig bestachelt. B. meist dreiteilig oder bisweilen fünffingrig, stets bis zum Blattgrund zerteilt, oberseits glänzendgrün, unterseits weissfilzig. Bl. blasshellrot, klein, traubig. Fr. schwarz, essbar. Westchina, kletternd bis 4 m, VI.	2.—	—	—
chroosepalus *Focke* # . . . . mit Ballen Strauch, halbimmergrün, üppig, mit rötlichen, hakenstachligen, borstigen Trieben, B. tiefgrün, lindenblattähnlich, 7—12 cm gross, unterseits weissfilzig, Bl. in grossen, lockeren Rispen, grünlich, ohne Petalen, Fr. klein, schwarz. China, 1,5 m, VII.	2.—	—	—
coreanus *Miq.* . . . . 100—120 cm hoch Strauch, buschig, aufrecht mit braunen, weissbereiften Trieben, mit scharfen, starken Stacheln, im Winter weissholzig, B. 7zählig gross, bronzegrün, in der Jugend rötlich, unterseits behaart, Bl. klein, lilarosa, doldentraubig, Fr. rot bis schwarz. Westhupeh, bis 3 m, V—VI.	1.50	—	—
deliciosus *Torr.* (R. Roezlii *Rgl.*) ∞ . . . . Wertvoller Zierstrauch, laubabwerfend, mit lebhaft roten Trieben, B. gross, dreilappig, hellgrün, Bl. bis 5 cm breit, reinweiss, meist einzeln, wildrosenartig, Fr. hellviolett, klein. Kolorado, bis 1,5 m, V.	2.—	—	—
Fockeanus *S. Kurz.* (R. loropetalus *Franch.*) ◑ △ ■ . . . . mit Ballen Niedriger Strauch, kriechend, dichte Knäuel bildend, B. klein, dreiteilig, Blättchen kurzgestielt, fast kreisrund, 1,5—3 cm lang, stark runzlig, Triebe nicht bestachelt. Westchina, bis 30 cm, VI.	1.20	11.—	—
fruticosus albus plenus *Hort.* . . . . **100—150 cm hoch** Starkwachsender Schlingstrauch mit reichem Flor schneeweisser, dichtgefüllter Bl., bis 3 cm Durchmesser, in vielblumigen, reichverzweigten Trauben. Klettert bis 10 m hoch in alte Bäume, stark hakig bewehrt. VI—IX.	1.20	—	—
» **roseus plenus** *Hort.* . . . . 100—150 cm hoch Form mit rosa dichtgefüllten Bl., sonst wie R. fruticosus albus plenus.	1.20	—	—
Giraldianus *Focke.* . . . . **m. Tb.** Strauch von kräftigem Wuchs mit weissen, übergebogenen Trieben. B. unterseits graufilzig, schön fiederig, 7—9blätterig, Bl. in endständigen, 10—12 cm langen Trauben, klein, rötlich, Fr. schwarz. Nordchina, 2—3 m, VI.	2.50	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Rubus (Fortsetzung):			
Henryi *Hemsl.* # ⚳ . . . . **m. Tb.** Kletterstrauch, immergrün, mit stark hakig bestachelten, schwach weissfilzigen Trieben. B. tiefgrün sehr unregelmässig gestaltet, meist 3—5lappig mit mehr oder weniger grosser Blattfläche, teils auch einfach langoval. Deutlich von R. bambusarum unterschiedlich. Bl. rosalila in kurzen Trauben, Fr. glänzendschwarz. Westchina, bis 6 m, VI.	1.50	13.50	—
laciniatus, siehe unter „Brombeeren".			
nepalensis *Hort.* (R. spectabilis *Pursh.*), Frühblüher ◑ ● + ... Strauch mit frischgrüner Belaubung, Bl. lebhaft karminfarben, bis 2,5 cm breit, einzeln, endständig diesjähriger Kurztriebe, flach geöffnet, Fr. gross, rötlich dunkelgelb, essbar. Amerika, bis 2 m, IV—V.	—.60	5.—	—
odoratus *L.* Wohlriechender Himbeerstrauch ◑ ● ≃ + ... Starkwachsender Strauch, laubabwerfend, stark ausläufertreibend, stachellos, B. gross, herzförmig, 3—5lappig, bis 30 cm gross, lebhaft hellgrün, unterseits dicht weichbehaart, Bl. hellpurpurn, bis 4 cm Durchmesser, duftend, rispig, Fr. breit, halbkugelig, rot, essbar. Amerika, bis 2 m, VII—IX.	—.60	5.—	45.—
phoenicolasius, siehe unter „Brombeeren".			
polytrichus *Franch.* (R. tricolor *Focke*) ⚳ △ ⊘ . . . . . . mit Ballen Strauch, klein, laubabwerfend, niederliegend oder kletternd, stachelborstig, Zweige dicht mit gelblichen Stachelborsten besetzt. B. 10 × 6 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits weissfilzig, scharf gesägt, 3 cm lang gestielt, Bl. weiss, bis 2,5 cm breit in borstig behaarten Blütenständen. Fr. hellrot, wohlschmeckend. Herbstfärbung sehr schön weinrot. Westchina, bis 3 m kletternd, VII—VIII.	1.20	11.—	—
spectabilis, siehe R. nepalensis.			
Ruscus, siehe unter „Stauden".			
Salix — Weide — Salicaceae. Siehe auch unter „Trauerbäume".			
alba Casteriana *Hort. Angl.* . . . . . . Hochstämme 5—7 cm Umfang Coopers rote Weide aus England, wird als die beste Silberweide gerühmt.	1.25	11.—	100.—
» **splendens** *Bray.* (S. alba regalis *And.*) . . . . Baum mit silberfarbener, seidenartig glänzender Belaubung.	—.50	4.50	—
» **vitellina aurea** *Hort.* ⚘ . . . . Form mit lebhaft gelbrotem Holz. Gute Bindeweide.	—.50	4.50	—
» » **Britzensis** *Spaeth.* ⚘ . . . . Ansehnlicher Baum, 1jährige Zweige stark leuchtend rotgelb, schön im Winter. Gute Bindeweide.	—.50	4.50	—
Bocki *Seemen.* ○ △ . . . . **m. Tb.** Niedriger Strauch, mit dichten, seidig graufilzigen Zweigen, B. trübgrün, myrtenähnlich, stumpfoval, unterseits blauweiss behaart. Kätzchen silberweiss, interessant als Spätsommerblüher. Westchina, 50—80 cm, in der Heimat bis 3 m, VII—VIII.	2.50	22.50	—
caesia nana *Vill.* (S. myrtilloides *Willd.*, S. prostrata *Ehrh.*) Hechtblaue Alpenweide, ○ △ [K] . . . . Zwergstrauch mit glänzend gelbbraunen Zweigen, B. eirund, kahl, bläulichgrün, ganzrandig, stark netzadrig. Alpen, 30—100.	2.50	22.50	—
candida *Flügge.* ⚘ ≃ . . . . Strauch mit anfangs weisswolligen Zweigen, später glänzend rotbraun, B. schmallanzettlich, bis 10 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Ost-Nordamerika, 1—2 m.	—.50	—	—
caprea *L.*, Salweide, Kätzchenweide ⚳ ⚘ . . . . Strauch oder Baum von sparrigem Wuchs, Zweige glänzendbraun, B. breitelliptisch, kerbig gesägt, oberseits runzlig, glänzendgrün, unterseits grau behaart, Kätzchen vor Laubausbruch, gross, silbergrau, später lebhaftgelb. Europa, bis 7 m, III—IV.	1.—	9.—	80.—
» **weiblich** ♀ . . . . Holz mehr hellgrün, Kätzchen sehr lang, mit oder nach Laubausbruch.	1.—	9.—	—
Ⓐ » × **purpurea, Kätzchenweide!** ⚘ . . . . Sehr üppig wachsende und reichblühende Hybride, sehr früher Kätzchenträger.	1.—	9.—	80.—
Ⓐ **chrysostela** *Dode* (S. fragilis × vitellina), Gold-Säulen-Weide . **Neu!** Baum pyramidal wachsend, wie die italienische Pappel und mit gelben Zweigen, sehr zierend. B. im Trieb seidigsilbrig, später oberseits glatt, unterseits mitunter bläulich.	—.80	7.—	60.—
cinerea *L.* Aschweide, Graue Werftweide ⚘ . . . . Strauch, auch baumartig, Holz behaart, graugrün, B. anfangs behaart, später oberseits dunkelgrün glänzend, unterseits filziggrau, Blütenkätzchen dickeiförmig, ähnlich S. caprea, 1,5—2,5 cm gross. Europa bis Kamtschatka, bis 5 m, IV—V.	—.70	6.—	50.—
» **tricolor** *K. Koch* ⚘ . . . . Form mit gelb- und weissbunten B.	—.70	6.—	—

Salix (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
coccinea *Hort.* (S. chermesina *Hort.*) ⚘ . . . . 100—150 cm hoch Feuerrote Silberweide, Feuer-, Rot- oder Blutweide, zu S. alba gehörig. B. leicht wellig, oberseits leicht olivgrün, unterseits blaugrau.	—.50	4.50	40.—
cotinifolia *Sm.* (S. nigricans cotinifolia *Syme*) Perückenbaumblättrige Negerweide . . . . 80—120 cm hoch Strauch mit filzigem Holz, B. kreisrund wie Rhus Cotinus, stark pappelartig duftend, Nervatur auffallend stark hervortretend. Bis 4 m.	—.50	4.50	—
daphnoides pomeranica mas *Hort.* ⚘ . . . . . . 150—200 cm hoch Form der Reifweide mit schmäleren B., besonders guter Kätzchenträger und Bienenweide.	—.70	6.—	50.—
(Ⓡ) » **praecox** Hort. Hesse, frühe Kätzchenweide ⚘ . . . 150—200 cm hoch Form der Reifweide, besonders reich- und frühblühend. Holz glänzendgrün bis rotbraun, sonnenwärts, teils bereift. B. oberseits glänzendgrün, unterseits blaugrau. Kätzchen bis tief in den Strauch hinein. Oft schon ab November und lange anhaltend.	—.70	6.—	50.—
elegantissima, siehe unter „Trauerbäume".			
(Ⓡ) **fragilis sphaerica** *Hryn. & Kob.*, Kugelweide . . . . . **NEU!** (S. globosa baltica *Hort.*, S. alba globosa *Kuph.*). Schöne, baltische Form, die im Alter ohne jegliches Zutun dichte, flachkugelige Kronen bildet. Sehr schöne Erscheinung in der Landschaft, besonders als Uferbepflanzung.	1.—	9.—	80.—
Grahami *Borr.* (S. herbacea × phylicifolia) △ . . . . **m. Tb.** Zwergstrauch, Holz dunkel, B. bis 3 cm lang, breitoval, Rand gekerbt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits stumpf graugrün.	2.50	22.50	—
Hankensonii *Dode* . . . . Vermutlich Hybride zwischen S. babylonica × nigra oder S. nigra × alba (nach Rehder). B. sehr lang geschwänzt, bis 13 cm lang, 2 cm breit, tief drüsig gesägt, kahl, unterseits blaugrau, S. nigra nahestehend.	—.70	6.—	—
herbacea *L.* Krautweide △ . . . . **m. Tb.** Zwergstrauch, niederliegend, langsam wachsend, kurztriebig, B. fast kreisrund, 1—2 cm gross, an Blattspitze meist eingeschnitten, oberseits mattgrün, unterseits glänzend. Europa.	2.50	—	—
» **flabellaris** *Hort.*, Kriechweide △ . . . . **m. Tb.** Form der Krautweide, fächerförmig, B. rundoval, oberseits wie unterseits stumpfgrün, runzlig, sehr schwachwüchsige Kriechweide.	2.50	—	—
irrorata *And.* Kätzchenweide . . . . Strauch mit ab Spätsommer stark bereiften Trieben, B. 6—10 cm lang, lineallanzettlich, oberseits glänzendgrün, unterseits bläulich. Blütenkätzchen klein aber zahlreich, mit dunkelbraunen Schuppen, lebhafter Kontrast zu den hellen Zweigen, Kätzchen hellbraun mit leuchtendgelben Staubgefässen. WN-Amerika, bis 3 m.	—.70	6.—	50.—
lanata *L.* Wollweide ○ △ . . . . **m. Tb.** Zwergstrauch mit wolligen Trieben, B. rundlich-elliptisch, 2,5—7 cm gross, oberseits runzlig, grauseidig, unterseits bläulichgrau, wollseidig, Nervatur stark hervortretend, Holz gelb. Nordeuropa, bis 1,5 m.	2.50	—	—
laurifolia *Wesm.* (S. pentandra *L.*) Baumwollweide, Lorbeerweide . . . . Baum mit grauer Rinde und glänzenden Zweigen, B. oberseits dunkelgrün, wie lackiert glänzend, am Rande fein und gleichmässig gesägt, bis 12 cm lang, Bl. oft bis in den Hochsommer hinein, mit reichlich Samenwolle, Kätzchen goldgelb, bis 5 cm lang. Europa bis Kaukasus, bis 20 m, IV—V.	—.60	5.—	40.—
lispoclados *Dode* . . . . Strauch, zwischen S. fragilis und S. alba stehend, klein, verzweigt, mit glänzenden, geröteten Zweigen, B. oberseits glänzendgrün, unterseits weissblau, Kätzchen 1—1,5 cm lang. Westasien.	—.70	6.—	—
lucida *Mhlbg.* Kätzchenweide ⚘ . . . . Strauch mit glänzend gelbbraunen Zweigen, B. eilanzettlich mit lang ausgezogener Spitze, bis 15 cm lang, oberseits frischgrün, unterseits blasser. Kätzchen bis 7 cm lang, goldgelb. Nordamerika, bis 6 m, V.	—.70	6.—	—
macrolepis *Larxch.*, Kätzchenweide ⚘ . . . . Strauch, starkwüchsig, hellholzig, B. oberseits glänzendgrün, unterseits blaugrau, Kätzchen gross, grau.	—.70	6.—	—
Medemii *Boiss.* Orientalische Salweide, Kätzchenweide ⚘ . . . . Strauch in der Tracht wie S. cinerea, Trieb filzig, B. 6—15 cm lang, 3—5 cm breit, unterseits dicht blaugrau, junges Holz stark glänzend, Bl. dicke, silberglänzende Kätzchen, früheste der Caprea-Gruppe. Armenien, Persien, bis 4 m, III—IV.	—.70	6.—	—
Muscina *Dode.* Persische Weide Kätzchenweide ⚘ . . . . Holz sehr dunkelgrün, B. jung seidigflaumig, ältere bis 4,5 cm breit und ca. 10 cm lang, Ränder stark gewellt, Kätzchen dicht zusammenstehend, mittelgross, silbergrau, auffallend lange Hüllblätter, weisslichgrün nach abgestossener Hüllschuppe.	—.70	6.—	50.—

Salix (Fortsetzung):

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
nigricans *Sm.* (S. myrsinifolia *Salisb.*) Negerweide . . . . Bindeweide mit langen, dünnen und zähen Ruten, Strauch sparrig, Austrieb dicht behaart, B. spitzelliptisch bis rundlich, bis 10 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits blaugrün. Europa, Westasien, bis 4 m.	—.50	4.50	—
philicifolia *L.* (S. bicolor *Ehrh.*) . . . . Strauch, kurzästig, Zweige kahl, glänzendbraun, B. eiförmig bis länglich, 5—9 cm lang, fein gezähnelt oder ganzrandig, oberseits glänzendgrün, unterseits bläulichweiss. Mittelfrankreich, bis 4 m.	—.50	4.50	—
Piperi *Bebb.* . . . . Strauch mit ganz hellgrünem Austrieb. B. gross, verkehrt eiförmig bis breitlanzettlich, gestielt, stumpf zugespitzt, oberseits glänzendgrün, unterseits blaugrau, nicht filzig, in den Blattachseln auffallend grosse Nebenblättchen. Amerika, bis 6 m.	—.50	—	—
pischpekensis *E. Wolf*, Kätzchenweide . . . . Strauch mit frischgrünem Holz, B. ovallanzettlich, glänzend frischgrün, 2,5 cm gross, Kätzchen schmal zylindrisch, bis 2 cm lang, walzig, oben abgestumpft, hellgrünlichgrau. Asien.	—.70	6.—	—
pontederana mas *Hort.* (S. purpurea × cinerea), Kätzchenweide . . Strauchartig, Holz ziemlich hellgrün, B. verkehrt eiförmig bis lanzettlich, 4—6 cm lang, oberseits dunkelgrün, glatt, unterseits schwach blauseidig, ältere ganz grün, Nebenblätter gross, Kätzchen anfangs rötlich, schmal zylindrisch, guter Besatz. Bis 4 m.	—.70	6.—	50.—
pulchra *W. & K.* (S. daphnoides *Vill.*) Blutweide . . . . Baum oder Strauch von üppigem Wuchs, Holz glänzend. Europäische Alpen, Russland.	—.70	6.—	—
» **ruberrima** *Hort.*, Kätzchenweide	—.70	6.—	50.—
Hochstämme 5—7 cm Umfang. Wird nicht so stark baumartig wie die Art, Holz sehr glänzend, auf der Sonnenseite prächtig rot, sehr zierend, B. oberseits glänzendgrün, unterseits blau, Kätzchen ziemlich früh, sehr gross, herrlich gerötet, Besatz nicht dicht, aber sehr gut bei der Grösse der Kätzchen.	1.20	11.—	100.—
purpurea nana *Hort.* ⊥ △ :‖: ⌀ . . . . **NEU!** Strauch, kugelig, niedrig, auffallend dünntriebig, glänzend rotbraun, B. silberig, im Herbst rostbraunrot, Holz im Winter schön rotbraun.	1.—	8.—	70.—
Rehderiana *Schneid.* . . . . Strauch mittelhoch, feintriebig oder kleiner, vielstämmiger Baum bis 9 m, junge Triebe glänzend braunrot, B. länglichlanzettlich, etwa 10 cm lang, dunkelgrün, unterseits seidig grauweiss. Kätzchen klein, aber dicht stehend, silberweiss oder in Vollblüte purpurrot, an den kurzverzweigten Trieben. Westchina, bis 3 m, III.	—.50	4.50	—
repens argentea *Wimm. & Grab*, Silberkriechweide △ . . . . Form der Kriechweide, niederliegend, aufstrebend, B. silberig, Kätzchen kurz vor dem Laubaustrieb. Bis 1 m, III.	—.70	6.—	50.—
reticulata *L.* Netzweide △ . . . . **m. Tb.** Zwergstrauch, kurztriebig, am Boden angeschmiegt, Miniaturausgabe der S. lanata mit oberseits lederartig glänzenden B. Alpen. Zieht sehr früh ein.	2.50	—	—
retusa *L.* △ . . . . **m. Tb.** Zwergstrauch, flotter wachsend, gelbholzig, B. verkehrtoval, ganzrandig, beiderseits glänzend hellgrün, 1—2 cm gross. Europa.	2.50	22.50	—
rosmarinifolia *L.* (S. rep. angustifol. *Gren. & Gord.*) **Rosmarinweide.** ⌀ Strauch, schwachwüchsig, B. fein, an Rosmarin erinnernd, lineallanzettlich. Nordeuropa, bis 1 m.	—.80	—	—
salviaefolia *Link.* (S. incana × caprea) Kätzchenweide . . . . Strauch oder kleiner Baum, sehr wüchsig, B. violettblau schimmernd, filzig behaart, ältere oberseits kahl, ganze Pflanze mehr oder weniger weissfilzig.	—.60	5.—	40.—
Schraderiana *Willd.* (S. bicolor × repens) Sträucher 70—100 cm hoch. Hybride, ausgebreitet buschig, mit kurzen dicken Ästen, Zweige olivgrün, B. bis 5 cm lang und über 2,5 cm breit, jung beiderseits grau behaart, Kätzchen bis 2 cm lang, dick oval. Bis mittelhoch.	—.50	4.50	—
simulatrix *White.* (S. herbacea × arbuscula). Kriechweide △ . **m. Tb.** Strauch von kriechendem Wuchs, B. 1,5 cm lang, Kätzchen an belaubten Zweigen. Schweiz.	2.50	22.50	—
Smithiana *W.* (S. viminalis × caprea) Kätzchenweide . . . . Strauch, langtriebig, Zweige anfangs behaart, später dunkelbräunlich grün, B. länglichlanzettlich, oberseits dunkelgrün, unterseits grau, weichhaarig, Kätzchen dick, silbrig, auch schon an Langtrieben. Hybride, bis 6 m, III—IV.	—.80	7.—	60.—
tenuifolia *Ledeb.* Blaue Weide des Flusses Ili . . . . Strauch mit ganz schmallanzettlichen Blättern.	—.60	5.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Salsola, siehe Suaeda.			
Sambucus — Holunder, Flieder — Caprifoliaceae. ⚘			
canadensis *L.* ● ⁂ ≌ . . . . . Strauch mit Wurzelausläufern, junge Triebe bereift, B. meist 7zählig, Bl. weiss in grossen flachen, schirmartigen Scheindolden, gut duftend, Beeren schwarz, etwas bereift, Fruchtstände halbkugelig. ON-Amerika, bis 3 m, VII—VIII.	—.60	5.—	—
» **acutiloba** *Rehd.* . . . . . Form mit geschlitzten, schön dunkelgrünen Blättern.	—.80	7.—	—
» **delicatissima** *Schwer* (S. canadensis aurea *Cow.*) + ... Form mit goldgelben B., Fr. hellkirschrot, ohne den unangenehmen Hollerbeigeschmack, essbar.	—.80	7.—	—
» **lutea** *Hort.* (S. nigra lutea *Hort.*) . . . . . Form mit lebhaft goldgelben B.	—.60	5.—	45.—
(R) » **maxima** *Hesse* . . . . . Form von starkem Wuchs mit riesigen, schirmartigen, weissen Blütenständen.	—.80	7.—	—
Ebulus *L.* (Ebulum humile *Garcke*) Zwergholunder ♃ ● △ . . . . . Kriechend, queckenartig, B. 5—9paarig gefiedert, Bl. rötlichweiss, wohlriechend, in flachen Trugdolden. Als Unterpflanzung zum Verwildern im Park. Fr. schwarz. Europa, 0,60—2 m, VII—VIII.	—.60	5.—	—
(R) » **deborensis** *Kos.* ● △ . . . . . Form mit schön geschlitzt fiederigen B.	—.60	5.—	—
melanocarpa *A. Gr.* (S. californica *Hort.*) ● ⁂ . . . . . Strauch, aufrecht, breitbuschig, B. 5—9zählig, Bl. gelblichweiss in bis 10 cm langen Blütenständen, Fr. glänzendschwarz bis braun, dick. NW-Amerika, bis 4 m, VII—VIII.	—.60	5.—	—
nigra *L.* Gemeiner Holunder ● ⁂ + ... Strauch mit grauen Zweigen, B. fiederig, dunkelgrün, unterseits heller, Bl. stark duftend, weiss in schönen, flachen Blütendolden. Fr. rot, später schwarz. Europa bis Kaukasus, bis 10 m, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
» **argenteo-marginata** *Hort.* . . . . . Form mit schön weiss gerandeten Blättern.	—.80	7.—	—
» **laciniata** *L.* . . . . . Form mit sehr zierenden, fein zerschlitzter Belaubung.	—.60	5.—	45.—
(R) » **latisecta** *Hesse* . . . . . Form, sehr starkwüchsig, mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen B.	—.60	5.—	—
» **leucocarpa** *Hayne* (S. nigra alba *West.*, S. n. fructu albo *Burgsd.*, S. n. fr. albo-pellucido *v. Houtte*) ⁂ . . . . . Form mit hellgrünen Trieben und B., Fr. hellgrün mit weisslichen Längsstreifen, bei Vollreife glasig.	—.60	—	—
» **nana** *Grf. Schwer.* △ . . . . . Schwachwüchsige Form, bildet einen kleinen, kugelförmigen Busch. Bis 1 m.	1.25	—	—
(R) » **nana bicolor** *Hesse* △ . . . . . Form von zwergigem Wuchs mit weiss bestäubten B.	1.20	—	—
racemosa *L.* Traubenholunder ● ⚘ ⁂ . . . . . Strauch, sehr starkwachsend, Zweige hellbraun, Blattfieder kleiner als bei den übrigen Arten, Bl. gelblichweiss in dichten, eiförmigen, traubigen Rispen, Fr. korallenrot, sehr zierend. Europa, Orient, bis 3 m, V.	—.70	6.—	—
» **arborescens** *Koehne* (S. pubens arborescens *Nutt.*) . . . . . Form, baumartig hochwachsend, B. scharf gesägt, Austrieb stark behaart, B. oberseits bald kahlend. Sehr starkwüchsig. Blüht später als S. racemosa.	—.70	6.—	—
» **aurea** *Hort.* . . . . . Form mit schön gelben B.	—.80	7.—	—
Sarcococca — Schleimbeere — Buxaceae. ● △ # ⚘			
humilis *Stapf* (S. Hookeriana humilis *Rehd. & Wils.*) mit Ballen 15—20 cm hoch Strauch, immergrün, B. lederig, länglich, glänzend hellgrün, Bl. in den Blattachseln, stark nach Honig duftend. Westchina, bis 80 cm, II—III.	1.20	11.—	—
pruniformis *Ldl* (S. saligna *Muell.*) ∧ . . . mit Ballen 20—40 cm hoch Strauch, immergrün, Trieb hellgrün, B. länglich-lanzettlich, glänzend sattgrün, Wuchs lockerer als bei S. humilis, B. bis 12 cm lang, Bl. achselständig in ährigen Köpfchen, weiss mit Rot. Himalaja, bis 2 m, II—III.	1.20	11.—	—
ruscifolia *Stapf.* . . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, Wuchs straff, B. schön spitzoval, sattgrün, Bl. weiss in den Blattachseln, duftend. Westchina, bis 2 m, II—III.	1.20	11.—	100.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sarothamnus, siehe Genista.			
Schizophragma, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Securinega — Hartholz — **Euphorbiaceae**			
japonica *Miq.* (S. fluggeoides *Müll.-Arg.*) ⌀ . Sträucher 60—80 cm hoch Strauch, laubabwerfend, rutig verästelt, Triebe bräunlich, übergebogen, B. spitzelliptisch, sattgrün, Herbstfärbung lebhaft gelb, Bl. hellgelb, achselständig. Japan, bis 2 m, VII—VIII.	—.80	7.—	60.—
ramiflora *J. Müll.* . . . . Sträucher 60—80 cm hoch Strauch, laubabwerfend, feinzweigig, B. hellgrün, bis 6 cm lang, elliptisch, unterseits blaugrau, Bl. weiss, gebüschelt. Mongolei, bis 2 m, VII—VIII.	—.80	7.—	—
Senecio — Kreuzkraut — **Compositae**			
Greyi *Hook.* △ # ∧ . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch Strauch, immergrün, alle Teile wollig weissfilzig, B. länglich, breit eiförmig, oberseits sattgrün, Rand hell, unterseits weisswollig, Bl. sattorangegelb, in köpfigen Rispen. Neuseeland, 30—50, VII—VIII.	1.50	13.50	—
Skimmia — Skimmie — **Rutaceae.** △ #			
japonica *Thbg.* (Sk. oblata *T. Moore*) . . . . . **m. Tb.** 15—20 cm hoch Strauch, immergrün, B. glänzend gelblichgrün, an den Triebenden dichtstehend, 8—12 cm lang, 2—4 cm breit, Bl. weiss, Fr. korallenrot. Japan, bis 1 m, V.	2.—	18.—	—
» **Veitchi** *Rehd.* . . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch Form, deren B. grösser und mehr sattgrün sind, mit gelbem Rand, sonst wie die Art.	2.50	—	—
Rogersii *Hort.* (Sk. Foremanii Rogersii *Rehd.*) . **m. Tb.** 30—40 cm hoch Form von Sk. Foremanii, der Hybride zwischen Sk. japonica × Reevesiana, B. sattgrün, Fr. flachkugelig, karmesin.	3.—	—	—
rubella *Carr.* (Sk. Reevesiana rubella *Rehd.*) nur ♂ **m. Tb.** 20—30 cm hoch Männliche Form mit schön roten Bl., auch Knospen u. Blattstiele rötlich.	2.50	22.50	—
Sophora — Schnurbaum — **Leguminosae.**			
flavescens *Ait.* ♄ . . . . Halbstrauch, B. 6—7paarig, länglich eiförmig, Bl. in endständigen Trauben, weiss bis gelblich. Westhupeh, bis 2 m.	1.—	9.—	—
japonica *L.* Japanische Sophore . . . . . . Sträucher 100—150 cm hoch Baum, laubabwerfend, an Robinia erinnernd, B. mehr stumpf dunkelgrün, Bl. gelblichweiss in gross. pyramidal. Rispen. China, Korea, bis 25 m, VIII.	1.20	11.—	100.—
Sorbaria — Fieder-Spierstrauch — **Rosaceae.**			
angustifolia *Zbl.* (S. Aitchisoni *Hemsl.*) . . . . Strauch, laubabwerfend, Triebe gerötet, B. gefiedert, sattgrün, Blattstiele gerötet, Bl. weiss in bis 30 cm grossen Rispen. Westhimalaja, bis 3 m, VII—VIII.	—.80	7.—	—
arborea *C. S* . . . . Strauch oder baumartig, B. mit 13—15 sehr spitz eilanzettlichen Fiederchen, über 12 mm breit, scharf doppelt gesägt, Bl. weiss in lockeren, bis 30 cm langen Rispen. Westchina, bis 6 m, VIII.	—.80	7.—	—
» **glabrata** *Rehd.* . . . . Form, schnellwüchsig, mit schön rotem Austrieb, Zweige und Blattstiele kahl, Bl. rahmweiss mit zierlichen Staubfäden in grossen Blütenständen.	—.80	7.—	—
sorbifolia *A. Br.* ● . . . . Strauch, an Ebereschen erinnernd, B. hübsch gefiedert, 13—23blättrig, lichtgrün, doppelt gesägt, Bl. in grossen, aufrechten, rispigen Blütenständen. Nordasien, bis 2 m, VI—VII.	—.70	6.—	—
» **stellipila** *Maxim.* . . . . Form mit unterseits weisslich büschelhaarigen B., Bl. in grossen, ebenfalls behaarten Blütenständen, sonst wie die Art. Japan, VII.	—.80	7.—	—
Sorbaronia — Sorbus × Aronia — **Rosaceae.**			
alpina *Schneid.* (Sorbus Aria × Aronia arbutifolia, Sorbus alpina *Heynh.*) Hybride, strauchartig, mit kräftigen Zweigen, 150—180 cm hoch B. und Bl. kleiner als bei Sorbus aria, Fr. weinrot.	2.—	18.—	—
Dippeli compacta *Dieck* . . . . 80—120 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang Schwachwachsende Form der Hybride (Sorbus aria × Aronia melanocarpa) von ganz dichtem, kreisrundem Wuchs. Mutterbaum hat 20 Jahre nach der Pflanzung einen Kronendurchmesser von nur 3,5 m.	2.—	18.—	—

Sorbus — Vogelbeere, Mehlbeere — Rosaceae.	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alpina, siehe Sorbaronia alpina.			
aria *Crantz.* Gemeine Mehlbeere . . . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.75	16.—	—
» 8—10 » »	2.—	18.—	—
Strauch oder Baum mit pyramidaler Krone, laubabwerfend, B. einfach, 5—12 cm gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig, Bl. weiss, Fr. rotorange. Europa, bis 15 m, V.			
» **edulis,** siehe S. nepalensis.			
» **lutescens** *Hort.* . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Form der gemeinen Mehlbeere, von » 8—10 » »	2.50	22.50	200.—
schön pyramidalem Wuchs, starkwüchsig, » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
grossblättrig, stark filzig, leuchtend gelb austreibend. Sehr wirkungsvoll.			
(R) » **magnifica** *Hesse* . . . . Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Form besonders straff aufrechtwach- » 8—10 » »	2.50	22.50	200.—
send, daher als Alleebaum beliebt. B. » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
bedeutend grösser als die der Art, » 12—14 » »	3.50	31.50	—
oberseits glänzend schwärzlichgrün, unterseits fast weiss, im Herbst auffallend lange haftend.			
» **majestica** *Zbl.* & . . . . 150—200 cm hoch	1.50	—	—
Form mit auffallend grösseren B., sonst wie die Art.			
» **vestita** *Hort.* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	—
Baum oder Strauch mit in der » 10—12 » »	3.—	27.50	—
Jugend schneeweissfilzigen Trieben, B. oberseits abwischbar filzig, unterseits dick schneeweissfilzig, Blütenstände dick weissfilzig, Bl. weiss, Fr. kugelig, rötlichgrün bis bräunlich. Nepal, 6 m, VI—VII.			
aucuparia *L.*, Gemeine Eberesche . . . . . . Heister 200—250 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
Baum, laubabwerfend, B. gefiedert, bis 20 cm lang, Fiederchen 9—15, lanzettlich, scharf gesägt, sattgrün, Bl. weiss, bis 1 cm breit, in bis 15 cm breiten Doldentrauben. Fr. scharlachrot, rund. Sehr schmückender Strassen- und Alleebaum. Europa, Asien, bis 15 m, V.			
» **Dirkensi aurea** *Hort.* Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Form mit leuchtend goldiggrünem Austrieb, B. beiderseits, besonders unten weisshaarig, gelbgrün.			
» **moravica** *Zeng.* (fructu dulce). +			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
Form mit grossen, säuerlichen, essbaren Früchten. Wie Preiselbeere zu verarbeiten als sehr gesundes Kompott. Auch auf schlechten Böden noch gut gedeihend.			
» » **laciniata** *Beissn.*,			
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Form mit sehr fein geschlitzten B.			
» **pendula,** siehe unter „Trauerbäume".			
» **rossica** *Späth.* & Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Form mit sehr schönem Fruchtbehang, Fr. kugelrund, korallenrot von süss-säuerlichem Geschmack. Fiederblättchen stark gesägt.			
» » **major** *Späth.* & + Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Form mit noch grösseren Fr., kurzoval, scharlachrot. Geschmack frei von jeder Bitterkeit.			
commixta rufo-ferruginea *Schneid.* . . . . 120—150 cm hoch	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Form der japanischen Art, von frühem, bräunlichem Austrieb, B. 5—7-paarig, Blättchen lang zugespitzt, scharf gesägt, unterseits auffällig rostig zottig. Fr. scharlachrot, Spindel ebenfalls rostig zottig.			
cuspidata *Hedl.* . . . . 150—180 cm hoch	2.—	—	—
Prächtige, aber nur schwachwüchsige Art. B. sehr gross, ungeteilt, Rand nur doppelt gesägt, bis 20 cm gross, bei 10 cm Breite, beiderseits wolligfilzig, unterseits schneeweiss, sehr auffallend, aber etwas heikel.			
dentata *Hort.* . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang,	2.—	—	—
Baum von schlankem Wuchs, B. tiefge- » 10—12 » »	2.50	—	—
lappt, obers. frischgrün, Austr. u. Blattunterseite in der Jugend weissfilzig.			
Dippelii compacta, siehe Sorbaronia Dippeli compacta.			

Sorbus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
discolor *Hedl.* ● Ø . . . . 120—150 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Baumartiger Strauch mit leicht bronziertem Austrieb, junges Holz leuchtend braunrot, B. dunkelgrün, Blättchen 13—17, unterseits blaugrau, Fr. fast durchscheinend, weisslich- oder gelblichrosa, 6—7 mm dick. Herbstfärbung feurigorange. Nordchina.			
foliolosa *Spach.* & Ø . . . . 200—250 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
Baumartiger Strauch von zierlichem Aussehen mit rötlichen Zweigen, B. 15—18 cm lang, kleinfiedrig, Fiederblättchen 19—29, 1,5—2,5 cm gross, tief gesägt, Blütenstände rostig behaart, Bl. sehr klein, weiss, Fr. hellrosenrot, 8 mm dick. Herbstfärbung schön rotbraun. Himalaja, Yunnan, bis 5 m, VI.			
gracilis *Decne.* . . . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Strauch von kräftigem Wuchs, B. im Austrieb rötlich, weisswollig, später fast kahl, dann oberseits dunkelgrün, unterseits weisslichgrün, Bl. scheindoldig. Japan, bis 2 m, VI.			
Hostii *S.* (S. aria × Chamaemespilus) . . . . 80—100 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	—	—
Strauch von sparrigem Wuchs, B. schön tiefgrün, Bl. hellrosa in flacher Doldenrispe, Fr. gross, oval, rot. Mitteleuropa, bis 4 m, V.			
hybrida *L.* (S. aria × aucuparia) Finnland-Mehlbeere . 200—250 cm hoch	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
» » » » » 200 » 12—14 » »	3.50	31.50	280.—
Strauch oder Baum mit dichter Krone, junge Triebe lockerfilzig, B. oberseits sattgrün, unterseits dick weissgraufilzig, Bl. weiss, Fr. korallenrot. Skandinavien, Finnland, bis 12 m, V.			
intermedia *Pers.* (S. scandica *Fries*) Nordische Mehlbeere 150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	—	—
» » » » ca. 200 » 12—14 » »	3.50	—	—
Baum mit ganz ungefiederten B. Ulmenersatz für Landstrassen.			
Koehneana *Schneid.* (Rock 15025) & . . . . 100—120 cm hoch	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
Strauch mit kahlen Zweigen, im Winter rotbraun, B. gefiedert, 17—25fiederig, scharf gesägt, oberseits frischgrün, unterseits graugrün, Bl. weiss, gegen 1 cm gross, in bis 8 cm breiten Blütenständen, Fr. weiss, länglich, 6—7 mm dick, an roten Stielen. China, bis 3 m, V—VI.			
latifolia *Pers.* (S. atrovirens *Hort.*) (S. aria × torminalis) 150—180 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 12—14 cm Umfang	3.50	—	—
Baum von aufrechtem Wuchs, B. sehr schön, breit und glänzend tief dunkelgrün, Fr. rotorange, gross. Mitteleuropa, bis 10 m.			
minima *Hedl.* . . . . 150—180 cm hoch	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	18.—	—
Baumartiger Strauch, B. unregelmässig tief gelappt, im vorderen Teil nur gesägt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weisswollig.			
nepalensis *Hort.* (S. aria edulis *Wenz.*) . . . . 150—200 cm hoch	1.20	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 10—12 cm Umfang	3.—	27.—	—
» » » » 180—200 » 12—14 » »	3.50	31.50	—
Baum mit dicht weissfilzigem Austrieb, B. länglichelliptisch, lederig dick, oberseits glänzend dunkelgrün, nur in der Jugend abwischbar filzig, unterseits dicht silberweissfilzig. Bl. gelblichweiss in 6—8 cm breiten, dicht weissfilzigen Blütenständen.			
scandica, siehe S. intermedia.			
serotina *Koehne* & Ø . . . . 100—150 cm hoch	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
» » » » » 200 » 8—10 » »	2.50	22.50	—
Baum von kräftigem Wuchs, aufrecht, B. oberseits dunkelgrün, unterseits hell graugrün, scharf gesägt, Blättchen meist 13, Bl. klein, weiss, Fr. erbsengross, korallenrot, im Herbst lange haftend, Herbstfärbung gelbrot. Nordchina, V.			
thianshanica *Rupr.* . . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
Strauch oder kleiner Baum, Zweige glänzend rotbraun, B. fast lederig, bis 7paarig, Blättchen lanzettlich, gesägt, bis 6 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, Bl. schneeweiss, in bis 15 cm breiter Dolde, Fr. rundlich, lebhaft karmesinrot, sehr winterhart. China, 2,5—4 m, V.			
Wilsoniana *Schneid.* . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.50	—	—
Art mit zierlichem Laub, Fiederblättchen oberseits glänzend hellgrün, unterseits hellgraublau bereift. Westhupeh.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Spartium — Besenpfriemen — Leguminosae.			
junceum *L.* ○ ∧ . . . . **m. Tb.** Strauch mit stielrunden, binsenartigen Zweigen, B. sehr wenig, bläulichgrün, länglich, bis 3 cm lang, Bl. goldgelb, ähnlich dem Besenginster, gross, duftend. Mittelmeergebiet, bis 3 m, V—IX.	1.—	9.—	—
Spiraea — Spierstrauch — Rosaceae. *Benennung nach Zabel.*			
albiflora *Miqu.* (**Sp. callosa alba** *Hort.*) △ . . . . Zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Bl. in zahlreichen flachen Doldenrispen. Japan, 50 cm, VII—VIII.	—.60	5.—	45.—
arbuscula *Greene* (Sp. splendens *K. Koch*) . . . . Grossblättrige Art mit grossen, rosa gefärbten, gewölbten Doldenrispen an langen, aufrechten Jahrestrieben endständig. Amerika, 60 cm, V—VI.	—.60	5.—	—
arcuata *Hook. fil.* ⊥ . . . . **NEU!** Strauch mit kurzen, starken Ästen, stark bogig, B. lanzettlich, tiefgrün, schwach gezähnt, Bl. weisslich, in zahlreichen, flachen Blütendolden entlang der Zweige. Himalaja, 1—1,5 m, VI—VII.	—.80	7.—	60.—
arguta *Zbl.* (**Sp. multiflora × Thunbergi**) ⊥ . . . . Zierlich hellgrün belaubte, sehr schön und reich vor dem Laub blühende Hybride mit schneeweissen Scheindolden entlang der vorjährigen Triebe. Für Treiberei geeignet und besonders für Böschungs- und Randpflanzung sowie für Einzelstellung. Hybride, 1—1,5 m, V.	—.80	7.—	60.—
ariaefolia *Sm.* (**Holodiscus discolor ariaefolius** *Wats.*) ⊥ . . . . . Unterseits graufilzig, fiederlappig belaubte Art mit grossen, gelblichweissen Blütenrispen an leicht überhängenden Zweigen endständig. Auch die Fruchtstände wirken noch zierend. Amerika, 2—3 m, VII.	—.80	7.—	60.—
brumalis *Lange* . . . . Lebhaft grün und lanzettlich belaubter Strauch mit lockeren, dicht behaarten Blütenständen von bis 30 cm Durchmesser, Bl. weiss mit schwach fleischfarbigem Anflug. 1—1,5 m, ab VIII.	—.60	5.—	—
bullata *Maxim.* (**Sp. crispifolia** *Hort.*) △ . . . 1000 St. M. 180.— Strauch dicht gedrungen wachsend, B. klein, rauhrunzlig, frischgrün, lederartig, Bl. karminrosa in dichten, halbkugeligen Blütenständen. Japan, 50 cm, VII.	—.30	2.50	20.—
Bumalda-Formen, siehe unter Sp. pumila Bumalda und Formen.			
cana *W. & Kit.* △ . . . . Dichtbuschiger Strauch, B. grau behaart, Bl. weiss in Dolden am Ende diesjähriger Kurztriebe. Balkan, 100, V.	—.60	5.—	45.—
cana × Thunbergi *Hort.* △ . . . . Dichtbuschiger Strauch, zwischen den beiden Eltern stehend. 100, V.	—.60	5.—	45.—
canescens myrtifolia *Zbl.* . . . . Strauch von dichtem, breitem Wuchs, B. schmal-länglich, Zweige leicht übergeneigt, Bl. weiss, am alten Holze dicht stehend. 150, VI—VII.	—.80	7.—	60.—
cantoniensis *Lour.* (Sp. Reevesiana *Ldl.*) . . . . Mittelhoher Strauch, B. schön dunkelgrün, unterseits bläulich, Bl. weiss, in dichten Dolden. Verträgt viel Trockenheit. China, Japan, 150, V—VI.	—.60	5.—	45.—
chamaedryfolia *L.* ● . . . . Überhängender Strauch mit kantigen, bräunlichgelben Zweigen, B. scharf zugespitzt, eiförmig-lanzettlich, Bl. weiss in zahlreichen, vielblumigen Dolden. Asien, 150, V—VI.	—.60	—	—
cinerea *Zbl.* (**Sp. cana × hypericifolia**) . . . . Hybride mit kantigen Zweigen, zimtbraunfilzig, B. graugrün, fast ganzrandig, Bl. reinweiss in kurzgestielten Scheindolden an den Zweigenden. 150, V.	—.60	5.—	45.—
conspicua *Zbl.* (**Sp. albiflora × latifolia**) . . . . Hybride, B. länglich, Bl. rötlichweiss, von langer Dauer, bis 8 mm Durchmesser, in verästelt zusammengesetzten Dolden. 100—150, VII—X.	—.60	5.—	—
crenata *Willd.* . . . . Strauch ohne Ausläufer, B. zierlich, graugrün, Bl. weisslich, in dichten, halbkugeligen Ebensträussen. Ungarn, Südrussland, 100—150, V—VI.	—.60	—	—
decumbens *W. D. J. Koch* (Sp. procumbens *Hort.*) △ ○ ‖ . . . . **m. Tb.** Sehr wüchsiger Zwergstrauch B. klein, kahl, frischgrün, Bl. klein, weiss, in zahlreichen, bis 5 cm breiten Blütenständen. Kärnten, Südtirol, 20, VI.	1.50	13.50	—
Douglasi *Hook.* . . . . Strauch mit behaarten Trieben, B. länglich, unterseits weissfilzig, Bl. purpurrosa in schmalkegelförmigen, endständigen Rispen. Macht zahlreiche Wurzelausläufer. NW-Amerika, 200—250, VI—VII.	—.60	5.—	45.—
fontenaysi alba *Bil.* (Sp. canescens × latifolia) . . . . Reichblühende Hybride mit braunbehaarten Trieben, B. unterseits hellbläulichgrün, grob gesägt bis gezähnt, Bl. reinweiss in grossen, pyramidalen Rispen. 100—150, VI—VII.	—.60	5.—	—

Spiraea (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
grossulariaefolia vera *Hort. Holl.* △ Niedriger, ausgebreitet wachsender Strauch, B. an Ribes erinnernd, rundlich, bis 3 cm Durchmesser, gelappt und gekerbt, blaugrau bereift, Bl. schneeweiss in kleinen, vielblumigen Dolden. Ausgezeichnet für Steingärten. VI.	1.—	—	—
Henryi *Hemsl.* ⊥ Breitausladender Strauch, Zweige schwer übergebogen, B. ovalelliptisch, oberseits sattgrün, unterseits behaart graugrün, Bl. reinweiss in breiten, flachen Dolden an Kurztrieben entlang der Zweige. West-Hupeh, 200—250, VI—VII.	—.70	6.—	50.—
inflexa *K. Koch* (Sp. crenata × mollis) (Sp. conferta *Zbl.*) Reichblühende Hybride, Bl. milchweiss, gross, zahlreich, Blütentriebe meist zierlich nach abwärts gebogen. 150, V—VI.	—.70	—	—
japonica macrophylla *Sim.-L.* (Sp. Fortunei macrophylla *Hort.*) Ø Form mit schön rotem Austrieb, B. gross, blasig-runzlig Bl. karminrot in kleinen Doldenrispen, Herbstfärbung gelb bis dunkelrotbraun. 150, VII.	—.60	5.—	45.—
longigemmis *Maxim.* Aufrechter Strauch, B. lanzettlich, oberseits freudig grün, unterseits stark netzadrig, hellgrün, Bl. weiss in 6—8 cm grossen, flachen Doldentrauben am Ende diesjähriger Langtriebe. NW-China, 100—150, VI.	—.60	5.—	—
Margaritae *Zbl.* (Sp. japonica × superba) ◑ Ø Schöne Hybride, B. elliptisch, oberseits kahl und mattdunkelgrün, unterseits hellgrün, fein behaart, Bl. lebhaft rosa, im Verblühen heller werdend. Beachtenswerte Herbstfärbung. 100, VII.	—.80	7.—	—
Menziesii alba × Douglasi *Zbl.* Hybride mit grossen, kegelförmigen Rispen, Bl. fleischfarbig. Ziemlich hochwachsend.	—.60	5.—	—
» **Billiardi** *Bill.* Form mit schmalen, gedrängten Blütenrispen, Bl. rosa, Strauch hochwachsend.	—.60	5.—	45.—
» **macrothyrsa** *Zbl.* (Sp. californica *Hort. germ.*) Stattliche, hochwachsende Form, Rispen bis 20 cm hoch, 10 cm breit, Bl. gross, rosa. VI—VII.	—.60	5.—	—
» **ovalifolia** *Zbl.* (Sämling von Sp. Douglasi) Form mit ovalen B., 5—6 cm lang, 2,5—3 cm breit, Bl. purpurrosa, Rispe oft stark zusammengesetzt.	—.60	5.—	—
» **pseudo-Douglasi** *Zbl.* (Sämling von Sp. Douglasi) Form von kräftigem Wuchs, B. lang und schmal, 8—9 cm lang, 2,5—3,5 cm breit, Bl. purpurrosa.	—.60	5.—	—
micropetala superhypericifolia acutifolioides *Zbl.* Form mit graugrünen, langen, schmalen B., meist ganzrandig, Bl. weiss. Ende VI.	—.60	5.—	—
microthyrsa *Zbl.* (Sp. alba × media) Strauch ziemlich hoch, B. lanzettlich, Bl. ziemlich gross, milchweiss, schön geschlossen, Blütenstände endständig diesjährigerKurztriebe. Anf. VI—VII.	—.60	5.—	45.—
mollis *K. Koch* (Sp. cana × media) △ Mittelhoher, graubehaarter Strauch, B. klein, rundoval, grauwollig, Bl. reinweiss in kleinen Dolden von bis 2 cm Durchmesser. V.	—.80	7.—	60.—
mongolica *Maxim.* Mässig hoher Strauch mit dünnen, knorrigen Zweigen, B. elliptisch, hellgrün, Bl. rahmweiss in kleinen Trugdolden. V.	—.60	5.—	—
Nobleana *Hook.* (Sp. betulifolia × Douglasi) Hybride mit bis 15 cm hohen und breiten Rispen, Bl. lebhaft rosa. VI—VII.	—.60	5.—	—
» **superbetulifolia** *Zbl.* Form mit breitpyramidalen Rispen, 8—10 cm gross, Bl. satt karminrot mit etwas helleren Staubfäden. Eine der schönsten, dunkelroten Formen.	—.60	5.—	45 —
notha superlatifolia *Zbl.* Form mit aus kegelförmigen Rispen zusammengesetzten Blütenständen. Bl. weiss.	—.60	5.—	—
nudiflora *Zbl.* (Sp. bella × ulmifolia) Mittelhoher Strauch, Bl. weisslichrosa, zahlreich, in aufrechten Blütenständen entlang der vorjährigen Triebe, Knospen dunkler rosa. VI.	—.60	—	—
oxyodon *Zbl.* (Sp. flexuosa × media) Mittelhoher Strauch, Bl. weiss in vielblumigen Doldentrauben. V.	—.60	5.—	—
kopiviensis *Bess.* (Sp. crenata × media) Strauch kräftig wachsend, frühblühend, Bl. weiss, in Dolden rings um den Zweig stehend. V.	—.60	5.—	—
polonicka *Blocki* Wahrscheinlich nördliche Standortform von Sp. media mit mehr gelblichen Bl., auch in Blatttracht und Art der Blütenstände von Sp. media abweichend.	—.60	5.—	45.—

Laubhölzer

Spiraea (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
pruinosa *Hort. Musk.* (Sp. canescens × Douglasi) . . . . Hybride mit graugrünen B., Bl. hellrosa-fleischfarben, Blütenrispen dichtfilzig. Bis 2 m, VI—VII.	—.60	5.—	—
prunifolia *Sieb. & Zucc.* . . . . Mittelhoher Strauch mit schlanken, rutenförmigen Trieben, B. schön grün, länglich bis länglich-eiförmig, Bl. weiss in Dolden. China, Japan, bis 1,5 m, IV.	—.80	7.—	—
» **plena** *Zbl.* Ø . . . . Form mit sehr schönen, bis 1 cm Durchmesser haltenden, gefüllten, reinweissen, röschenartigen Bl., Herbstfärbung sehr fein glühendrot bis purpurbraun.	—.80	7.—	60.—
pumila Bumalda *Hort.* △ . . . . Form von niedrigem Wuchs der Hybride Sp. albiflora × japonica mit schmalen B., mitunter gelbbunt, Bl. karminrosa.	—.60	5.—	45.—
» **Bumalda Anthony Waterer** *Water.* △ . . . . Form von dichtem, niedrigem Wuchs, B. dunkelgrün, schmallänglich, teilweise weiss und gelbbunt, Austrieb zuweilen rosa, Bl. dunkelkarminpurpur. Bis 1 m, VI—VIII.	—.60	5.—	45.—
» » **crispa** *Hesse.* △ . . . . Form in Wuchs, Panaschierung und Blütenreichtum wie Sp. pum. Bum. Anthony Waterer, aber B. bedeutend breiter, sehr zierend am Rande zerschlitzt, gekraust und gewellt. Von bester Wirkung. Bis 1 m, VI—IX.	—.60	5.—	45.—
» **glabra** *Hort.* Ø △ . . . . Form mit unterseits stark bläulichen B., Bl. herrlich rosa. Bis 1 m.	—.60	5.—	45.—
pumilionum *Zbl.* (Sp. decumbens × Hacqueti) △ . . . . **m. Tb.** Zwergstrauchhybride, B. dunkelgrün bis bläulich, an der Blattspitze derb gesägt, Holz rötlich, Bl. weiss, in Dolden, von überraschender Reichblütigkeit. Hybride, bis 50 cm, VI.	—.80	7.—	60.—
revirescens superjaponica *Zbl.* . . . . Form der Hybride Sp. expansa × japonica, hochwachsend und der Sp. japonica nahestehend. Bl. rosa.	—.60	5.—	—
Rosthornii *Pritz.* . . . . Schlanktriebiger Strauch mit fast runden Zweigen, B. lebhaft hellgrün, aus rundlichem Grunde spitzeiförmig, 3×1,5 cm gross, beiderseits seidig zottighaarig, unterseits besonders dicht. Bl. weiss in dichten Doldenrispen, 5—6 cm Durchmesser. Westchina, bis 2 m, VI.	—.60	—	—
rubra *Hort.* (Sp. Douglasi × expansa) . . . . Form von mittelhohem Wuchs, B. länglichlanzettlich, ziemlich langgestielt, 8—10 cm lang, bis 3 cm breit, unterseits graufilzig, Bl. sehr schön dunkelrosa, in grossen, langpyramidalen Blütenrispen. VI—VII.	—.60	5.—	—
salicifolia latifolia *Ait.* . . . . Form mit rotbraunen Trieben, B. länglichelliptisch bis oval, unterseits bläulich, bis 6 cm lang, 3 cm breit, Bl. weiss oder mit fleischfarbenem Anflug in grossen, kegelförmigen Rispen. Nordamerika.	—.60	5.—	—
» × **superba** *Zbl.* . . . . Ziemlich starkwachsende Hybride, B. gross, tiefgrün, Bl. weisslich in stumpf kegelförmigen Doldenrispen.	—.60	5.—	—
Sargentiana *Rehd.* . . . . Strauch mit jung schwach flaumhaarigen Trieben, ältere gelbbraun, B. länglich-elliptisch, oberseits schwärzlichgrün, unterseits wollig behaart, Bl. gelblichweiss, in vielblumigen, dichten, doldigen Blütenständen. Westchina, bis 2 m, VI.	—.70	6.—	50.—
syringaeflora *Lem.* (Sp. albiflora × salicifolia) . . . . Schöne, niedrige, buschige Hybride, B. länglich, bis 8 cm lang, mattgrün, Bl. rosa, in dichten, pyramidalen Rispen. Bis 75, VI.	—.60	—	—
Thunbergi *Sieb.* . . . . Strauch mit feiner, dichter Bezweigung, B. lineallanzettlich, lebhaft hellgrün, scharf gesägt, Bl. reinweiss, bis 12 mm Durchmesser, in meist 5 blütigen Dolden, vor dem Erscheinen der B., frühestblühende Art. China, 50—100, IV—V.	—.80	7.—	60.—
tomentosa *L.* Ø . . . . Strauch mit kantigen, graubraunfilzigen Zweigen, straff aufrecht, B. langoval, gekerbt, gelblichgrün, unterseits graufilzig. Herbstfärbung schön matt rötlichorange. Bl. hellkarminrosa, in dichter, schlank pyramidaler Rispe, 30—40 cm lang, sehr reichblüh. Nordamerika, 1—1,5 m, VII—VIII.	—.60	5.—	45.—
trilobata *L.* (Sp. grossulariaefolia *Hort.*) △ . . . . Strauch, ziemlich breitgehend, junge Triebe stark rötlichviolett, B. kurz gestielt, rundlich, 2 cm Durchmesser, hellgrün, Bl. reinweiss in bis 4 cm breiten, doldigen Blütenständen. Sibirien, Turkestan, China, 1 m, V—VI.	—.80	7.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Spiraea (Fortsetzung):			
vacciniifolia *Lodd.* △ . . . . **m. Tb.** Zwergstrauch, schlankzweigig, niederliegend, B. länglich eiförmig, 3—4 × 2—3 cm gross, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün, Bl. weiss. Himalaja, bis 50, VI.	1.20	11.—	—
Vanhouttei *Briot* (Sp. cantoniensis × trilobata) . . . . Strauch, dichtzweigig, überhängend, B. dreilappig, gekerbt, Bl. schneeweiss, in kurzgestielten Dolden. Herbstfärbung schön feurigrot bis dunkelrotbraun. Bis 2 m, V—VI.	—.70	6.—	50.—
Veitchi *Hemsl.* . . . . Strauch, starkwachsend, Triebe bogig überhängend, kräftig, kantig, anfangs rötlich, bald bräunlichgelb, mit weisslichem Flaum, B. kurzgestielt, langelliptisch, 30×12 mm, oberseits stumpf dunkelgrün, unterseits heller, Bl. weiss, in dichten, 3—6 cm gross. Dolden. Mittelchina, bis 3,5 m, VI—VII.	—.80	7.—	—

Spiraea, in Sorten meiner Wahl
100 Stück M. 40.—, 1000 Stück M. 380.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Staphylea — Pimpernuss — Staphyleaceae.			
Bumalda *De Cand.* . . . . Strauch, frühtreibend, B. dreiteilig, lebhaft grün, auf rötlichgrünen oder purpurfarbenen Stielen, Bl. gelblichweiss, in lockeren, bis 6 cm langen Trauben. Japan, bis 1,5 m, VI.	1.—	9.—	—
Emodi *Wall.* Himalaja-Pimpernuss . . . . Strauch oder kleiner Baum mit bereiften Zweigen, B. dreizählig, länglich zugespitzt, fein aber scharf gesägt, unterseits weissgrau bereift, Bl. weiss, in hängend. Rispentrauben, Fr. 5—8 cm lang. Für warme Lagen. Himalaja.	2.—	—	—
pinnata *L.* Gemeine Pimpernuss ◑ ● . . . . Strauch von aufrechtem Wuchs, auch baumartig, B. 5—7 zählig, Blättchen eiförmig, oberseits frischgrün, unterseits stumpf graugrün, Bl. weisslich, in bis 12 cm langen, hängenden Trauben, Fr. nur 3 cm lang. Mitteleuropa, Kleinasien, Kaukasus, bis 6 m, V.	—.60	5.—	45.—
pyramidalis *Chen.* (St. colchica Coulombieri pyramidalis *Zbl.*) . . . . . . Form von aufrechtem Wuchs. Die Zweige sind der ganzen Länge nach mit Bl. von rahmweisser Farbe in dichten, pyramidalen Trauben besetzt.	2.—	—	—
Stephanandra — Kranzspiere — Rosaceae. △			
incisa *Zbl.* (St. flexuosa *Sieb. & Zucc.*) . . . . Strauch mit sehr feinen Trieben, zierlich überhängend, B. mehrmals tief gelappt, 4×3,5 cm gross, tiefgrün, Herbstfärbung braunrot, Bl. weiss, in 5—12 blütigen, einseitigen Trauben. Japan, bis 1,5 m, V—VI.	—.60	5.—	—
Tanakae *Franch. & Savat.* . . . . Strauch, kräftig wachsend, B. herzförmig, gelappt und gekerbt, bis 10×7 cm gross, dunkelgrün, Herbstfärbung tief rotbraun, Bl. weiss, in grösseren Trauben als bei St. incisa. Im ganzen üppiger. Japan, bis 2 m, VI.	—.70	—	—
Stranvaesia — Rosaceae.			
Davidiana *Decne.* # . . . . mit Ballen 30—50 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Strauch, immergrün, mit kräftigen » » 80—100 » » Zweigen, dichtbuschig, Triebe filzig, B. glänzend sattgrün, lanzettlich, 6—11 cm lang, Bl. weiss in hängenden Dolden, Fr. karminrot, spät reifend, lange haftend. Westchina, bis 6 m, V.	2.50	22.50	—
» **undulata** *Rehd. & Wils.* (Str. undulata *Dcne.*) △ # mit Ballen 60—80 cm breit. Form von niederliegendem Wuchs, B. stark gewellt, kleiner als die der Art, Bl. weiss, wenig auffallend, Fr. korallenrot. Westchina.	2.50	22.50	—
Stuartia — (Stewartia) — Theaceae.			
monadelpha *Sieb. & Zucc.* . . . . 50—70 cm hoch. Strauch oder Baum, laubabwerfend, B. elliptisch, frischgrün, 4—6 cm lang, Bl. 3,5 cm gross, mit zwei weisslichen Brakteen. Japan, bis 25 m, VII—VIII.	3.—	—	—
Styrax — Storaxbaum — Styracaceae.			
japonica *Sieb. & Zucc.* . . . . 125—150 cm hoch. Baum, laubabwerfend, B. bis 8 cm gross, elliptisch, Bl. langgestielt, in 3—6 blütigen, hängenden Büscheln, duftend, Fr. leicht eiförmig, langgestielt, bis 1 cm dick, sehr schön und zahlreich unter den Zweigen hängend. China, Japan, bis 7 m, V—VI.	2.50	22.50	—
» **Fargesi** *Hort.* . . . . **m. Tb.** 30—50 cm hoch. Form von üppigem Wuchs mit grossen, schneeweissen, hängenden Bl. Mittelchina.	5.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Suaeda — Kelchmelde — Chenopodiaceae.			
fruticosa *Forsk.* (Salsola fruticosa *L.*) # ☐ . . . . **m. Tb.** Salzstrauch mit aufrechten, glatten, weissrindigen Ästen und grünen Zweigen, B. fleischig, lineal, blaugraugrün, Bl. in den Blattachseln, grünlich, bis zu 3 geknäuelt. Mittelmeergebiet, bis 1 m, VI.	1.20	11.—	—
Symphoricarpus — Schneebeere — Caprifoliaceae.			
acutus *Dipp.* △ . . . . Strauch, laubabwerfend, oft niederliegend, B. lanzettlich, spitz gezähnt, oberseits hellgrün, unterseits bläulichgrün, Bl. weiss mit rötlicher Zeichnung, Fr. weiss, beerenartig, zahlreich. NW-Amerika, 1—1,5 m, VI.	—.60	5.—	—
Chenaulti *Rehd.* (S. microphyllus × orbiculatus) . . . . Strauch von regelmässigem Bau, B. glänzendgrün, kleiner als alle anderen Species, Bl. und Fr. nicht auffallend, aber wegen des dichten Wuchses und der zierlichen B., die auffallend lange haften, wertvoll. Hybride, bis 1,5 m, VI—VII.	—.70	6.—	—
Giraldi *Hesse* (S. orbiculatus Pater Giraldi) . . . . Üppige Form von kräftigem Wuchs, lockerer und höher, aber B. zierlicher, flaumig behaart, Austrieb röter, Bl. später, am einjährigen Holz, Fr. klein, rot. China.	—.60	5.—	45.—
Heyeri *Dipp.* . . . . Strauch aufrecht, überhängend, B. matt hellgrün, Bl. lebhaft rosa, Fr. mittelgross, weiss. Gartenform, 1 m, VII.	—.60	5.—	—
orbiculatus *Moench* (S. parviflorus *Desf.*), Korallenbeere ● . . . . Buschiger Strauch, B. lebhaft grün, unterseits graugrün, Bl. weiss oder blassrötlich, Fr. klein, rundlich, dunkelrot. Kanada, bis 1 m, VII—VIII.	—.60	5.—	45.—
» **variegatus** *Cow.* . . . . Form mit goldgelb gerandeten und geaderten B.	—.70	6.—	50.—
racemosus *Mchx.* Gemeine Schneebeere ● . . . . Strauch, Ausläufer treibend, vorzügliches Unterholz, B. eielliptisch bis rundlich, auch gelappt, oberseits dunkelgrün bis bläulichgrün, Bl. glockig, rötlichweiss, Fr. gross, weiss, rundlich, bis nach dem Laubfall haftend. ON-Amerika, bis 2 m, VI—IX.	—.60	5.—	45.—
» **laevigatus** *Fern.* . . . . Form mit überaus reichem Ansatz der weissen Fr., B. sehr lange grün bleibend, daher Wirkung der schwer überhängenden, dicht besetzten Fruchtstände erhöht.	—.80	7.—	60.—
» **pauciflorus** *Robb.* ● △ . . . . Form von niedrigerem Wuchs, B. bläulich graugrün, klein, Bl. fast sitzend, glockig, lebhaft rötlichweiss.	—.60	5.—	—
Symplocos — Rechenblume — Symplocaceae.			
crataegoides *Hamilt.* (S. paniculata *Wall.*) Saphirbeere . . . . Strauch oder baumartig, laubabwerfend, Zweige graubraun, B. oberseits frischgrün, runzlig, unterseits heller, bis 6 cm lang und 3 cm breit, stark gesägt, Bl. weiss in lockeren Blütenständen, duftend, den ganzen Strauch locker wie mit weissen Sternchen bedeckend, Fr. lebhaft saphirblau, walzig, langgestielt. Himalaja, China, Japan, bis 12 m, V—VI.	1.—	9.—	—
Syringa — Flieder — Oleaceae.			
Adamiana *Balf. & W. W. Sm.* Ø . . . . Strauch, der S. villosa nahestehend, wird neuerdings zu S. tomentella gezogen. Hat sich hier durch schöne Herbstfärbung und das grosse, spitz herzförmige B. vor genannter Art ausgezeichnet.	1.20	—	—
amurensis *Rupr.* (Ligustrina amurensis *Reg.*) . . . . Feinzweigiger Strauch, schlank aufrechtwachsend, B. breit eiförmig bis langoval, oberseits glänzend frischgrün, unterseits bläulich, Spitze lang ausgezogen, Bl. milchweiss, in grossen Blütensträussen, reichverzweigt und locker gebaut. Nordchina, bis 4 m, VI—VII.	1.20	11.—	—
Emodi *Wall.* . . . . Strauch von dichtem Wuchs, B. gross, elliptisch, lederartig, oberseits glänzenddunkelgrün, unterseits weisslichgrün, 8—15 cm lang, Bl. lilaweiss. Himalaja, bis 3 m, VI.	1.20	11.—	—
» **aureo-variegata** *Lav.* . . . . Form mit schön goldbunten B., die im Austrieb fast goldgelb erscheinen.	1.50	—	—
Giraldii *Lem.* (S. oblata Giraldii *Rehd.*) . . . . mit Ballen Sehr frühblühende Art mit tiefgrauen Zweigen, B. herzförmig, mittelgross, dünn, sattgrün, Bl. in Dolden, lilaweiss, sehr frosthart. Nordchina, 3 m, IV.	2.—	—	—
japonica *Dcsne.* (Ligustrina amurensis japonica *Maxim.*) . . . . . . Strauch oder baumartig, B. breit eiförmig, bis 14 cm lang, lebhaft grün, unterseits blaugrau, Bl. gelblichweiss, an Liguster erinnernd, in 30 cm langen, breiten Rispen. Spätblühend. Japan, bis 10 m, VII.	1.—	9.—	—

Syringa (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Josikaea *Jacq.* Ungarischer Flieder Strauch, dichtbuschig, B. gross, glänzend dunkelgrün, Bl. dunkelviolett, in dichten, aufrechten Rispen. Ungarn, 3—4 m, V—VI.	1.20	11.—	—
» **eximia** *Froeb.* Form mit schöner Belaubung und grossen Blütenständen, bis 25 cm lang, bei 15 cm Breite, satt blaulila, eigenartig duftend, spätblühend. VI.	1.50	13.50	—
» **H. Zabel** *Froeb.* Form mit sehr grossen Blütenrispen, Bl. lilarot, Knospen hellrot, sehr reichblühend.	1.50	—	—
Julianae *C. Schn.* **m. Tb.** Strauch, breitbuschig, mit behaarten Zweigen, B. spitzelliptisch, bis 6 cm gross, unterseits meist dicht grau behaart, Bl. lilaweinrot, duftend, in bis 10 cm grossen Blütenständen. Mittelchina, bis 6 m, V—VI.	3.50	—	—
Meyeri *C. S.* **m. Tb.** Strauch von dichtem Wuchs, Zweige zierlich, fast kahl, B. eielliptisch, 2—4 cm gross, Bl. tief lilapurpurn, schlankröhrig, in dichten, bis 8 cm grossen Blütenständen. Nordchina, bis 1 m, V—VI.	1.50	—	—
microphylla *Diels* (S. Dielsiana *C. S.*) **m. Tb.** Strauch von lockerem Wuchs, Zweige meist behaart, B. breit elliptisch-eiförmig, 1—4 cm gross, Bl. hellila, in bis 7 cm grossen Blütenständen. NO-China, bis 1 m, VI und VIII.	1.50	—	—
Palibiniana *Nakai* Strauch mit aufrechten, dünnen Zweigen, anfangs purpurn, später hellbraun, B. breitelliptisch, 3—7 cm lang, dunkelgrün, Bl. hellila, im Verblühen fast weiss, langröhrig, wohlriechend, in lockeren Blütenständen, reichlich doppelt so lang als die von S. microphylla. Korea, bis 3 m, VI.	1.50	—	—
pekinensis *Rupr.* (Ligustrina pekinensis *Rgl.*) Peking-Flieder Baumartiger Strauch, Zweige leicht überhängend, B. schmallanzettlich, spitz, bis 12 cm lang bei 5—6 cm Breite, Bl. weiss, klein, in lockeren bis 15 cm langen Blütenständen. Nordchina, bis 5 m, VI.	1.20	11.—	—
persica semiplena *Hort.* **m. Tb.** Hübsche Form des persischen Flieders, Bl. hellila, locker gefüllt. V.	1.50	13.50	—
pinnatifolia *Hemsl.* **m. Tb.** Strauch mit straff aufwärtsgerichteten Zweigen, B. gefiedert, bis 8 cm lang, Fiederchen 9—11, tiefgrün, unterseits heller, dünn, Rand gewimpert, Bl. mit etwa 12 mm langer Röhre, weisslichrosa, in ziemlich lockeren Blütenständen. Wegen des Fiederlaubes interessanter Flieder. Westchina, bis 3 m, V.	1.50	—	—
Potanini *C. Schn.* **m. Tb.** Strauch, von breit aufrechtem Wuchs, B. oberseits sattgrün, unterseits grau, etwas silbrig, weich behaart, bis 6 cm lang und 3 cm breit, Bl. hell-lilarosa in lockeren, bis 9 cm grossen Blütenständen. Nordchina, bis 4 m, V.	1.50	—	—
reflexa *Schneid.* Strauch, von dichtem, breitrundem Aufbau, B. länglich, bis 15 cm lang und 6 cm breit, oberseits sattgrün, unterseits hellgraugrün, Bl. hellrosa mit weisslichem Saum, Knospen karminrot, langröhrig, in grossen, bis 20 cm langen, überhängenden, dichten, schmalen Rispen. China, bis 4 m, VI.	1.—	9.—	80.—
Rothomagensis *de Launey* (S. chinensis *Willd.*. S. persica × vulgaris) Strauch von lockerem Aufbau, B. ovallänglich, bis 8 cm lang, Bl. hellviolett, in grossen, breiten, lockeren Rispen. Hybride, bis 4 m, V.	1.20	11.—	—
Sargentiana *C. Schn.* (S. Komarowii Sargentiana *C. Schn.*) Strauch mit kräftigen, anfangs behaarten Trieben, B. länglichelliptisch, oberseits lebhaft grün, unterseits graugrün, wollig behaart, Bl. purpurrot, in hängenden, dicht walzenförmigen Blütenständen. Westchina, bis 4 m, VI.	1.50	—	—
swegiflexa *Hesse* (S. reflexa × Sweginzowii). **Neuheit 1935.** Prächtig volle Rispe von schön langgestreckten Einzelblüten. Dunkelweinrote Knospen beim Aufblühen in Zartrosa übergehend. *Siehe Bildtafel!*	4.—	36.—	—
Sweginzowii *Koehne & Lingelsh.* Strauch von aufrechtem, schlankem Wuchs, gut verzweigt, junges Holz bräunlichrot, B. oval mit verschmälertem Stielende und ausgezogener Spitze, Bl. in grossen, lockeren Rispen mit dunkelroter Spindel, weiss, langröhrig mit karminrotem Schlund, duftend. Nordchina, bis 3 m, VI.	1.50	—	—
» **superba** *Lem.* Form mit noch grösseren Blütenrispen, Bl. aussen zart fleischfarben getönt.	1.50	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Syringa (Fortsetzung):			
tomentella *Bur. & Franch.* (S. Wilsoni *Schneid.*) . . . . Strauch, schlankzweigig, B. länglichlanzettlich, bis 10 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, bis graugrün, Bl. lilarosa, in bis 15 cm langen, aufrechten, verzweigten Rispen. Westchina, bis 4 m, VI.	—.80	7.—	60.—
velutina *Komar.* (S. Koehneana *Schneid.*) . . . . mit Ballen Strauch, aufrecht verzweigt, junge Triebe fein behaart, hellgrau, kantig, B. gross, spitzeiförmig, oberseits stumpfgrün, fein locker behaart, unterseits grausilberig, feinfilzig. Sehr früh austreibend, Bl. lila. Korea, bis 3 m, V.	1.50	—	—
villosa Lutèce *Hort.* (S. Josikaea × villosa) . . . . Hybride mit grossen B. und späten Bl. Blütenstände dicht, pyramidal, bis 28 cm lang, Bl. erst bläulichpurpurn, später mehr bläulichlila.	—.80	7.—	—
vulgaris Hybriden . . . . Freilandsträucher	1.50	13.50	110.—
Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe	2.50	22.50	—

in nachstehend aufgeführten, grossblumigen Sorten:

- **Andenken an L. Späth**, einfach, dunkelpurpur
- **Arthur William Paul**, gefüllt, levkojenartig
- **Charles Joly**, gefüllt, dunkelpurpur
- **Charles X**, einfach, lilarot
- **Georges Bellair**, gefüllt, weinrot, Knospen purpurrot, breit
- **Hippolyte Maringer**, gefüllt, purpurmalvenfarbig
- **Hyacinthe**, einfach, leuchtend purpurlila mit hellblauer Mitte
- **Jeanne d'Arc**, gefüllt, reinweiss
- **Königin Luise**, einfach, weiss
- **Léon Simon**, gefüllt, bläulich
- **Mad. Abel Chatenay**, gefüllt, milchweiss
- **Mad. Casimir Perrier**, gefüllt, rahmweiss
- **Mad. Lemoine**, gefüllt, reinweiss
- **Marie Legraye**, einf., reinweiss
- **Michel Buchner**, gefüllt, blasslila
- **Pasteur**, einfach, weinrot bis dunkelrot
- **Paul Hariot**, gefüllt, maulbeerrot mit Violett, Rückseite silbrig
- **Président Grevy**, gefüllt, blau, in Kobalt übergehend, mit Rosa
- **Président Loubet**, gefüllt, rötlichviolett, dunkelste
- **Professor Sargent**, einfach, rötlichlila, Knospen kirschrot
- **Réné Jarry Desloges**, gefüllt, hellviolettblau
- **Ruhm von Horstenstein**, einfach, rotlila, gross, früh
- **Sinai**, einfach, lila
- **Viviand-Morel**, gefüllt, hellbläulichlila

Wilsoni, siehe S. tomentella.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Wolfii *C. Schneid.* (S. formosissima *Nakai*) . . . . Strauch mit stark aufrechten Trieben, B. elliptisch, 12 × 6 cm gross, oberseits lichtgrün, runzlig, unterseits weisslichgrün, Nerven und Blattrand borstenhaarig, Bl. hellila, duftend, Blütenstände lockerrispig, bis 30 × 16 cm gross, sehr reichblühend. Nordchina, bis 6 m, VI.	1.—	9.—	—
Tamarix — Tamariske, Uferheide — Tamaricaceae.			
caspica *Hort.* . . . . Strauch mit zierlicher, hellgraugrüner Bezweigung, Blütenähren lebhaft rosafarben, dichtgestellt entlang der vorjährigen Triebe. Orient, bis 5 m, V.	—.80	—	—
germanica *L.* (Myricaria germanica *Desv.*), Gemeiner Rispelstrauch . Strauch von aufrechtem Wuchs, B. blaugrün, Bl. blassrosa. Mittel- und Südeuropa, Orient, bis 2 m, V—VI.	—.80	7.—	—
odessana *Stev.* ◑ . . . . Strauch, dichtzweigig, gut wachsend, B. blaugrün, Bl. zartrosa, in sehr grossen, zierlich hängenden Blütenständen, sehr reichblühend. Südrussland, bis 2 m, ab Mitte VI bis Herbst.	—.80	7.—	—
tetrandra *Pall.* (T. africana *Hort.*) ◑ . . . . Strauch, raschwüchsig, schön rutig überhängend, B. schuppenförmig, lebhaftgrün, Bl. hellrosa. SO-Europa, Orient, bis 5 m, V.	—.80	7.—	—
» **parviflora** *Boiss.* (T. parviflora *DC*, T. tetrandra purpurea *Hort.*) . . Form mit weisslichrosa, walzigen Blütenähren, Einzelblütchen klein.	—.80	7.—	—
Tecoma, siehe unter „Schlingpflanzen“.			
Tetracentron — Viersporn — Magnoliaceae.			
sinense *Oliv.* . . . . **m. Tb.** Strauch, in der Heimat Baum, laubabwerfend, an Cercidiphyllum erinnernd, B. breitoval, bis 12 × 7,5 cm gross, lebhaft grün, Bl. winzig, blütenblattlos, in langen Ähren. Mittelchina, bis 30 m, VI—VII.	3.—	—	—
Teucrium — Gamander — Labiatae.			
maritimum *L.* (T. Maurum *L.*), Katzen-Gamander ♄ △ ♯ **m. Tb.** 20—30 cm hoch Halbstrauch, immergrün, breitwachsend, dicht silberweissfilzig, B. klein, oval, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits weissfilzig, Bl. bläulichlila. Mittelmeergebiet, bis 50 cm, VI—VIII.	2.—	18.—	—

Tilia — Linde — Tiliaceae.		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
americana nova *Hort.* (T. megalodonta *Hort. Holst.*)	Heister 120—150 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Baum von schön pyramidalem Wuchs,	» 150—200 » »	1.50	13.50	120.—
B. sehr schön und gross, sehr lange	» 200—250 » »	2.—	18.—	150.—
haftend. Widerstandsfähig gegen Ungeziefer.				
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
	» 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
	» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
	» 14—16 » »	5.50	50.—	450.—
	» 16—18 » »	6.50	60.—	550.—
	» 18—20 » »	7.—	63.—	—
	» 20—25 » »	10.—	90.—	—
	» 25—30 » »	12.—	—	—
argentea *DC.* (T. tomentosa *Moench*)	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Echte Silberlinde.	» 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
Baum mit dichter, breitpyramidaler	» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
Krone, B. rundlich herzförmig, ober-	» 14—16 » »	5.50	50.—	450.—
seits frischgrün, unterseits silber-	» 16—18 » »	6.50	60.—	—
weissfilzig. SO-Europa, bis 30 m, VII.	» 18—20 » »	7.—	63.—	—
» **erecta** *Hort.*	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Straff aufrechtwachsende Form.	» 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
	» 12—14 » »	4.80	45.—	—
» **petiolaris** *Hort.*	200—250 cm hoch	2.50	22.50	—
Baum mit überhängenden Zweigen, B. oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Wohl Kulturform, bis 25 m, VII.				
» **spectabilis** *Hort.*	Hochstämme 14—16 cm Umfang	5.50	50.—	—
	» 16—18 » »	6.50	—	—
Schöner Alleebaum von kräftigem Wuchs mit grossen, dunkelgrünen B. und überhängenden Zweigen.				
cordata, siehe T. parvifolia.				
dasystyla, siehe T. euchlora.				
euchlora *C. Koch* (T. dasystyla *Kirchn.* nicht *Stev.*) Krimlinde				
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Herrlicher Alleebaum mit rundlicher	» 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
Krone, T. cordata × dasystyla *Stev.*, B.	» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
glänzend dunkelgrün, bis tief in den	» 14—16 » »	5.50	50.—	450.—
Herbst hinein haftend, Bl. spät. Bis 20 m, VII—VIII				
grandifolia *Ehrh.* (T. platyphyllos *Scop.*) Sommerlinde				
Baum mit breit eiförmiger Krone, B.	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
im Austrieb hell- bis gelblichgrün,	» 10—12 » »	3.—	27.50	250.—
Holz und B. schwach seidenhaarig,	» 12—14 » »	3.60	33.—	300.—
oberseits stumpfgrün, unterseits hell-	» 14—16 » »	4.—	35.—	325.—
grün, rundlich herzeiförmig, plötzlich	» 16—18 » »	4.50	40.—	—
kurz zugespitzt. Für feuchte Lagen.	» 18—20 » »	5.50	50.—	—
Südeuropa, bis 45 m, VI.				
» **aurea** *Kirchn.* (T. Handsworthi aurea)	Pyramiden 120—150 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Goldlinde.	» 250—300 » »	2.—	18.—	—
Schön goldzweigige Form von kräftig	Hochstämme 12—14 cm Umfang	4.80	—	—
aufrechtem Wuchs, B. 5 cm gestielt,	» 14—16 » »	5.50	50.—	—
bis 15×15 cm gross, mit stark rundlichen Kerbungen, diesjähriges Holz den Winter über ebenfalls schön gelb.				
» **corallina** *C. Koch* (T. Handsworthi rubra)	150—200 cm hoch	1.50	13.50	—
Junge Zweige schön gerötet.	200—250 » »	2.—	18.—	—
» **pyramidalis obliqua** *Hort.*	200—250 » »	2.—	18.—	150.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	—
Junges Holz meist hellgrün, ziem-	» 10—12 » »	4.—	—	—
lich stark grauweiss wollhaarig, B.	» 16—18 » »	6.50	60.—	—
hellgrün, beiderseits hell wollhaarig.	» 18—20 » »	7.—	63.—	—
heterophylla *Vent.* Nordamerikanische Silberlinde	200—250 cm hoch	2.50	—	—
Baum von kräftigem Wuchs mit pyramidaler Krone und rötlichen oder gelbbraunen Trieben, B. sehr gross, ungleichseitig eirund, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulichgraugrün, bis 13 cm lang. Pennsylvanien, Illinois, bis 15 m, VII.				
hybrida superba *Hort.*	150—200 cm hoch	2.—	—	—
Grossblättrige und dunkelbelaubte Linde.				
intermedia *De Cand.* (T. hollandica *Hort.*)	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.40	250.—
Zwischenlinde	» 10—12 » »	4.—	36.—	325.—
Echte holländische Linde von lebhaftem	» 12—14 » »	4.80	45.—	400.—
Wuchs und schöner Belaubung, bildet	» 14—16 » »	5.50	50.—	450.—
regelmässige Kronen, breit pyramiden-	» 16—18 » »	6.—	54.—	—
förmig, wohl Naturhybride zwischen T.	» 18—20 » »	7.—	63.—	—
cordata × platyphylla, B. schief herz-	» 20—25 » »	10.—	—	—
förmig, oberseits tief stumpfgrün. Bis 40 m, VI—VII.	» 25—30 » »	12.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Tilia (Fortsetzung):			
macrophylla *Hort.* (T. stellata *Th. Hartig*) . . . . 200—250 cm hoch	2.50	—	—
Hybride von kräftigem Wuchs, T. americana × heterophylla, Zweige silbrig-aschgrau, B. sehr gross, oberseits dunkelgrün, unterseits graugrün.			
megalodonta, siehe T. americana nova			
Oliveri *Szyss.* (T. pendula *Engl.*) . . . . 200—250 cm hoch	2.50	22.50	—
Baum im Wuchs an T. argentea erinnernd, mit kahlen, glänzend rotbraunen Trieben, B. eiherzförmig, oberseits glatt, unterseits weissfilzig, Bl. in bis 20blütigen, hängenden Blütenständen. China, bis 15 m, VI.			
parvifolia *Ehrh.* (T. **ulmifolia** *Scop.*, T. cordata *Mill.*) ● ⚘			
Steinlinde, Winterlinde für Lauben 120—150 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
» 12—14 » »	4.80	45.—	—
» 14—16 » »	5.50	50.—	—
» 16—18 » »	6.50	60.—	—
Kastenform, Hochstämme 14—16 cm Umfang, 180—200 cm Stammhöhe	7.50	70.—	—
» » 16—18 » » 180—200 » »	8.50	80.—	—
Baum mit breit ausladender Krone, alte Dorflinde, B. rundlich herzförmig bis kreisrund, bis 6 cm lang, oberseits glänzend sattgrün, unterseits blaugrün. Europa, bis 30 m, VII.			
platyphyllos, siehe T. grandifolia.			
pubescens *Ait.* . . . . 150—200 cm hoch	2.—	—	—
Schöne Art, B. sehr gross, bis 17 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits weissfilzig, mit rotem Austrieb. Amerika, bis 14 m, VII.			
tomentosa, siehe T. argentea.			
ulmifolia, siehe T. parvifolia.			
Tricuspidaria, siehe Crinodendron.			
Ulex — Stechginster, Hecksame — **Leguminosae.** #			
europaeus *L.* ♀ △ ☐ ⋀ . . . . **m. Tb.** 50—70 cm hoch	1.20	11.—	100.—
Strauch stark dornig, sparrig bezweigt, B. in stechende Scheintriebe verwandelt, Bl. achselständig, gelb. SW-Europa, bis 1 m, IV—VI, oft auch IX.			
» **biferus** *Taslé* △ . . . . **m. Tb.** 40—60 cm hoch	1.20	11.—	—
Form mit dunklerem Austrieb, später dunkelgraugrün, sonst in allen Teilen gröber als die Art.			
Ulmus — Ulme, Rüster — **Ulmaceae.** ♀			
alba *W. & K.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Baum, ähnlich der Feldulme, von besonders gesundem Wuchs.			
americana *L.* Weissrüster ≌ . . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	—	—
» 10—12 » »	2.50	22.50	—
Baum mit rissiger Rinde, Krone locker, breit ausladend, B. eilänglich, oberseits freudiggrün, rauh, unterseits hellgraugrün, doppelt gesägt. Nordamerika, bis 30 m.			
Androssowii . . . . 70—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Baum von dicht straff pyramidalem Wuchs, kleinblättrig. Mittelasien.			
campestris *L.* **Feldulme** . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	13.50	—
» 10—12 » »	2.—	18.—	—
Sehr bekannte und geschätzte Art von starkem, dichtem Wuchs. Zu Hecken und Windschutzpflanzungen wertvoll. Europa, Asien, bis 30 m.			
» **betulifolia** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Birkenblättrige Form der Feldulme.			
» **cornubiense** *Hort.* (U. camp. stricta *Rehd.*) . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Steif schmal pyramidale Form der Feldulme aus SW-England.			
» **Escaillardii** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Sehr schön grossblättrige Form der Feldulme.			
» **glabra fastigiata** *Arb. Musk.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Form mit grösserem Blatt, Wuchs dicht pyramidal.			
» **Koopmannii** *Lauche.* . . . . 60—80 cm hoch	1.—	—	—
Kleinblättrige Form der Feldulme, von U. camp. umbraculifera abweichend durch mehr langovale Kronenbildung, B. mehr eiförmig, Zweige heller.			
» **Louis van Houtte** *Deegen* Goldulme ⊥ . . . . . 80—100 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.50	—
Raschwüchsige Form der Feldulme, B. goldbronzen, oft mit grüner Blattmitte, sehr sonnenbeständig.			

Ulmus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
campestris myrtifolia purpurea *Hort.* . . . . 60—80 cm hoch	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	—	—
Form der Feldulme mit feinen Ästen, B. klein, purpurrot.			
» **purpurea** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	3.—	27.50	—
Form der Feldulme, B. beim Austrieb dunkelpurpurfarbig, später dunkelbraun.			
» **Rueppelii** *Hort.* . . . . 80—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Form der Feldulme, ähnlich U. camp. umbraculifera, Triebe etwas behaart, später leicht korkig, B. ziemlich klein, etwas rauh.			
» **sarniensis** *Loud.* (U. Wheatleyi *Hort.*), Yersey-Rüster, 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	3.—	27.50	250.—
Form der Feldulme, B. rundoval, glänzend dunkelgrün.			
» **suberosa tortuosa** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Form der Feldulme mit gedrehten, stark korkigen Ästen.			
» **umbraculifera** *Hort.* (U. densa *Litvin.*), Kugelrüster 80—100 cm hoch	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.50	—
Form der Feldulme, bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen, wie die einer Kugelakazie, B. klein, lichtgrün, dichtzweigig.			
» » **gracilis** *Hort.*, Höhe bis zur Krone 200—220 cm 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	4.50	—	—
Sehr zierende Kugelform der Feldulme mit kleinen, feinen B., die sehr lange haften.			
» **urticifolia** *Hort.* Nessel-Ulme . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Form der Feldulme mit nesselblättriger Belaubung.			
» **Webbiana** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Form der Feldulme mit etwas gerollten B., bildet breite, dichte, kugelige Kronen.			
corylifolia purpurea *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
Baum von starkem Wuchs, sehr schön dunkelrot belaubt.			
densa, siehe U. campestris umbraculifera.			
exoniensis, siehe U. montana fastigiata.			
latifolia *Hort.* (U. hollandica *Hort.*) . . Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	200.—
Bekannter, schöner Alleebaum, mit kerzengeradem Stamm, glatter Rinde und grosser, breiter Krone. B. dunkelgrün, lange am Baume haftend.			
» **Dumont** *Hort.* (U. hollandica Dumontii *Rehd.*)			
Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» 10—12 » »	2.50	22.50	200.—
Form der holländischen Ulme, sogenannte belgische Ulme, mit sehr schön pyramidaler Krone.			
montana atropurpurea *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	—	—
Form der Bergulme mit tiefschwarzem Austrieb, B. gross, später dunkelpurpurfarben.			
» **aurea** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.80	16.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.50	22.50	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.50	—
Form der Bergulme mit leuchtend gelben B.			
» **Dampieri** *Hort.* . . . . 80—100 cm hoch	1.—	9.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	3.—	27.50	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.50	31.50	—
Form der Bergulme von schön schlankem, straff aufstrebendem, säulenartigem Wuchs, B. an den Zweigen anliegend, leuchtend hellgrün.			
» » **Wredei** *Hort.* Säulen-Goldulme . . . . 50—70 cm hoch	1.20	11.—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	27.50	—
Unterform mit lebhaft goldgelben B.			
» **fastigiata** *Loud.* (U. exoniensis *Hort.*) . . . . . . 120—150 cm hoch	1.—	9.—	—
Pyramiden 300—350 » »	2.50	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	3.—	27.50	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	5.—	45.—	—
Dickzweigige Form der Bergulme von pyramidalem Wuchs, B. eng anliegend, tief dunkelgrün, gekräuselt.			
» **fulva** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch	1.—	9.—	—
Form der Bergulme, B. sehr gross, zierlich doppelt gesägt.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ulmus (Fortsetzung):			
montana gigantea *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch Form der Bergulme, sehr grossblättrig, hellgrün, ungemein starkwüchsig.	1.—	—	—
» **macrophylla** *Hort.* . . . . 150—180 cm hoch Form der Bergulme, grossblättrig und starkwüchsig.	1.20	—	—
» **rugosa** *Loud.* . . . . 100—120 cm hoch Rauhe Hängeulme.	1.—	—	—
» **scamptoniensis** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch Form von hohem, kräftigem Wuchs.	1.—	—	—
» **superba** *Hort.* (U. praestans *Schoch.*) . . . . 100—120 cm hoch Sehr empfehlenswerter Strassenbaum von kräftigem, aufstrebendem Wuchs, B. gross, bis spät in den Herbst hinein haftend.	1.—	9.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» 10—12 » »	2.50	22.50	—
» **tomentosa** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch Form der Bergulme mit filzigen B.	1.—	—	—
» **tricolor** *Hort.* . . . . 100—120 cm hoch Buntblättrige Form der Bergulme.	1.—	—	—
pinnato-ramosa *Koehne* . . . . 100—150 cm hoch Baum von sehr zierlichem Aussehen, Bezweigung schön fächerförmig geordnet und mit sehr kleinen B. besetzt.	1.—	9.—	—
pumila *L.* Ø . . . . 80—120 cm hoch Strauch oder Baum, raschwüchsig, mit zierlich überhängenden Zweigen, B. sattgrün, fest, oberseits glatt, unterseits etwas behaart. Herbstfärbung schön, Holz wertvoll, Laub als Viehfutter verwertbar. Mandschurei, Nordchina, 5—16 m. Widerstandsfähig gegen die Ulmenkrankheit.	1.—	9.—	—
turkestanica *Reg.* (U. pumila arborea *Litvin.*) . . . . . 60—80 cm hoch Baumartige, turkestanische Standortsform der U. pumila, B. stumpfgrün.	1.—	—	—
vegeta *Ldl.* (U. hollandica vegeta *Rehd.*) Huntingdon-Rüster 100—120 cm hoch Baum mit schön pyramidaler Krone, B. gross, starkwüchsig. Vorzüglicher Strassenbaum.	1.—	—	—
Hochstämme 12—14 cm Umfang	3.—	—	—
Vaccinium — Heidelbeere — Ericaceae.			
bracteatum *Thbg.* # . . . . mit Ballen Strauch, immergrün, B. dünnlederig, bis 6×3 cm gross, Bl. rötlich in Trauben, Fr. rot. China, Japan, bis 1 m, VI.	1.50	—	—
corymbosum *L.* ◑ ● ♣ Ø + ... 30—40 cm hoch Strauch, laubabwerfend, Zweige gelbgrün, B. hellgrün, 3—8 cm gross, Herbstfärbung prachtvoll feurigrot, Bl. weiss bis rosa, gebüschelt, Fr. blauschwarz. Amerika, bis 4 m, V.	1.50	—	—
hirsutum *Buckl.* △ . . . . 20—30 cm hoch Strauch, laubabwerfend, mit meist waagerecht getragenen, behaarten Zweigen, B. länglich, hellgrün, bis 6 cm gross, Bl. hängend, grünlichweiss, röhrig, Fr. schwarz, borstig. Nordkarolina, 50—100, VI—VII.	1.50	—	—
macrocarpum, siehe Oxycoccus macrocarpus.			
Myrtillus *L.* Heidelbeere ◑ △ ♣ + ... mit Ballen Strauch, laubabwerfend, B. klein, hellgrün, Bl. weiss, Fr. blau bereift. Europa, 30—50, V.	1.—	—	—
Vitis Idaea *L.* Gemeine Preiselbeere ◑ △ # + ... mit Ballen Strauch, immergrün, B. klein, dunkelgrün, bis 2 cm gross, stumpfoval, Bl. weiss bis rosa, Fr. rötlich-fleischfarben. Europa, Asien, 10—20, V.	—.80	7.—	—
Vaniera, siehe Cudrania.			
Vella — Stachelkresse — Cruciferae.			
Pseudocytisus *L.* (Pseudocytisus integrifolius *Rehd.*) ∞ △ [K] ∧ gegen Nässe . . . . **m. Tb.** Strauch, laubabwerfend, dornenlos, B. bis 2×0,8 cm gross, dunkelgraugrün, verkehrt eilanzettlich, Blattrand borstig bewimpert, Bl. leuchtend gelb in vielblütigen, endständigen Blütenständen. Spanien, 30—60, VI—VII	2.—	—	—
Veronica, Arten und Formen siehe unter „Stauden".			
Viburnum — Schneeball — Caprifoliaceae.			
alnifolium *Marsh.* (V. lantanoides *Mchx.*) ♣ Ø . . . . Strauch, sparrig ausgebreitet, B. breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblich graugrün, Herbstfärbung weinrot, Bl. in flacher Dolde mit breiten, weissen Randblüten, Fr. glänzend dunkelrot bis schwarzpurpurn. Amerika, 2—3 m, V—VI.	1.50	—	—

Viburnum (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Carlesi *Hemsl.* ⚘ △ ✿ . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	2.50	22.50	—
Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	4.—	—	—
Strauch von langsamem Wuchs, alle Teile filzig, B. graugrün, oval, gezähnt, Bl. weiss in bis 10 cm breiter Dolde, wohlriechend, Fr. schwarz. Korea, bis 1,5 m, IV—V.			
cassinoides *L.* ⚘	1.50	13.50	—
Strauch oder baumartig, B. dicklich, eilänglich, bis 9 cm lang, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün, Bl. weiss in Dolden bis 12 cm breit, Fr. anfangs weiss und rosa, zuletzt schwarz. Amerika, bis 1,5 m, VI—VII.			
cinnamomifolium *Rehd.* ⌗ . . . . mit Ballen	1.50	—	—
Baumartiger Strauch, B. lederartig, immergrün, länglich-elliptisch, lang zugespitzt, etwa 10×4 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits heller, Bl. grünlichweiss in 12—17 cm breiten Dolden, Fr. bläulichschwarz. Westchina, bis 6 m, VI.			
cotinifolium *D. Don.* ∧	1.20	—	—
Strauch von breitem Wuchs, B. gross, an V. Lantana erinnernd, Bl. weiss, leicht rosa getönt, in leicht gewölbten Blütenständen, Fr. anfangs rot, zuletzt schwarz. Nepal, bis über 3 m, V.			
foetidum rectangulum *Rehd.* ⌗ . . . . . . mit Ballen 20—30 cm hoch	1.50	—	—
Strauch mit langen Zweigen, B. elliptisch bis länglich, 4—6 cm lang, fast kahl, mit wenigen, groben Zähnen an der Spitze, Bl. weisslich in 4—5 cm breiten Blütenstauden, Fr. rot. Yunnan, bis 4 m.			
fragrans *Bge.*	1.50	13.50	—
Strauch, laubabwerfend, B. länglichoval, 4—7 cm gross, scharf gezähnt, Bl. rosa und weiss, röhrig, vor den B., duftend. Nordchina, bis 3 m, III—IV.			
Henryi *Hemsl.* ⌗ . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm	3.—	—	—
Strauch, immergrün, B. lanzettförmig, glänzendgrün, 7,5—12,5 cm lang und 2,5—3,5 cm breit, gesägt, Mittelrippe auffallend gelb, Bl. weiss, rispenartig, Fr. korallenrot, zuletzt schwarz. Mittelchina, bis 5 m, V.			
hupehense *Rehd.*	1.50	—	—
Strauch, laubabwerfend, mit dunkelpurpurnen Zweigen, B. kreisförmig oval, 7×6 cm gross, Bl. weiss in endständigen Dolden von 4—5 cm Durchmesser, Fr. dunkelrot. Mittelchina, bis 2 m, VI.			
Lantana *L.* ● ⚘ ☘	—.60	5.—	45.—
Strauch, laubabwerfend, dichtbuschig, B. gross, graugrün, runzlig, oval, Bl. weiss in grossen Dolden, Fr. korallenrot, später schwarzviolett. Europa, Westasien, bis 3 m, V—VI.			
» **rugosum** *Rehd.*	1.20	—	—
Form mit grossen, runzligen B. und grösseren Blütenständen als die Art.			
Lentago *L.* ◑ ⊘	1.20	11.—	—
Strauch oder baumartig, laubabwerfend, B. glänzend gelbgrün, oval mit langer Spitze, Bl. rahmweiss in bis 12 cm grossen, etwas gewölbten Dolden, Fr. blauschwarz. Amerika, bis 10 m, V—VI.			
lobophyllum *Gräbn.*	1.50	—	—
Strauch, laubabwerfend, aufrechtwachsend, B. breit eiförmig, gelblichgrün, 11×8 cm gross, Bl. in endständigen, 5—10 cm breiten Dolden, Fr. hellrot. Westchina, bis 5 m, VI—VII.			
macrocephalum sterile *Dipp.* ✿ . . . . mit Ballen	2.—	18.—	—
Strauch, breitwachsend, laubabwerfend, B. oval, bis 10 cm lang, lange haftend, Bl. gelblichweiss in sehr grossen, oft über 15 cm Durchmesser haltenden Blütendolden, leicht duftend. Japan, bis 4 m, V.			
molle *Mich.* **echt!** . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
Strauch, laubabwerfend, mit abblätternder Rinde an älteren Zweigen, B. breit herzförmig, unterseits weich behaart, bis 13 cm lang, 5 cm gestielt, Bl. crêmeweiss in bis 10 cm breiten Blütenständen, Fr. blauschwarz. Amerika, bis 4 m, V—VI.			
nudum *L.* ⊘	1.50	—	—
Strauch, laubabwerfend, kräftig wachsend, B. glänzend, an Kirschlorbeer erinnernd, Herbstfärbung prachtvoll purpurbraun, Bl. weiss in Dolden von etwa 6—8 cm Durchmesser, Fr. blauschwarz. Amerika, bis 4 m, VII.			
obovatum *Walt.* ≌ . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Strauch oder kleiner Baum, laubabwerfend, scharf riechend, mit aufstrebender Verästelung und dunkler, rauher Borke, B. 1,5—6 cm lang, oberseits glänzend sattgrün, unterseits heller, Bl. weiss in bis 6 cm breiten Dolden, Fr. glänzendschwarz. Virginia bis Florida, 2—8 m, IV—V.			
Opulus *L.* **Gemeiner Schneeball** ◑ ☘	—.60	5.—	45.—
Strauch, laubabwerfend, starkwachsend, B. bis 12×10 cm gross, drei- bis fünflappig, hellgrün, unterseits graugrün, Bl. gelblichweiss in Dolden, Fr. korallenrot. Europa, Nordafrika, Nordasien, bis 4 m, V—VI.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Viburnum (Fortsetzung):			
Opulus edule *Hort.* ♣ + ... Form des gemeinen Schneeball mit essbaren Fr., Beeren länglich, 10×8 mm gross, scharlachrot, Ende VIII reifend.	—.80	7.—	—
» **nanum** *Jacqu.* △ . . . . Form des gemeinen Schneeball von niedrigem Wuchs, nur bis 30 cm hoch werdend.	1.50	13.50	—
» **sterile** *D. C.* (V. Opulus roseum *L.*). . . . . Sträucher	—.70	6.—	55.—
Kronenbäumchen 60—80 cm bis zur Krone	—.80	7.—	—
» 80—100 » » » »	1.—	9.—	—
» 100—120 » » » »	1.20	10.—	—
» 120—140 » » » »	1.50	13.50	—
» 140—160 » » » » Allgemein bekannter Schneeball mit weissen, bisweilen leicht rosa getönten, kugelig ballartigen Blütendolden. Gartenform, bis 4 m, V—VI.	1.75	15.—	—
orientale *Pall.* . . . . Strauch von üppigem Wuchs, laubabwerfend, B. dunkelgrün, spitz gelappt, bis 14 cm gross, Bl. in gewölbten Blütenständen zierlich gelblichweiss, Fr. rot bis purpurschwarz. Kaukasus, bis 1 m, V—VI.	—.80	—	—
phlebotrichum *Sieb. & Zucc.* . . . . **m. Tb.** Strauch von aufrechtem Wuchs, laubabwerfend, B. sattgrün, 6×3 cm gross, Bl. rötlich angehaucht in nickenden, 2—4 cm Durchmesser haltenden Blütenständen, Fr. rot. Japan, bis 2 m, V—VI.	1.50	—	—
rhytidophyllum *Hemsl.* ♯ ♣ . . . . . . mit Ballen 40—60 cm hoch	1.50	13.50	—
Strauch, dicht kräftigwachsend, immergrün, » » 80—120 » » B. breitlanzettförmig, bis 30×6 cm gross, oberseits leuchtend dunkelgrün, runzlig, unterseits weisslich bis bräunlichfilzig, Bl. im Herbst in zierenden Knospenständen vorgebildet, gelblichweiss, Fr. rotbraun bis schwarzglänzend. Westchina, bis 4 m, V.	2.50	22.50	—
Sargenti *Koehne* . . . . Strauch, straff aber dicht aufrechtwachsend, B. gross, meist dreilappig, Austrieb dunkelbraunrot, später frischgrün, Rinde grau, an älteren Zweigen korkig, Bl. rahmweis, Fr. rundlich, hellrot. NO-Asien, 2—3 m, V—VI.	1.50	—	—
theiferum *Rehd.* . . . . mit Ballen Strauch von aufrechtem Wuchs mit hellgraubraunen Zweigen, laubabwerfend, B. bis 12×6 cm gross, dunkelgrün und glatt, unterseits heller, Bl. ohne sterile Randblüten, weiss, Fr. rot. Westchina, bis 4 m, V—VI.	1.50	—	—
Tinus *L.* ♯ . . . . **m. Tb.** Strauch, immergrün, buschig, B. lederig, ganzrandig, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller, Bl. rötlichweiss, duftend, Fr. fast kugelig, schwarzblau. Südeuropa, bis 3 m, V—VII.	2.—	—	—
tomentosum *Thbg.* (V. plicatum *Miqu.*) ◑ . . . . Strauch von üppigem Wuchs, laubabwerfend, B. eiförmig, unterseits filzig, Adern stark hervortretend, grosse Scheindolden mit wenigen, grossen Randblüten, Fr. korallenrot, vollreif blauschwarz. Japan, China, bis 3 m, V—VI.	—.80	7.—	60.—
» **Mariesi** *Veitch.*, echt, ... Form von ausgebreitetem Wuchs, B. schön hellgrün, Bl. reinweiss, in zahlreichen Dolden auf den tafelförmig gestellten Zweigen.	2.50	—	—
» **sterile** *Zbl.*, prächtiger Schneeball . . . . Form v. gross. Reichblütigk., Bl. rahmweiss in kugel. Blütenbällen.	1.20	11.—	—
» » **grandiflorum** *Hort.* . . . . Form mit schönen, leuchtend gelblichgrünen B., Blütenbälle auffallend gross, frühblühend.	1.50	13.50	—
utile *Hemsl.* △ ♯ . . . . mit Ballen	2.50	22.50	—
Strauch von lockerem Wuchs, immergrün, Zweige jung graufilzig, B. lederartig, — Höhe bis zur Krone 80—100 cm	3.—	—	—
» » » » 100—120 » oberseits lackglänzend dunkelgrün, unterseits weissfilzig, Bl. weiss in gipfelständigen Dolden, Fr. blauschwarz. Mittelchina, bis 1,5 m, IV.	3.50	31.50	—
venosum Canbyi *Rehd.* (Viburnum pubescens Canbyi *Blake*) . . . . . . Form des V. venosum *Britt.*, B. grösser, kreisrund, frischgrün, Bl. weiss in langgestielten Dolden ebenfalls grösser als bei der Art. Amerika, bis 4 m, VI—VII.	—.70	6.—	—

Virgilia, siehe Cladrastis.

Weigela, siehe Diervillea.

Wistaria, siehe unter „Schlingpflanzen“.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Xantorrhiza — Gelbwurz — Ranunculaceae.			
apiifolia *L'Hér.*, ♄ ○ ● ⁞ ♗ ⌀ ≌ . . . . Niedriger Strauch, stark ausläufertreibend, laubabwerfend, Holz und Wurzel innen gelb, B. gefiedert, 3zählig, dunkelgrün, an Actaea erinnernd, Bl. gelblich rotbraun in schlankgestielten, 10—15 cm langen, überhängenden, endständigen Blütentrauben vor Laubausbruch. Herbstfärbung goldgelb. Amerika, bis 50, IV—V.	1.—	—	—
Yucca, siehe unter „Stauden".			
Zelkowa — Keakiulme — Ulmaceae.			
serrata *Mak.* (Planera acuminata *Ldl.*, Zelkowa Keaki *Mayr.*) . . . . 100—120 cm hoch Baum, laubabwerfend, Zweige braunrot, B. eiförmig, lang zugespitzt, bis 12 cm lang, scharf gesägt, oberseits sattgrün, rauh, unterseits heller, Bl. unscheinbar in kleinen, grünen Büscheln, Austrieb bronzen mit purpurnen Knospenschuppen. Japan, bis 30 m, IV—V.	1.50	—	—
Zenobia, siehe Andromeda speciosa.			

Trauerbäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt. Für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

Der Begriff **„Trauerbäume"** kennzeichnet den Wert und die Verwendungsmöglichkeit der zu dieser Gruppe zusammengefassten Gehölze nur zu einem ganz geringen Teil. Zahlreiche Vertreter dieser Gruppe sind durchaus lebhafte Freudenspender, die uns wie wehende Fahnen im Garten entgegenleuchten. Im Frühjahr das junge Grün der Hänge-Birken, oder der Blütenreichtum der japanischen Hänge-Kirschen, im Herbst der üppige Fruchtbehang der Hänge-Zieräpfel, immer werden diese Schätze ein auffallender und freudiger Schmuck jeder Gartenanlage sein. Welch idyllische Gartenbilder lassen sich schaffen mit den Hängeformen der Buche, Esche oder Ulme, die sich bald als schattenspendendes Dach über lauschige Sitzplätze wölben. Welch malerische Gruppen lassen sich mit Hängeweiden oder der Hängeform des Goldregens etwa an Teichrändern schaffen. Drum scheue niemand vor dem Sammelbegriff „Trauerbäume" zurück, deren Verwendungsmöglichkeit weit über Friedhofsmauern hinausgeht.

Hängeformen der Nadelhölzer, siehe unter „Nadelhölzer" bei den einzelnen Gattungen.

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Amorpha fruticosa pendula, siehe unter „Ziersträucher".					
Betula — Birke.					
alba elegans pendula *Hort.* . . . . Junge Bäumchen von aufrechtem Wuchs, ältere Pflanzen mit feinverzweigten Ästen lang senkrecht herabhängend.	120—150	—	1.50	13.50	—
pendula Youngi *Th. Moore*, Trauerbirke △					
verpflanzt, mit mehrjährigen Kronen: Höhe bis zur Krone	120—150	6—8	4.—	36.—	—
» » » »	180—200	6—8	6.—	54.—	—
» » » »	180—200	8—10	7.—	65.—	—
» » » »	ca. 250	14—16	12.—	—	—
» » » »	» 250	16—18	20.—	—	—
» » » »	» 250	18—20	30.—	—	—
» » » »	» 250	20—25	35.—	—	—
Zierlich belaubte Form mit malerisch gebogenem, weissem Stamm und schlaff, mähnenartig hängenden Zweigen. Fürs Alpinum und den Hausgarten.					
Caragana — Erbsenstrauch.					
arborescens pendula *Dipp.* . Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	1.50	13.50	—
Hängender Erbsenstrauch von » » » »	160—180	8—10	2.50	22.50	—
langsamem Wuchs und bis zur » » » »	180—200	8—10	2.75	25.—	220.—
Erde straff herabhängenden » » » »	180—200	10—12	3.—	27.—	250.—
Zweigen. Wie die Art gelbblühend, mit starker Schotenbildung, für kleinere Anlagen und Friedhof.					

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fagus — Buche.					
silvatica horizontalis, siehe unter „Laubhölzer".					
» **pendula** *Lodd.*, Trauerbuche ⊥ . . . Pyramiden	200—250	—	5.—	45.—	—
Trauerform der grünblättrigen Rotbuche, bildet bei älteren Bäumen wahre Dome mit ihren mächtig zur Erde herabhängenden Ästen und Zweigen. Landschaftlich reizvoll, daher für freie Stellung im grossen Park. — »	300—350	—	7.—	60.—	—
Höhe bis zur Krone	140—160	10—12	6.—	54.—	—
» » » »	160—180	10—12	8.—	72.—	—
» » » »	180—200	8—10	10.—	90.—	—
ganze Höhe	300—350	18—20	50.—	—	—
» **purpurea pendula nova** *Hort.*, Trauerblutbuche Pyramiden	150—200	—	6.—	—	—
»	200—250	—	7.—	60.—	—
Trauerform der rotblättrigen Blutbuche, sehr stimmungsvoll und edel wirkende Zweckform. — Höhe bis zur Krone	80—100	—	4.—	36.—	—
» » » »	100—120	8—10	5.—	—	—
» » » »	140—160	8—10	7.—	—	—
» » » »	180—200	6—8	8.—	70.—	—
» » » »	180—200	8—10	10.—	90.—	—
» » » »	ca. 250	18—20	50.—	—	—
» » » »	» 250	25—30	80.—	—	—
Fraxinus — Esche.					
excelsior aurea pendula *Loud.*, Trauer-Goldesche Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.50	22.50	—
» » » »	200—220	10—12	3.—	—	—
Hängeform der gelbgrünen Goldesche zur Laubenbildung geeignet, wirkungsvoll durch das winterlich gelbe Holz und die schwarzen Knospen.					
» **pendula** *Desf.*, Traueresche . Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	27.—	—
» » » »	200—220	12—14	3.50	31.50	—
» » » »	200—220	14—16	4.—	—	—
Beliebte und sehr robuste Hängeform der grünen Esche, als Laubenbaum stark verwandt.					
» » **variegata** *Hort.*, Buntlaubige Traueresche Höhe bis zur Krone	200—220	14—16	4.—	—	—
» » » »	200—220	16—18	5.—	—	—
Form mit weissbunten B.					
parvifolia pendula *Dipp.* (Fr. rotundifolia pendula *Rehd.*), Kleinblättrige Traueresche Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.50	—	—
» » » »	200—220	10—12	3.—	—	—
Hängeform der kleinblättrigen, freudiggrünen Esche mit langen, dünnen, überhängenden Zweigen.					
Laburnum — Goldregen.					
alpinum pendulum *Koch.* Hänge-Goldregen. Hängeform des Alpengoldregens. — Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	3.50	31.50	—
» » » »	200—220	12—14	5.—	—	—
Malus — Apfel.					
Exzellenz Thiel *Späth.* (M. prunifolia pendula × floribunda) ☘	80—120	—	1.50	—	—
Hängeform eines Zierapfels, der sowohl als Blütenbaum mit zartrosa Bl. im Mai, als auch als Zierfruchtbaum mit seinen kirschgrossen, wachsgelben und rotbackigen Aepfelchen von guter Zierwirkung für jeden Garten ist.					
Oekonomierat Echtermeyer ☘	80—120	—	1.50	13.50	120.—
Hängeform eines Zierapfels, dessen Blattaustrieb schön braunrot ist und dessen Blüten gross, karminpurpurn sind. Früchte sehr zierend, dunkelbraunrot, gegen 2 cm Durchmesser.					
pendula Elise Rathke *Hort* ☘ . Höhe bis zur Krone	180—200	7—8	3.—	—	—
Hängeform eines Apfels mit schön apfelblütenfarbigen Blüten und dicken, gelben, sonnenwärts geröteten, essbaren Früchten von leicht weinsäuerlichem Geschmack, die sich stellenweise bis April—Mai genussreif halten lassen.					
Morus — Maulbeerbaum.					
alba pendula *Schneid.*	80—120	—	2.—	—	—
Mittelhoher Trauerbaum, Form des für die Seidenraupenzucht wertvollen Maulbeerbaums, mit am Stamm senkrecht herabhängenden Zweigen. Durch diese auffallende Wuchsform und das schön frischgrüne Laub bei freier Stellung von guter Zierwirkung.					

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pirus — Birne.					
salicifolia pendula *Hort.* ꕤ . . Höhe bis zur Krone Hängeform der weidenblättrigen, silberweissen Zierbirne mit reichem, weissem Blütenflor im Mai und zierendem Fruchtbehang kleiner, birnartiger Früchte im Herbst.	180—200	7—8	3.—	27.—	—
Populus — Pappel.					
graeca pendula *Hort.* . . . . Hängeform einer Hybride der P. grandidentata × tremula, zierlich belaubt, schön überhängend.	80—100	—	1.50	13.50	—
Prunus — Pflaume.					
Chamaecerasus pendula variegata ꕤ Trauerbäumchen für Einzelstellung mit myrtenähnlicher, bunter Belaubung an zierlich dicht herabhängenden Zweigen, Ende April mit kleinen, rosa Blütchen übersät, später mit roten Früchten besetzt. Höhe bis zur Krone	140—160	—	1.75	—	—
» » » »	ca. 200	6—8	2.—	—	—
» » » »	ca. 200	8—10	2.50	—	—
japonica pendula rosea *Hort.* . . . . Die Triebe dieser kleinblättrigen Form sind anfangs horizontal ausgebreitet und hängen später zierlich abwärts, Bl. einfach, rosa.	50—80	—	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone	ca. 200	6—8	3.—	—	—
» » » »	ca. 200	8—10	4.—	—	—
serrulata Shidare Sakura *Koehne.* . . . . Büsche Trauerkirsche mit lang herabhängenden Zweigen und dichtgefüllt, rosafarbenen Blüten in Büscheln im Mai.	50—70	—	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone	120—140	—	2.—	18.—	—
» » » »	140—160	—	2.25	20.—	—
» » » »	ca. 200	6—8	2.50	22.50	—
» » » »	ca. 200	8—10	3.—	—	—
Quercus — Eiche.					
palustris pendula *Hort.* Trauereiche . . . . Hängeform der Sumpf-Scharlacheiche.	60—80	—	3.—	—	—
pedunculata Dauvessei pendula *Hort.* . . . . . Sehr schöne und elegante Hängeform der Stieleiche.	120—150	—	5.—	—	—
rubra pendula *Hort.* . . . . Hänge- oder Trauerform der allbekannten, amerikanischen Roteiche.	60—80	—	3.—	—	—
	80—100	—	5.—	—	—
Rosa, Trauerrosen siehe unter „Schlingrosen" und „Parkrosen".					
Salix — Weide.					
alba vitellina pendula nova *Hort.* Trauerdotterweide Prachtvoll herabhängende Form mit langen, dünnen, gelben Zweigen. Sträucher	100—120	—	—.80	7.—	—
Heister	200—250	—	1.75	16.—	—
babylonica pendula *Hort.* . . . . Sträucher Hübsche Trauerweide für warme Lagen.	100—150	—	—.80	7.—	—
» **ramulis aureis pendula** *Hort.* . . . Sträucher Sehr zierlich hängende Trauerweide mit dünnen, goldgelben Zweigen. Eine der schönsten Trauergoldweiden.	150—200	—	1.75	16.—	—
elegantissima *K. Koch* (S. Sieboldi *Hort.*) . . . . . Gut winterharte Art Japans. Bildet mittelhohen, breitkronigen Baum mit abstehenden Ästen und lang herabhängenden Zweigen, gelblich bis bräunlichgrün.	100—150	—	—.80	7.—	60.—
Sacramentana *Hort.* . . . . Sträucher Sacramentaner Trauerweide.	100—120	—	—.80	7.—	—
Salomoni *Hort.* (S. babylonica × alba sepulcralis) Bildet grosse, breite, regelmässige Kronen mit überhängenden, gelbgrünen Zweigen; nur weiblich bekannt. Sträucher	100—120	—	—.80	—	—
Sieboldi, siehe S. elegantissima.					
Sorbus — Eberesche.					
aucuparia pendula *Kirchn.* Trauereberesche. ꕤ Form der heimischen Eberesche mit lang herabhängenden Zweigen, grossen, weissen Blütendolden im Mai und zierendem, rotem Fruchtbehang im Herbst. Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	2.—	—	—
» » » »	200—220	8—10	2.50	—	—

Ulmus — Ulme.	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
montana horizontalis *Kirchn.* . Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	27.—	—
Trauerulme mit waagerecht » » » »	200—220	12—14	3.50	—	—
abstehenden Ästen, später schön überhängend.					
» **pendula** *Hort.* . . . . Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	3.—	27.—	—
Herrliche Hängeform der » » » »	200—220	12—14	3.50	30.—	—
Bergulme mit weit im Bogen überhängenden Zweigen und sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Für Überdachung von Sitzplätzen besonders geeignet und beliebt.					
parvifolia pendula *Hort.* (U. pumila sibirica *Hort.*, U. pumila pendula *Rehd.*) . . . . Hängeform der kleinblättrigen Ulme.	80—120	—	1.—	9.—	—
suberosa pendula *Lav.* (U. foliacea propendens *Rehd.*) Stark korkflügelige Hänge- Höhe bis zur Krone	200—220	12—14	3.50	—	—
form der Feldulme. » » » »	200—220	16—18	4.50	—	—

Schlingpflanzen.

Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.

Viel zu wenig ist der Gartenwert der „**Schlingpflanzen**" erkannt oder gar ausgeschöpft. Es gibt keinen Garten, in dem nicht irgendwo und irgendwie „Schlingpflanzen" am Platze wären. Sei es eine nackte Hauswand, eine tote Mauer, eine Pergola, ein Pfeiler, irgendeine der oft unvermeidlichen nüchternen Zweckbauten, ein Pfahl oder abgestorbener Baum, immer werden „Schlingpflanzen" so recht am Platze sein, hier mildernd und verschönernd einzugreifen. Als Heckenersatz an Zäunen, zur Begrünung von Böschungen und Ausgestaltung von Uferhängen, stets wird man mit „Schlingpflanzen" ganz hervorragende Wirkungen erzielen. Auch hier bietet die Verschiedenheit des Blattmosaiks, die Laubfärbung, die Blütenfülle und endlich die herbstliche Fruchtzierde unzählige Möglichkeiten, Gartenbilder zu beleben, so dass „Schlingpflanzen" viel viel mehr zur Anwendung kommen sollten.

Actinidia — Strahlengriffel — Dilleniaceae.	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
arguta *Miqu.* Spitzblättriger Strahlengriffel ○ ◑ ≌ + . . .	60—80	1.20	11.—	—
Hochkletternder Schlinger mit eilänglichen, dunkelgrünen, lange haftenden B. und weissen, duftenden Bl. und essbaren, bräunlichgelben, stachelbeerähnlichen Fr. an weiblichen Pflanzen. Für sonnigen, feuchten Standort. Japan, 5—15 m, VI.	100—150	1.50	13.50	—
callosa Henryi *Maxim.* (A. curvidens *Dunn.*) . . mit Ballen Schlingstrauch, Triebe stark drüsig punktiert, Austrieb schön rötlich, B. ziemlich derb, 6—15 cm lang, jeweils halb so breit, frischgrün, mit leicht silbernem Anflug, eigenartig hakig, ungleich gezähnt, Bl. weiss duftend, Fr. grünlich im Oktober. Mittel-Westchina, 5—7 m, V—VI.	150—200	2.50	—	—
chinensis *Planch.* + ... **m. Tb.** Schlinger, laubabwerfend, lange, dichtfilzige Triebe, B. sehr gross, behaart, sehr zierend, auf den Adern rot behaart, Bl. einzeln, gelbweiss, 3—4 cm breit, Fr. eirund, 3—5 cm gross, behaart, essbar. China, bis 8 m, VI.	30—50	2.50	—	—
Kolomikta *Maxim.*, Kolomiktawein ⌀ . . . . Wertvoller Schlinger, Zweige rötlich, B. breit eilänglich, anfangs hellbräunlich, später gelblichgrün, färben sich an männlichen Pflanzen zum Teil derart bunt, dass sie anfangs grünlichweiss, silberig, später hellrosa, dann dunkler bis violett gezeichnet erscheinen, Bl. weiss. Mandschurei, 2 m, V.	80—100	1.50	13.50	—
polygama *Franch. & Sav.*, Silberwein ⌀ 🐈 . . . . Hochkletternder Schlinger mit schlanken, rauh behaarten Zweigen, B. grösser und breiter als bei A. Kolomikta, fast lederartig, oberseits lebhaft grün, teilweise silberweiss verfärbend, unterseits metallisch glänzend hellbläulichgrün, Bl. ziemlich gross, weiss, in 3—6 blütigen Doldentrauben. Mandschurei, Japan, China, 5 m, VI—VII. Vor Katzen schützen!	100—150	1.50	13.50	—
purpurea *Rehd.* + ... **Neu!** mit Ballen Schnellwüchsige Art, B. oberseits matt, stärker und breiter gezähnt als A. arguta, Bl. meist einzeln, weiss, Fr. purpurn, eiförmig, geschnäbelt, süss im Oktober. Westchina, 3—5 m, VI.	100—150	2.50	—	—
Thunbergi Giraldi *Hort.* . . . . mit Ballen Hochkletternder Strauch, B. eilängl., obers. dunkelgrün, unters. weisslich bereift, dick, Blattstiele violett und weiss bereift.	100—150	2.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Akebia — Akebie — Lardizabalaceae.				
quinata *Dcne.* ● ஃ . . . . Lianenartiger Schlingstrauch, B. dunkelgrün, lange haftend, langgestielt, unbehaart, fünffingerig, Bl. männlich und weiblich getrennt, heller oder dunkler bräunlichviolett in armblütigen Trauben, Fr. gurkenartig, achselständig, bei voller Reife schön hellblau. Japan, China, 3—5 m, V.	100—150	1.50	13.50	—
Ampelopsis — Jungfernwein — Vitaceae. Einschliesslich Parthenocissus.				
aconitifolia dissecta *Koehne* (A. aconitifolia *Bge.*) . . . . . Schlinger mit kahlen Trieben, B. schön tief geschlitzt, fünfteilig, Fr. erst bläulich, dann orange. Nordchina, VI—VIII.	100—150 200—250	1.— 1.50	9.— 13.50	— —
Coignetiae *Pull.* (Vitis Coignetiae *Pull.*, V. Kaempferi *K. Koch*) ∅ Schlinger, hochkletternd, Triebe rund, rostig filzig, B. bis 25 cm, rundlich herzförmig, unterseits rostig filzig, Herbstfärbung prächtig gelb, orangerot, purpurn und braunkarmin, Fr. schwarz mit purpurnem Reif. Japan, VI—VII.	150—200	1.20	11.—	—
Engelmannii *Eng.* (Parthenocissus quinquefolia Engelmanni *Rehd.*) Selbstklimmer ∅ . . . . Schlinger, sehr schnell wachsend, B. fünfzählig wie A. quinquefolia, aber Ranken mit kräftigen Haftscheiben versehen. Bl. grünlich, Herbstfärbung dunkelbraunrot.	100—150	—.60	5.—	45.—
heterophylla variegata ∧ . . . . mit Ballen Schlinger, zierlich belaubt, weissbunt gescheckt, Triebe rosa.	80—100	2.—	—	—
megalophylla *Diels. & Gilg.* (Vitis megalophylla *Veitch.*) Doldenrebe . . . . Schlinger, hoch kletternd, mit langen, verzweigten Ranken, Holz glatt, weiss gesprenkelt, B. fiederig, bis 60 cm gross, unterseits blaugraugrün, Knospen dick, Bl. unscheinbar, Fr. schwarz. Westchina, 10 m, VIII.	80—100	1.20	11.—	—
odoratissima *Hort.* (Vitis odoratissima *Don.*, V. vulpina *L.*) Duftrebe . . . . Schlinger, üppig, B. dünn, breit herzförmig, 8—12 cm gross, Bl. sehr fein und süss duftend (für Bowlen!), Fr. blau bereift. ON-Amerika, 6 m, VI.	100—150	1.—	9.—	—
quinquefolia *Mchx.* (Parthenocissus quinquefolia *Planch.*) „Wilder Wein" ⚘ ∅ . . . . Schlinger, meist ohne Haftscheiben, B. fünfteilig, unterseits weisslichgrün, Herbstfärbung prachtvoll rot. Guter Heckenersatz für Zaunbekleidung bei jährlich vollkommenem Rückschnitt. Amerika.	150—200	—.60	5.—	45.—
St. Pauli *Hort.* (Parthenocissus quinquefolia Saint Paulii *Rehd.*) Selbstklimmer ∅ . . . . Schlinger, starkwüchsig, mit zierlich hängenden Sommerranken, B. gross, Triebe und Blattunterseiten mehr behaart als bei der Art, Herbstfärbung leuchtend scharlach.	100—150 150—200	—.60 —.70	5.— 6.—	45.— 50.—
Veitchii *Hort.* (A. inconstans *Miqu.*, Parthenocissus tricuspidata *Veitch.*) ⚘ ∅ ⚘ . . . . Schlinger, bekannter Japanwein mit meist herzeiförmigen B., oder diese auch dreizählig, kaum gelappt, bis fast 20 cm breit werdend, Bl. gelbgrün, Fr. blauschwarz bereift, Herbstfärbung gelb, rot und purpurn. Japan, China, VI—VII.	40—60 60—80 80—100	—.50 —.60 —.70	4.50 5.— 6.—	40.— 45.— 50.—
» **gigantea** *Hort.*, Selbstklimmer ∅ . . . . Form von äusserst kräftigem Wuchs, B. viel grösser als die der Art, oberseits glänzend sattgrün.	40—60 60—80 80—100	—.50 —.60 —.70	4.50 5.— 6.—	40.— 45.— 50.—
» **Gloire de Boskoop** *Hort.*, Selbstklimmer ∅ . . . . . . Form, das ganze Jahr über prächtig rotbraun.	40—60 60—80 80—100	—.50 —.60 —.70	4.50 5.— 6.—	40.— 45.— 50.—
» **purpurea** *Hort.* (Parthenocissus tricuspidata purpurea *Rehd.*) Selbstklimmer ∅ . . . . Form mit prachtvoll roten Trieben, B. färben sich 3 Wochen früher als die der Art schön purpurrot im Herbst.	40—60 60—80	—.50 —.60	4.50 5.—	— 45.—
Apios, siehe unter „Stauden".				
Aristolochia — Osterluzei — Aristolochiaceae.				
moupinensis *Franch.* . . . . **m. Tb.** Schlinger, sehr stark wachsend, junge Triebe dichtseidig behaart, B. herzförmig, Bl. mit etwa 6 cm langer Röhre, grünlichgelb mit purpurroter Zeichnung. Westchina, VI.	30—40	2.50	—	—

Laubhölzer

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Aristolochia (Fortsetzung):				
Sipho *L. Hér.* (A. durior *Hill.*, A. macrophylla *Lam.*) Pfeifenstrauch, Heberblume ○ ● ≌ . . . . Schlinger, sehr stark wachsend, B. sehr gross, nierenförmig, bis 25 cm breit, Bl. pfeifenkopfähnlich, gelbgrün mit Rotbraun. Amerika, bis 10 m, VI—VII.	125—150	2.50	22.50	—
Atragene, siehe Clematis unter „Stauden".				
Bridgesia, siehe Ercilla unter „Laubhölzer".				
Calystegia, siehe unter „Stauden".				
Campsis, siehe Tecoma.				
Celastrus — Baummörder — Celastraceae. ♣				
flagellaris *Rupr.* ◑ . . . . mit Ballen Schlinger, mit kurzen, hakigen Dornen, mit bleibenden Nebenblättern, Fr. 5—8 mm dick, grüngelb mit orange Samen. Amurgebiet, bis 3 m, VI.	80—120	1.50	13.50	—
hypoglauca *Hemsl.* (C. hypoleuca *Warb.*) . . . . Schlinger, junge Triebe bereift, B. unterseits blauweiss bereift, elliptisch, Fr. lange grün haftend. Mittelchina, bis 5 m, VI.	100—150	1.50	—	—
orbiculata *Thbg.* (C. articulata *Thbg.*, C. Tatarinovii *Rupr.*) . Schlinger, stark- und hochschlingend, B. eirundlich, freudiggrün, 5—10 cm gross, unterseits grün, Bl. achselständig, Fr. gelb und scharlachrot, nach Blattfall sehr zierend. Japan, China, bis 12 m, VI.	150—200	1.20	11.—	100.—
punctata *Thbg.* (C. articulata punctata *Makino*) . . . . Schlingstrauch mit stark punktierten Zweigen, stark schlingend, B. dunkelgrün. Japan.	150—200	1.50	13.50	—
Rosthorniana *Loes.* . . . . Schlingstrauch, dichtwachsend, B. schmalelliptisch, dicklich, gelbgrün, Spitze lang ausgezogen, Bl. grünlichweiss, Fr. orangegelb im Oktober. Westchina, bis 10 m, V.	80—120	1.50	—	—
scandens *L.* . . . . Schlingstrauch, mit olivfarbigen, dunkler gepunkteten Ästen, B. lebhaft dunkelgrün, spitz eilanzettlich, 5—10 cm gross, Bl. endständig in vielblütigen Rispen, Fr. gelb mit Rot, sehr auffällig und zierend. Amerika, bis 7 m, VI.	100—150	1.50	13.50	—
strigillosus *Nakai* . . . . Schlinger, raschwachsend, steifborstig, B. dunkelgrün, Rand kraus verstärkt, schön belaubt.	120—150	1.50	—	—
Clematis — Waldrebe — Ranunculaceae.				
alpina, siehe unter „Stauden".				
brevicaudata *D.C.* . . . . Schlinger mit behaarten Zweigen, B. doppeltdreizählig, Blättchen bald kahl, grob gesägt, manchmal dreilappig, Bl. in gross. Blütenständ., lilarosa. Mandschurei bis Westchina, IX.	100—150	2.—	—	—
Flammula *L.* . . . . Schlinger mit doppelt gefiederten B., Bl. klein weiss, in grosser Rispe am Ende diesjähriger Zweige, wohlriechend, sehr zahlreich. Südeuropa, bis 5 m, VIII—X.	60—80	1.20	11.—	—
integrifolia, siehe unter „Stauden".				
Jackmanni-Hybriden grossblumige, in Sorten m. Wahl. **Freilandpflanzen in starker gesunder Ware** . . . . . Schlinger mit mittelgrossen, fiederteiligen B., Bl. einzelnstehend in sehr feinen Farben, weiss, blaue und rote Töne in teils sehr grossblumigen, äusserst wirkungsvollen Sorten. Fuss beschattet pflanzen!	100—150	2.50	22.50	—
ligusticifolia *Nutt.* . . . . Schlingstrauch, B. gefiedert, Bl. weiss, Blütenstände ähnlich Cl. Vitalba. Amerika, 6 m.	100—150	1.20	11.—	—
montana *Buch.* (Cl. anemoniflora *D. Don.*) . . . . Schlinger, sehr hoch kletternd, Bl. weiss, etwa 5 cm breit. Himalaja, China, 8 m, V.	80—120	1.50	13.50	120.—
» **grandiflora** *Hook.* . . . . Form mit sehr grossen, schön reinweissen Bl.	60—100	1.50	13.50	—
» **Parkeri** *Hort.* . . . . Form mit zartrosa Bl., B. ziemlich derb mit schöner Silberzeichnung.	100—150	2.—	—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Clematis (Fortsetzung):				
orientalis *L.*, (Cl. graveolens *Ldl.*) . . . . Schlinger, ungemein starkwachsend, B. doppelt oder einfach gefiedert, blaugrün, Bl. klein, gelb, in dichten Büscheln. Himalaja, 6 m, VII.	80—100	1.20	11.—	—
» **latifolia** *Hort.* . . . . Form mit grösseren, gelben Bl.	80—100	1.20	—	—
paniculata *Thbg.* (Cl. recta paniculata *Ktze.*, Cl. Flammula robusta *Carr.*) . . . . Schlinger, anfangs langsam wachsend, mit dem Alter kräftiger, B. zierlich, Bl. rahmweiss, sehr zahlreich, wohlriechend, in vielblütigen Rispen. Schön in Gemeinschaftspflanzung mit Schlingrosen. Japan, bis 10 m, Herbst.	50—70	2.—	18.—	—
recta, siehe unter „Stauden".				
tangutica obtusiuscula *Rehd. & Wils.* . . . . Form mit etwas schmäleren B. als die Art, auffallend zierend, Bl. kleiner, aber sehr fest, einzeln, goldgelb, breitglockig, langgestielt. NW-China, bis 3 m, VI bis Herbst.	80—100	1.20	—	—
Veitchiana *Craib.* . . . . Schlinger mit doppelt gefiederten B., Bl. klein, krugartig, gelb, duftend. Westchina, bis 3 m, IX—X.	100—150	1.20	11.—	—
Vitalba *L.*, ⚘ . . . . Schlinger, hochrankend, B. gefiedert, Bl. weiss, 2 cm breit, in schön. Risp. Europa, Nordafrika, Kaukasus, bis 10 m, VII—IX.	100—150	—.80	7.—	60.—
Viticella *L.*, ⚘ . . . . Schlinger mit doppelt gefiederten B., Bl. klein, blauviolett, bis 5 cm breit, flach ausgebreitet. Südeuropa, Westasien, 4 m, VI—VIII.	100—150	1.50	13.50	—
Cocculus — Kockel — Menispermaceae.				
carolinus *DC.* . . . . mit Ballen Schlingstrauch, B. ungeteilt oder dreilappig, hellgrün, nach der abgerundeten Spitze zu allmählich verschmälert, sehr schönes Blattmosaik bildend, Bl. grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben. Amerika, bis 4 m, VII—VIII.	80—100	2.—	—	—
heterophyllus *Hemsl. & Wils.* (Sinomenium acutum *Rehd. & Wils.*) . . . . mit Ballen Schlinger von kräftigem Wuchs, B. oval, bis 15 cm lang, ganzrandig oder 3—7lappig, oberseits dunkelgrün, unterseits blaugrau, meist behaart, Bl. in bis 20 cm langen Trauben. Japan, China, bis 6 m, VI.	80—100	2.—	—	—
Convolvulus, siehe Calystegia unter „Stauden".				
Decumaria, siehe unter „Laubhölzer".				
Ercilla, siehe unter „Laubhölzer".				
Evonymus radicans und Formen, siehe unter „Laubhölzer".				
Glechoma, siehe unter „Stauden".				
Glycine, siehe Wistaria sowie Apios unter „Stauden".				
Hedera — Efeu — Araliaceae. ● #				
Helix conglomerata *Nichols.* Felsen-Efeu △ . . . . **m. Tb.** Zwergform, langsam wachsend, mit schön den Bodenbewegungen sich anpassenden Zweigen, B. dichtstehend, kraus.	—	1.50	13.50	—
» **hibernica** *C. Koch* . . . . mit Ballen	40—60	—.80	7.—	60.—
» » Bekannter Efeu mit grossen, bis 16 cm breiten, dunkelgrünen, lederartigen B. Schottland.	60—80	1.—	9.—	—
» **minima** *Hibb.* (H. H. donerailensis *Hort.*) △ . . **m. Tb.** Sehr kleinblättrige Form, an H. H. conglomerata erinnernd, aber Triebe straff aufrechtwachsend.	15—20	2.—	—	—
» **sagittata** *Hort.* . . . . **m. Tb.** Form mit sehr schön spitzpfeilförmigen Blattlappen.	30—50	1.50	13.50	—
Holboëllia — Lardizabalaceae.				
chinensis *Diels.* (Sinofranchetia chinensis *Hemsl.*) ⋀ . . . . . Schlingstrauch, laubabwerfend, B. wechselständig, lang gestielt, 3—7fingerig, ganzrandig, Bl. weiss, in 6 zähligen Trauben, Fr. traubenartig, lilapurpurn. Für südliche, warme Lagen. Westchina, bis 10 m, V.	60—80	2.—	—	—

Laubhölzer

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae.				
altissima, siehe unter „Laubhölzer".				
scandens *Maxim.* (H. petiolaris *S. & Z.*) Kletterhortensie, Selbstklimmer △ . . . . **m. Tb.** Schlinger, starkwachsend, Triebe schön gelbgrün, mit Kletterwurzeln versehen, sehr früh austreibend, B. hellgrün, herzförmig, bis 10 cm lang. Bl. in breiten, flachen Dolden Randblüten mit je vier, schön weissen Brakteen versehen. Japan, China, bis 10 m, VI—VII.	30—40	1.50	13.50	—
virens *Sieb* (H. scandens *Ser.*) . . . . mit Ballen Schlinger, schwächer wachsend, kleinblättrig, B. nur 2—5 × 1—2 cm gross, Bl. mit zahlreichen, aber kleineren fertilen Randblüten. Japan.	50—70	1.50	13.50	—
Jasminum — Echter Jasmin — Oleaceae.				
nudiflorum *Ldl.* △ . . . . mit Ballen Schlingstrauch, laubabwerfend, B. dreizählig, Bl. einzeln, achselständig, sattgelb, duftend. China, bis 5 m, I—III.	50—70	1.—	9.—	80.—
» **aureum** *Hort.* △ . . . . mit Ballen Form mit gelben B., leicht vergrünend.	50—70	1.—	9.—	80.—
Weitere Arten siehe unter „Laubhölzer".				
Lathyrus, siehe unter „Stauden".				
Lonicera — Geissblatt, Jelänger-Jelieber — Caprifoliaceae.				
Caprifolium major *Carr.* (L. **americana** *K. Koch*, L. Caprifolium × etrusca) . . . . Hybride, B. oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün, Bl. schön gelb und rot, wohlriechend. VI—VII.	40—60	1.50	13.50	—
ciliosa *Poir.* . . . . Schlinger, schwach schlingend, B. oberstes Paar an Blütentrieben zu elliptischem Teller verwachsen, unterseits blaugrün, Bl. gelblichrot bis rot. Kalifornische Gebirge, V.	50—70	2.50	—	—
» **plantierensis** *Dipp.* . . . . Form mit schön leuchtend orange bis korallenroten Bl.	60—80	2.50	22.50	—
etrusca *Santi.* Λ . . . . Schlinger, hochwachsend, halbimmergrün, B. unterseits blaugrün, teilweise verwachsen, Bl. aussen hellgelb, Rückseite rosa, in dichten Ähren. Mittelmeergebiet, VI—VII.	80—120	1.50	13.50	120.—
flexuosa *Thbg.* (L. japonica repens *Rehd.*) . . . . Schlinger mit rotpurpurnen Trieben, B. halbimmergrün, Bl. rahmweiss, im Verblühen gelb, wohlriechend. China, bis 3 m, VI—IX.	100—150	1.20	11.—	—
» **aureo-reticulata** *Dipp.* . . . . Form mit goldgelb genetzten B.	60—80 100—150	1.20 1.50	11.— 13.50	— —
fuchsioides, siehe L. sempervirens minor.				
glauca *Hill.* (L. dioeca *L.*) . . . . Schlinger, schwach schlingend, B. breitlänglich, oberseits frischgrün, unterseits blaugrün bis bläulichweiss, vielfach auch vollständig blauweiss überhaucht und meist tellerartig verwachsen, Bl. grünlichgelb mit Rot. Amerika, V—VI.	100—150	1.50	13.50	—
Heckrotti *Rehd.* (L. americana × sempervirens) . . . . Schlinger, schwach schlingend, Triebe jung bereift, bräunlichgrün, B. ziemlich gross, oval bis elliptisch, tiefgrün, Bl. in lockeren Sträussen, gross, fleischfarbig bis goldgelb, aussen karmin, Knospe lebhaft karmin. Hybride, VI—IX.	40—60	2.50	22.50	—
Henryi *Hemsl.* # . . . . Schlinger, kräftig wachsend, immergrün, B. bronziert grün, länglichlanzettlich, Bl. rötlich bronzefarbig mit Gelb, Fr. bläulich bereift. Westchina, bis 6 m, VI—VII.	60—80 100—150	1.50 2.—	— —	— —
Periclymenum *L.* . . . . Schlinger, starkwachsend, B. sattgrün, unterseits blaugrau, Bl. gelblich, wohlriechend. Europa, VI—VIII.	100—150	1.—	9.—	—
» **belgica** *Hort.* . . . . Form von grosser Reichblütigkeit, Bl. schön gelb mit Weiss, gross, sehr wohlriechend.	60—80	1.50	13.50	—
» **hybrida nova** *L.* . . . . Starkwachsende Form mit gelben Bl.	60—80	1.20	11.—	—
sempervirens minor *Ait.* (L. fuchsioides *Koch.*) . . . . Schlinger, halbimmergrün, B. schmallänglich, oberseits dunkelblaugrün, unterseits hellblaugrün, Bl. aussen und innen leuchtend hellkarmin bis granatrot. VII—VIII.	50—70	2.50	22.50	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lonicera (Fortsetzung):				
sempervirens superba *Rgl.* (L. semp. coccinea superba *Dipp.*) Bl. grösser, breiter, aussen scharlachrot, innen dunkelorangegelb.	50—70	2.50	—	—
Standishi lancifolia *Rehd.* . . . . Schlingstrauch, halbimmergrün, nur wenig schlingend, B. schmallanzettlich, bis 10 cm lang, Bl. rötlichweiss, duftend. China, bis 2 m, III—IV.	60—100	1.20	11.—	—
Tellmanniana *Magyar.* (L. tragophylla × sempervirens) . . . Schlinger, kräftig wachsend, B. dunkelgrün, unterseits weisslich bereift, Bl. tiefgoldgelb, grossblumig, zahlreich und leuchtend. Hybride, 4 m, V.	80—120	1.50	13.50	—
trichopoda *Franch.* . . . . mit Ballen Schlingstrauch, schwach wachsend, an L. Henryi erinnernd, alle Teile fein behaart, B. länglichlanzettlich, Bl. gelblichweiss, rötlich überlaufen. China, V—VI.	100—150	1.50	13.50	—
Lycium — Bocksdorn — Solanaceae.				
chinense *Mill.* (L. Trevianum *Roem. & Schult.*) . . . . . Schlingstrauch, wenig bedornt, Äste und Zweige weissgrau gestreift, B. hellgrün, lange haftend, Bl. purpurviolett, Fr. bis 2 cm lang, scharlachrot. China, 4 m, VI—X.	100—150	—.80	7.—	—
halimifolium *Mill.* (L. vulgare *Dun.*, fälschlich oft als L. europaeum bezeichnet) . . . . Schlingstrauch, bald mehr, bald weniger bedornt, Bl. hellrot, Fr. länglich orangefarben bis korallenrot. Geschnitten auch als dichte Hecken, undurchdringlich. Südeuropa bis Westasien, bis 3 m, VI—IX.	60—80	—.80	7.—	—
rhombifolium *Dipp.* (L. chinense ovatum *C. Schn.*) . . . . . Schlingstrauch, Zweige rutenförmig, wenig bedornt, B. ziemlich gross, lebhaftgrün, oboval, Bl. hellpurpurn, Fr. gross, walzenförmig, orangerot. China, V—X.	60—80	—.80	7.—	—
Menispermum — Mondsame — Menispermaceae.				
canadense *L.* . . . . Schlinger, hochwachsend, B. gross, stumpflappig, oberseits tiefgrün, unterseits bläulichgrün, Blattstiel am Blattrand angesetzt, Bl. sehr klein, weisslich-gelbgrün, in grossen, lockeren Blütenständen. Amerika, 4 m, VI—VII.	60—100	1.—	9.—	—
Muehlenbeckia — Polygonaceae.				
varians *Meissn.* ∧ . . . . Echt! **m. Tb.** Schlinger, mässig hochwachsend, B. klein, dunkelgraugrün, tiefgelappt oder rundlich ausgebuchtet, Bl. achselständig.	60—80	1.50	—	—
Paederia — Knackbeere, Stinkschlinge — Rubiaceae.				
tomentosa *Maxim.* (P. chinensis *Hance*) ∧ . . . . . . **m. Tb.** Schlinger, rasch- und starkwachsend, Triebe grün, wollhaarig, B. ovallanzettlich, ganzrandig, 4—8 cm lang gestielt, oberseits glänzend tiefgrün, unterseits leicht behaart, hellgrau, 12—15 cm lang, etwa 6 cm breit, Bl. einer Fliederblüte nicht unähnlich, Röhre breiter, aussen silbrig grauweiss, Saum rahmweiss, Mündung samtig purpurrot, in achselständigen, vielblumigen Rispen. China, Japan, Korea, 5 m, VII—IX.	20—30	2.50	—	—
Polygonum — Knöterich — Polygonaceae.				
Aubertii *Henry*, Rankknöterich . . . . Schlinger, sehr stark wachsend in nahrhaftem, tiefgründigem Boden, früher treibend als P. baldschuanicum, Bl. weiss in dichten Traubenbüscheln am Ende der Zweige. Westchina, 15 m, VIII—X.	175—200	—.80	7.—	60.—
baldschuanicum *Rgl.* . . . . Schlinger, starkwachsend, B. oval, 4—10 cm gross, Bl. weiss mit rosa Hauch. Bucharei, bis 15 cm, VI—IX.	175—200	—.80	7.—	60.—

Weitere Arten siehe unter „Stauden".

Rosa, siehe unter „Schlingrosen".

Rubus, siehe unter „Laubhölzer".

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Schizophragma — Spalthortensie — Saxifragaceae.				
hydrangeoides *Sieb. & Zucc.* . . . . mit Ballen	20—30	2.—	18.—	—
Schlingstrauch, ähnlich Hydrangea scandens schlingend, B. stärker gesägt, Bl. mit nur einblättrigen Brakteen umstanden. Japan, bis 10 m, VI.				
Sinofranchetia, siehe Holboëllia.				
Sinomenium, siehe Cocculus.				
Tecoma — Jasmintrompete — Bignoniaceae.				
radicans *Juss.* (Campsis radicans *Seem.*), in der Jugend ∧ . .	60—80	2.—	18.—	—
Schlinger, sehr üppig, Zweige mit Haftwurzeln, B. unterseits meist behaart, Bl. langröhrig, orangerot. Amerika, bis 10 m, VI.				
sanguinea *Hort.*	30—50	2.50	—	—
Form von niedrigem Wuchs und sehr blühwillig.				
Tropaeolum, siehe unter „Stauden".				
Wistaria (Glycine) — Traubenwinde — Leguminosae.				
multijuga alba *Miller* . . . . Freilandpflanzen	100—150	5.—	—	—
»	150—200	6.—	—	—
Höhe bis zur Krone	80—100	12.—	—	—
Schlinger, in Tracht wie W. sinensis, aber Bl. reinweiss, in besonders lang ausgezogenen Blütentrauben. China, 8—10 m, V—VI.				
sinensis *Sweet.*, sicher blühbare Pflanzen, keine Sämlingsware . . . . **m. Tb.**	80—100	2.50	22.50	—
Freilandpflanzen	100—150	2.50	20.—	180.—
»	150—200	3.—	27.—	—
»	200—250	3.50	31.50	—
Schlinger, starkwachsend, B. gefiedert, Bl. vor Ausbruch des Laubes beginnend, in bis 25 cm langen, hängenden Trauben, herrlich blau. China, 8—10 m, V—VI.				

Junge Laubhölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück an in Anrechnung.

Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Die Höhenmasse sind ungefähr angegeben, kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Acer — Ahorn. ‡					
campestre ○ ● ‡ ‡	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 40—60 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	75.—
»	» 70—120 » »	2 »	» »	12.—	100.—
circinatum Ø	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
»		1 »	Ableger	15.—	—
dasycarpum Ø	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
» lutescens Ø		1 »	Ableger	10.—	—
» »	ca. 80—120 cm hoch	2 »	»	12.—	—
» pulverulentum Ø	» 80—100 » »	2 »	»	12.—	—
» Wieri laciniatum Ø	» 60—80 » »	1 »	»	12.—	—
Ginnala ‡ ‡ ♣ Ø	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 70—120 » »	2 »	»	7.—	60.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
Heldreichi	» 15—35 » »	2 »	» »	12.—	—
japonicum	» 10—20 » »	2 »	» »	12.—	—
» Parsonsii Ø		1 »	Sämlinge	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
laetum rubrum Ø	» 60—100 » »	1 »	Ableger	20.—	—
macrophyllum ♣ Ø	» 40—70 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
Miyabei	» 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
neglectum Annae	» 60—80 » »	1 »	Ableger	20.—	—
Negundo	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	2 »	»	5.—	40.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	» 100—150 » »	3 »	» »	7.—	—
» argenteo-variegatum		1 »	Ableger	25.—	—
» » variegatum	ca. 50—70 cm hoch	2 »	»	30.—	—
» aureo-variegatum		1 »	»	25.—	—
» » variegatum	ca. 50—70 cm hoch	2 »	»	30.—	—
» californicum	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
palmatum ◑ ● Ø	» 20—45 » »	1 »	»	8.—	75.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
» atropurpureum	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	40.—	—
» Schwerini	» 10—20 » »	1 »	»	30.—	—
» »	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—
pictum	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
platanoides Ø	» 40—70 » »	2 »	»	5.—	40.—
»	» 70—120 » »	2 »	»	6.—	50.—
» laciniatum		1 »	Ableger	15.—	—
» Reitenbachi Ø	ca. 60—100 cm hoch	1 »	»	35.—	—
» Schwedleri Ø	» 60—100 » »	1 »	»	35.—	—
Pseudoplatanus	» 25—45 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	» 90—140 » »	3 »	» »	8.—	70.—
» euchlorum		1 »	Ableger	12.—	—
rubrum Ø	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
spicatum Ø	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
tataricum aidzuënse	» 30—60 » »	1 »	»	6.—	—
» aidzuënse	» 70—120 » »	2 »	»	7.—	—
» »	» 80—140 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
Trautvetteri ♣	» 20—40 » »	2 »	» »	40.—	—
Actinidia — Strahlengriffel.					
arguta ⊥		1 »	Sämlinge	10.—	—
polygama ⊥		1 »	»	10.—	—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Aesculus — Kastanie.					
Hippocastanum ✲	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 30—60 » »	2 »	»	7.—	60.—
lutea ✲	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Pavia ✲	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
» **parviflora** ◑ ⊥ ✲		1 »	Ableger	30.—	—
Ailantus — Götterbaum.					
Giraldi ✲	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
glandulosa ⁂ ✲	» 30—60 » »	1 »	»	5.—	40.—
Vilmoriniana ✲	» 30—60 » »	1 »	»	5.—	—
Akebia — Akebie.					
quinata ○ ◑ ±		1jähr.	verpfl. Säml.	8.—	—
»		1 »	Ableger	20.—	—
»		2 »	»	25.—	—
Alnus — Erle.					
glutinosa ○ ● ✲ ≌	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 100—150 » »	3 »	» »	6.—	50.—
»	» 150—200 » »	3 »	» »	6.50	55.—
» **imperialis**		1 »	Ableger	12.—	—
» **oxyacanthifolia**		1 »	»	12.—	—
incana ○ ● ✲	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 80—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 150—200 » »	3 »	» »	6.50	55.—
»	» 200—250 » »	3 »	» »	7.—	60.—
» **aurea**		1 »	Ableger	10.—	—
» »	ca. 40—60 cm hoch	2 »	verpfl. Abl.	15.—	—
» **laciniata**		1 »	Ableger	10.—	—
japonica ✲		1 »	»	12.—	—
macrophylla ✲		2 »	»	12.—	—
Amelanchier — Felsenbirne.					
Botryapium ● ♙ ⁂ Ø ✲	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	ca. 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
vulgaris (A. rotundifolia) ● ⁂ Ø ✲	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
Amorpha — Bastardindigo.					
canescens		1jähr.	Sämlinge	10.—	—
fruticosa ✲	ca. 20—40 cm hoch	1 »	»	5.—	40.—
»	» 50—90 » »	2 »	»	8.—	70.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» **crispa**		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» **croceo-lanata**		1 »	» »	15.—	—
Ampelopsis — Wilder Wein.					
Engelmanni, Selbstklimmer ± Ø		1jähr.	bew. Steckl.	8.—	70.—
quinquefolia ± Ø		1 »	» »	6.—	50.—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	70.—
St. Pauli, Selbstklimmer ± Ø		1 »	bew. Steckl.	8.—	—
Veitchi, Selbstklimmer ± Ø		1 »	» »	20.—	—
» **Gloire de Boskoop**, Selbstklimmer ± Ø		1 »	» »	20.—	—
Amygdalus — Mandel.					
nana ♙ △ ✲ ✂		2jähr.	Ableger	50.—	—
Andromeda — Lavendelheide.					
japonica ♙ #	ca. 20—35 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
speciosa #	» 15—30 » »	3 »	» »	30.—	—
»	» 25—50 » »	4 »	» »	35.—	—
» **pulverulenta** #		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	4 »	» »	35.—	—
Aristolochia — Pfeifenblume.					
Sipho ● ±	ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
tomentosa ±		1 »	Sämlinge	12.—	—
Aronia — Zwergvogelbeere.					
arbutifolia ♙ ⁂ Ø	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
nigra ♙ ⁂ Ø	» 20—35 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Artemisia — Beifuss.					
camphorata ♭ ∞ △		1jähr.	Ableger	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Azalea — Azalee.					
mollis, gelbblühend Ø		3jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
» rotblühend Ø		3 »	» »	30.—	—
Azara.					
microphylla △ # ∧		3jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
Berberis — Berberitze.					
aggregata ♣	ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
brevipaniculata ♣	» 10—20 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 25—30 » »	2 »	»	8.—	—
buxifolia (B. dulcis) ● △ #		1 »	»	5.—	45.—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	»	8.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» **nana** ● △ ⁞ ♙ #		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
Caroli hoanghensis (B. Vernae) ♣	ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
» **hoanghensis**	» 50—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Coryi (ähnlich B. Wilsonae) △ ♣ Ø	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 20—40 » »	2 »	»	8.—	70.—
Dielsiana	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Edgeworthiana	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
Farreri △ ♣	» 10 » »	1 »	»	6.—	50.—
Francisci Ferdinandi	» 20 » »	1 »	»	6.—	—
» **Ferdinandi**	ca. 40—70 » »	2 »	»	8.—	—
» »	» 50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Hookeri △ #		1 »	» »	10.—	—
Neuberti (Mahoberberis) #		1 »	Ableger	30.—	—
»		2 »	»	40.—	—
polyantha ♣	ca. 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	»	8.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	Sämlinge	12.—	—
Pratti (B. aggregata Prattii) ♣	» 10—20 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	2 »	»	8.—	70.—
»	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
sinensis	» 40—80 » »	3 »	» »	5.—	40.—
Stapfiana (ähnlich B. Wilsonae) △ ♣	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
subcaulialata (ähnl. B. Wilsonae) △ ♣	» 10 » »	1 »	»	8.—	—
»	ca. 15—20 » »	2 »	»	10.—	—
Thunbergi ♙ ♣ Ø	» 20—35 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» **atropurpurea** ♙ ♣ Ø	bis 25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »	ca. 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
verruculosa △ #		1 »	» »	20.—	—
»	ca. 10—20 cm hoch	2 »	» »	30.—	—
vulgaris atropurpurea ♙ ♣ Ø	» 15—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» **atropurpurea**	» 30—60 » »	2 »	»	4.—	30.—
» »	» 40—70 » »	3 »	»	6.—	50.—
Wilsonae △ ♣ Ø	bis 10 » »	1 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Betula — Birke.					
alba	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	8.—	70.—
odorata	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	8.—	70.—
pubescens	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
verrucosa	» 20 » »	1 »	»	5.—	40.—
»	ca. 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Buddleia — Schmetterlingsstrauch. ♭ ♙					
Hemsleyana	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
japonica	» 60—80 » »	2 »	» »	8.—	70.—
variabilis	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» **magnifica**	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» **nanhoënsis**	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» »	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» **Veitchiana**	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf	1000 St. M. Pf
Buxus — Buchsbaum. ● #					
japonica	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
»	» 25—40 » »	4 »	» »	7.—	60.—
» **aurea**	» 8—12 » »	2 »	» »	6.—	—
» »	» 10—20 » »	3 »	» »	8.—	—
» **sempervirens** ⊥	» 15—30 » »	3 »	» »	6.—	50.—
»	» 25—40 » »	4 »	» »	7.—	—
» **angustifolia**	» 15—30 » »	3 »	» »	7.—	—
» **argenteo-variegata**	» 8—15 » »	2 »	» »	7.—	—
» **Handsworthi**	» 8—15 » »	2 »	» »	7.—	—
» » **aureo-variegata**	» 8—15 » »	2 »	» »	7.—	—
» **myrtifolia**	» 15—25 » »	3 »	» »	7.—	—
suffruticosa :‖: regelrecht gezogene Kultur-Stecklingsware	10 lfde. Meter RM. 5.—				
	100 » » » 40.—				
Callicarpa — Schönfrucht.					
americana		1jähr.	Sämlinge	15.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Giraldiana	ca. 25—50 cm hoch	2 »	» »	30.—	—
japonica		1 »	Sämlinge	15.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	20.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Calycanthus — Kelchblume.					
floridus		1jähr.	Sämlinge	30.—	—
»	bis 15 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	35.—	—
praecox (Meratia)		1 »	Sämlinge	30.—	—
»	bis 15 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	35.—	—
Caragana — Erbsenstrauch.					
arborescens	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 50—70 » »	2 »	»	3.50	30.—
»	» 70—120 » »	2 »	»	4.—	35.—
»	» 80—140 » »	3 »	»	5.—	40.—
Carpinus — Weissbuche.					
betulus ●	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 60—80 » »	2 »	» »	10.—	90.—
caroliniana (C. americana)	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	12.—	—
Ostrya, siehe Ostrya carpinifolia.					
Castanea — Esskastanie.					
vesca +	ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	120.—
»	» 20—45 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Catalpa — Trompetenbaum.					
bignonioides (C. syringaefolia)	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
Kaempferi	» 30—60 » »	1 »	»	8.—	—
speciosa	» 30—60 » »	1 »	»	8.—	—
Ceanothus — Säckelblume.					
americanus ○	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Celastrus — Baummörder.					
orbiculata	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Celtis — Zürgel.					
australis +	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
occidentalis	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
Cephalanthus — Knopfblume.					
occidentalis	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
Cercidiphyllum — Judasbaumblatt.					
japonicum	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
»		1 »	Ableger	20.—	—
Cercis — Judasbaum.					
Siliquastrum	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
»	ca. 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Chionanthus — Schneeflockenbaum.					
virginica		1jähr.	Sämlinge	20.—	—
»	ca. 8—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
»	» 20—40 » »	3 »	» »	40.—	—
Cladrastis — Gelbholz.					
amurensis (Maackia)	bis 20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
» **Buergeri**	ca. 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
Clematis — Waldrebe. ⚘					
ligusticifolia	ca. 60—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
montana	» 40—80 » »	2 »	» »	20.—	—
» **grandiflora**		1 »	» »	15.—	—
» » **rosea**	ca. 40—80 cm hoch	2 »	» »	20.—	—
» **rubens**		1 »	» »	25.—	—
Vitalba		1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	»	7.—	60.—
Viticella		1 »	»	6.—	50.—
»		2 »	»	7.—	60.—
Clethra — Scheineller.					
acuminata		1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	ca. 20—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	10.—	—
alnifolia ● ⚘ Ø	» 15—30 » »	2 »	» »	7.—	—
» **tomentosa**		1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» »	ca. 15—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
barbinervis		1 »	Sämlinge	8.—	—
Colutea — Blasenstrauch.					
arborescens ♣ ⚘	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	35.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
cilicica	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
Cornus — Hartriegel.					
alba ● ⚘ ♣ Ø		1jähr.	Ableger	8.—	—
»	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	12.—	—
» **albo-marginata elegans**		1 »	Ableger	20.—	—
» » **-marginata elegans**		2 »	»	25.—	—
» » » **elegans**	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	28.—	—
» **argenteo-marginata**		1 »	Ableger	15.—	—
» » **-marginata**	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
» **coloradensis**		1 »	Ableger	8.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
» **flaviramea**, gelbholzig		1 »	Ableger	15.—	—
» »		2 »	»	18.—	—
» **Gouchaulti**, gelbbunt		1 »	»	20.—	—
» »		2 »	»	25.—	—
» **Spaethi**, gelbbunt		1 »	»	20.—	—
» »		2 »	»	25.—	—
alternifolia Ø	ca. 40—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	9.—	—
Amomum (C. sericea) Ø	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	» 50—90 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»		2 »	Ableger	10.—	—
Arnoldiana		1 »	»	8.—	—
asperifolia		1 »	»	8.—	—
Baileyi ♣ Ø	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»		1 »	Ableger	8.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	12.—	—
femina (C. stricta)		2 »	Ableger	15.—	—
florida Ø	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	25.—	—
» **rubra** Ø		1 »	Ableger	50.—	—
glabrata		1 »	»	8.—	—
Kesselringi, dunkelholzig Ø		2 »	»	15.—	—
Koehneana ♣ Ø	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	12.—	—
Kousa Ø	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	25.—	—
»		1 »	Ableger	35.—	—
mas ● ⚘ ⚘ ♣ ⚘ +	bis 25 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
pubescens Ø		1 »	Ableger	8.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	10.—	—
sanguinea ● ⚘ Ø	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
»	» 40—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
tatarica ⚘ Ø	» 25—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» **sibirica**, rotholzig ⚘ Ø		1 »	Ableger	15.—	140.—
» » **albo-variegata**, schönste weissbunte		1 »	»	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Corylopsis — Scheinhasel.					
spicata ⊥ ∅ ⚘		2jähr.	verpfl. Ableger	35.—	—
Corylus — Hasel.					
americana ✱		1jähr.	Ableger	20.—	—
Avellana ✱ +	ca. 40—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	55.—
» **atropurpurea** ✱		1 »	Ableger	30.—	—
» **aurea**		1 »	»	30.—	—
» »		2 »	»	35.—	—
» **grossfrüchtige,** in Sorten meiner Wahl (ab Januar lieferbar) ✱ +		1 »	»	30.—	—
» » (nur „Cosford") ✱ +		3 »	verpfl. Ableger	55.—	—
» **laciniata** ✱		2 »	Ableger	25.—	—
» **rotblättrige Zellernuss** ✱ +		1 »	»	40.—	—
Colurna ✱	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	20.—	—
maxima atropurpurea ✱ +		2 »	verpfl. Ableger	50.—	—
rostrata ✱		1 »	Ableger	30.—	—
Cotoneaster — Zwergmispel. ♀ ✱					
acutifolia ♁	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	80.—
ambigua	» 50—90 » »	2 »	» »	9.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	10.—	90.—
amoena △ ∧	» 20—40 » »	2 »	» »	25.—	—
apiculata △	» 30—60 » »	2 »	» »	10.—	—
applanata ♁ ☘ ∅	» 40—80 » »	2 »	» »	10.—	90.—
bullata ☘ ∅	» 50—90 » »	2 »	» »	10.—	—
buxifolia △ ♯	» 20—35 » »	2 »	» »	25.—	—
Hessei, siehe C. praecox Hessei.					
horizontalis △ ☘ ∅	ca. 10—25 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
lactea ♯ ☘	» 30—60 » »	2 »	» »	50.—	—
laxiflora	» 40—80 » »	2 »	» »	10.—	—
Lindleyi	» 60—100 » »	2 »	» »	10—	—
moupinensis ☘ ∅	» 30—60 » »	2 »	» »	10.—	90.—
multiflora ☘	» 50—90 » »	2 »	» »	12.—	—
nanchuanica, siehe C. praecox.			» »		
nitens	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
pekinensis	» 20—40 » »	2 »	» »	10.—	—
praecox (C. Nan Shan) △ ☘ ∅	» 10—20 » »	2 »	» »	30.—	—
» **Hessei** △ ☘ ∅	» 10—15 » »	2 »	» »	50.—	—
racemiflora	» 50—80 » »	3 »	» »	12.—	—
» **microcarpa**	» 50—80 » »	2 »	» »	10.—	—
» **soongarica**	» 50—90 » »	2 »	» »	10.—	—
» **Veitchi**	» 40—70 » »	2 »	» »	10.—	—
Simonsi ♁ ♯ ☘	» 30—70 » »	2 »	» »	12.—	110.—
tomentosa	» 30—60 » »	2 »	» »	10.—	90.—
Zabelii	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
Crataegus — Dorn. ✱					
Carrierei ♀ ☘ ∅	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
coccinea ☘	» 8—15 » »	1 »	»	4.—	30.—
»	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 40—70 » »	2 »	»	9.—	80.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
»	» 40—70 » »	2 »	» »	12.—	100.—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	14.—	130.—
»	» 120—180 » »	4 »	» »	16.—	150.—
corallina ☘	» 40—80 » »	3 »	» »	12.—	—
crusgalli inermis ☘	» 40—70 » »	3 »	» »	18.—	—
flabellata (Cr. crudelis)	» 50—80 » »	2 »	» »	10.—	—
»	» 50—90 » »	3 »	» »	12.—	—
macrantha	» 40—80 » »	3 »	» »	12.—	—
oxyacantha (C. monogyna = einsteinige) ♁	ca. 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
»	» 40—60 » »	2 »	» »	7.—	50.—
»	» 60—80 » »	2 »	» »	8.—	60.—
»	» 70—100 » »	3 »	» »	12.—	100.—
pentagyna (Cr. melanocarpa)	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
Pyracantha (Pyracantha coccinea) ♯ ☘		1 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» **Lalandi** ♁ ♯		1 »	» »	20.—	—
sanguinea ♁	ca. 25—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	8.—	70.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	12.—	110.—
submollis ∅	» 40—80 » »	3 »	» »	12.—	—
viridis	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
Cydonia — Scheinquitte.					
japonica ♀ ♁ ☘ ✱ +	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 50—90 » »	2 »	»	5.—	40.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Cydonia (Fortsetzung):					
japonica	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 60—100 » »	3 »	Sämlinge	8.—	70.—
»	» 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
» eximia ✱	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Abl.	35.—	—
» Gaujardi ✱	» 30—60 » »	3 »	» »	40.—	—
» Moerlosi ✱	» 40—70 » »	3 »	» »	35.—	—
» nivea extus coccinea △ ✱	» 30—60 » »	3 »	» »	35.—	—
» sanguinea plena	» 30—60 » »	3 »	» »	40.—	—
» versicolor lutescens ✱	» 40—70 » »	3 »	» »	35.—	—
lagenaria Wilsoni & ✱	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Maulei ‡ △ ‖ ♙ ✱	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	15.—	—
» grandiflora perfecta △ ✱	» 40—60 » »	2 »	» »	10.—	—
Cytisus — Geissklee.					
austriacus △	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	15.—	—
capitatus	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
multiflorus		1 »	»	8.—	—
nigricans	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	15.—	140.—
sempervirens	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
sessilifolius	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	
Daphne — Seidelbast.					
Mezereum ● ‡ & +!		1jähr.	Sämlinge	20.—	—
»	ca. 10—15 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
» alba ● ‡ & +!		1 »	Sämlinge	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
Decaisnea — Decaisnie.					
Fargesi &	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Desmodium — Fesselhülse.					
Dilleni	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
japonicum		1 »	»	6.—	—
Deutzia — Deutzie.					
crenata		1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
» eburnea		1 »	» »	15.—	—
» elegantissima		1 »	» »	15.—	—
» magnifica		1 »	» »	15.—	—
» Pride of Rochester ∅		1 »	» »	15.—	—
» rosea plena		1 »	» »	15.—	—
discolor floribunda		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» grandiflora		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
gracilis ✂		2 »	» »	12.—	110.—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	140.—
» aurea		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» campanulata ∅		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» carminea ∅		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» multiflora		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» venusta		2 »	bew. Steckl.	12.—	—
hybrida Watereri		1 »	» »	15.—	—
» Welsi		1 »	» »	15.—	—
Lemoinei ✂		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
parviflora	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
Diervillea — Weigelie. ‡					
amabilis		1jähr.	bew. Steckl.	25.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
biformis		2 »	» »	25.—	—
Chamaeléon		2 »	» »	25.—	—
Desboisi		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Edouard André		1 »	bew. Steckl.	28.—	—
» André		2 »	verpfl. Steckl.	28.—	—
Eva Rathke		2 »	» »	35.—	—
florida purpurea △ ♙		2 »	» »	25.—	—

	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Diervillea (Fortsetzung):				
grandiflora Vanhouttei	1jähr.	bew. Steckl.	25.—	—
» Vanhouttei	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
intermedia	2 »	» »	25.—	—
Lowei	2 »	» »	30.—	—
Mad. Lemoine	1 »	bew. Steckl.	25.—	—
» Lemoine	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Président Duchartre	2 »	» »	30.—	—
rosea Kosteriana variegata	2 »	» »	30.—	—
Stelzneri	1 »	bew. Steckl.	25.—	—
»	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
styriaca	2 »	» »	30.—	—
Elaeagnus — Ölweide.				
angustifolia ꝏ ✠ . . . ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
argentea ꝏ ✠	1 »	Ableger	25.—	—
edulis ꝏ ✠ + . . . bis 10 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
» . . . ca. 40—80 » »	2 »	»	10.—	90.—
» . . . » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
parvifolia . . . bis 20 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
umbellata . . . » 20 » »	1 »	»	5.—	—
Evonymus — Spindelbaum.				
alata Ø . . . bis 20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
»	2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
americana Ø . . . ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
europaea, Pfaffenhütchen ꝏ Ø . . » 30—60 » »	2 »	» »	8.—	—
latifolia planipes ꝏ Ø	1 »	Sämlinge	12.—	—
nana Koopmanni ♆ △ # ꝏ	2 »	verpfl. Steckl.	10.—	90.—
» Koopmanni . . . ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	12.—	100.—
» » . . . » 25—50 » »	4 »	» »	15.—	—
radicans, zu Einfassungen und Böschungen ● ■ ⫶ #	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
»	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	70.—
» . . . ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	10.—	90.—
» acuta ◑ ● △ #	2 »	» »	12.—	—
» » . . . ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» variegata, zu Einfassungen △ ⫶ #	2 »	» »	12.—	—
» »	3 »	» »	15.—	—
yedoënsis ꝏ . . . ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Exochorda — Perlstrauch.				
Alberti . . . ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	25.—	—
» macrantha . . . » 15—30 » »	1 »	»	25.—	—
Giraldi . . . » 10—20 » »	1 »	»	25.—	—
» Wilsoni . . . » 10—20 » »	1 »	»	25.—	—
grandiflora . . . » 10—25 » »	1 »	»	25.—	—
Korolkowi	1 »	»	25.—	—
Fagus — Buche.				
silvatica ♆ . . . ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
Fontanesia — Fontanesie.				
phillyreoides	2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» . . . ca. 40—70 cm hoch	3 »	»	15.—	—
Forsythia — Goldglöckchen. ♆ ✠ ⚒				
intermedia	1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
» densiflora	1 »	» »	15.—	—
» »	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» primulina	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» spectabilis	1 »	» »	15.—	—
» »	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» » . . . ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» vitellina	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
ovata	2 »	» »	18.—	—
suspensa	2 »	» »	18.—	—
» Fortunei	2 »	» »	18.—	—
» » aurea	2 »	» »	18.—	—
» Sieboldi Ø	2 »	» »	18.—	—
viridissima ● Ø	2 »	» »	18.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Fraxinus — Esche.					
americana ∅	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
excelsior ⚘	» 30—50 » »	2 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 50—80 » »	2 »	»	6.—	50.—
Oregona latifolia	» 20—40 » »	1 »	»	6.—	—
Ornus ♣ ∅ ⚘	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
» juglandifolia	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
Paxiana, neue, grossbl., wohlriechende Blumenesche ♣	ca. 25—50 cm hoch	2 »	»	10.—	90.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	» »	20.—	—
Gaultheria — Scheinbeere.					
procumbens ◑ ● △ ♣ #		2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Genista — Ginster.					
pilosa △		3jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
praecox △ ⚘	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	50.—	—
» alba △ ⚘		3 »	» »	50.—	—
scoparia △ ⚘	ca. 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
tinctoria △ ⚘	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 40—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
Gleditschia — Gleditschie.					
triacanthos ⊥ ⚘ ♣	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
Hedera — Efeu.					
Helix ⚘		2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
Hibiscus — Eibisch.					
syriacus	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
»	ca. 25—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
Hippophaë — Sanddorn.					
rhamnoides ⚘ ♣ ▭	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
salicifolia ⚘ ♣ ▭		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Hydrangea — Hortensie.					
arborescens grandiflora ⚘		1jähr.	bew. Steckl.	20.—	—
paniculata grandiflora ⚘		2 »	verpfl. Ableger	20.—	180.—
pekinensis	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
xanthoneura	» 20—40 » »	2 »	» »	12.—	—
» Wilsoni	» 20—40 » »	2 »	» »	12.—	—
Hypericum — Johanniskraut.					
Androsaemum		1jähr.	Sämlinge	10.—	—
»		1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
aureum	bis 25 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	—
calycinum △ #		1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
densiflorum	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Moserianum		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
patulum Henryi	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Ilex — Hülse.					
crenata ◑ △ ⚘ #		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
verticillata, laubabwerfend ♣	ca. 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	—
Indigofera — Indigostrauch.					
Gerardiana ○ △		1jähr.	Sämlinge	12.—	—
Itea — Rosmarinweide.					
virginica ○ ◑ ∅		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Jasminum — Jasmin.					
Beesianum, rotblühend, △ ⚘		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
nudiflorum △ ⚘		2 »	» »	30.—	—
» aureum △ ⚘		2 »	» »	30.—	—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Juglans — Walnuss.					
cinerea ≌	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
cordiformis	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
mandschurica	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	30.—	—
nigra, Schwarznuss	» 40—70 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
»	» 70—120 » »	2 »	»	20.—	180.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
regia +	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	15.—	140.—
»	» 50—90 » »	2 »	»	20.—	180.—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	30.—	—
Sieboldiana	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
Kalmia — Berglorbeer.					
angustifolia ○ ◑ ● ⚘ #		3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
» rosea ● #		3 »	» »	25.—	—
» rubra ● #		2 »	» »	20.—	—
glauca △ #		2 »	» »	20.—	—
latifolia ○ ◑ ⚘ #	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	25.—	240.—
Kerria — Ranunkelstrauch.					
japonica ●	ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
»	bis 20 » »	1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	180.—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» argenteo-marginata		2 »	» »	20.—	—
» » -marginata	ca. 25—40 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» aureo-marginata		2 »	» »	20.—	—
» » -marginata	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» laciniata		2 »	» »	20.—	—
» »	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» plena, Mauerröschen		2 »	» »	40.—	—
Koelreuteria — Koelreuterie.					
paniculata ○ ⌀ ☘	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
»	ca. 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Laburnum — Goldregen.					
alpinum ⚘ ☠	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
vulgare, ⚘ ☠	» 20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
Lavandula.					
spica ⁞ ⚘ #		2jähr.	Stecklinge	12.—	100.—
Ledum — Porst.					
latifolium (L. groenlandicum) △ # ≌		2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
»		3 »	» »	30.—	—
» compactum △ # ≌		3 »	» »	30.—	—
Lespedeza — Buschklee.					
bicolor ♭ ○	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
Leucothoë — Traubenheide.					
Catesbaei, △ # ⌀ ≌	ca. 10—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
»	» 20—40 » »	4 »	» »	30.—	—
Leycesteria — Buntdachblume.					
formosa ○ ∧	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Ligustrum — Rainweide. ⚘ ☘					
amurense	ca. 50—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	12.—	—
Delavayanum △ #		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
Ibota ஃ	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
ionandrum △ #		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
ovalifolium ○ ● ⚘ #	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	1 »	bew. Steckl.	5.—	40.—
» von 2 Trieben an	» 40—80 » »	2 »	» »	9.—	80.—
vulgare ○ ● ⚘	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
»	ca. 40—60 » »	1 »	bew. Steckl.	6.—	55.—
» von 2 Trieben an	» 40—80 » »	2 »	» »	9.—	80.—
» atrovirens ⚘	» 15—30 » »	1 »	» »	8.—	75.—
» » von 2 Trieben an	» 30—60 » »	2 »	» »	12.—	100.—
» chlorocarpum ஃ	» 50—90 » »	2 »	» »	12.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Ligustrum (Fortsetzung):					
vulgare chlorocarpum ஃ	ca. 50—90 cm hoch	2jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
» **glaucum**	» 40—80 » »	2 »	» »	12.—	—
» **italum** ○ ● ⌂	» 25—50 » »	2 »	» »	12.—	100.—
» **pyramidalis** ○ ● ⌂	» 30—60 » »	2 »	» »	12.—	—
Liquidambar — Amberbaum.					
styraciflua Ø	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
»	ca. 30—60 » »	2 »	»	15.—	—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
»	» 50—80 » »	3 »	» »	25.—	—
Liriodendron — Tulpenbaum.					
tulipifera § Ø ✻		1jähr.	verpfl. Säml.	30.—	280.—
Lonicera — Heckenkirsche. § ✻					
amoena alba		1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
chrysantha	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
coerulea		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
involucrata ஃ		1 »	» »	15.—	—
» **serotina**		1 »	» »	15.—	—
Korolkowi		1 »	» »	15.—	—
Ledebouri ● ஃ		1 »	» »	15.—	—
Maacki	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	—
»		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» **podocarpa**	ca. 20—45 cm hoch	1 »	Sämlinge	12.—	—
» »	» 50—90 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Morrowi △ Ø	» 40—80 » »	2 »	» »	15.—	—
Myrtillus △		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
nitida △ ⫶ # ∧		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
orientalis		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Periclymenum ⚘	ca. 40—80 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
pileata △ ⫶ ⌂ #		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	180.—
» **yunnanensis** △ ⌂ #		2 »	» »	30.—	—
prostrata △		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
purpurascens		1 »	» »	15.—	—
rupicola △		1 »	» »	20.—	—
syringantha △		1 »	» »	20.—	—
tatarica ●	ca. 20—45 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
» **alba**		1 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» » **rosea**		1 »	» »	15.—	—
» **rosea grandiflora**		1 »	» »	15.—	—
tibetica △		1 »	» »	15.—	—
Xylosteum ⌂	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
»		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Lyonia — Lyonie.					
calyculata ● #		3jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
Maackia, siehe Cladrastis.					
Maclura — Osagedorn.					
aurantiaca ◑ ஃ	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Magnolia — Magnolie. §					
Kobus ஃ	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	140.—
»	» 80—120 » »	3 »	» »	18.—	160.—
parviflora		1 »	» »	40.—	—
Soulangeana		1 »	» »	30.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	50.—	—
tripetala		1 »	» »	20.—	—
»	ca. 10—15 cm hoch	2 »	» »	30.—	—
Mahoberberis, siehe Berberis Neuberti.					
Mahonia — Fieder-Berberitze.					
Aquifolium ● ⌂ # ஃ ✻	ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
Bealii (fälschlich M. japonica) # § △	bis 20 » »	2 »	» »	20.—	—
»	ca. 20—35 » »	3 »	» »	25.—	—
Meratia, siehe Calysanthus praecox.					

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Morus — Maulbeere.					
alba, Futter für Seidenraupen ♣ +	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.50	20.—
»	» 30—60 » »	1 »	»	3.—	25.—
Myrica — Wachsmyrte.					
cerifera ♣ △ ℬ ∅		1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Nyssa — Tupelobaum.					
silvatica		1jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
Ostrya — Hopfenbuche.					
carpinifolia	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
Periploca — Baumschlinge.					
graeca ♣	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
Phellodendron — Korkbaum.					
amurense	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
japonicum	» 20—40 » »	1 »	»	8.—	70.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Philadelphus — Pfeifenstrauch. ♣ ♣					
Billiardi		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
californicus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
caucasicus		1 »	» »	15.—	—
Falconeri		1 »	» »	15.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
gloriosus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Gordonianus ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
grandiflorus ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	140.—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
hirsutus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 40—60 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
latifolius		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Lemoinei Belle Etoile		1 »	bew. Steckl.	18.—	—
» **Enchantement**		1 »	» »	18.—	—
» **erectus grandiflorus**		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	140.—
» » **grandiflorus**	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	18.—	160.—
» **fimbriatus** △ ♣		2 »	» »	18.—	—
» **Glacier**		2 »	» »	20.—	—
» **Virginal**		1 »	bew. Steckl.	20.—	—
nivalis		1 »	» »	15.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
pekinensis		2 »	» »	15.—	—
» **kansuensis**		1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
pubescens ●		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Satsumi Yokohamae		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» **Yokohamae**	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
sericanthus Rehderianus		2 «	» »	15.—	—
tomentosus		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Zeyheri		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
Photinia — Glanzmispel.					
villosa	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
Physocarpus — Blasenspiere					
Wertvoll für Fasanerien!					
amurensis	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 60—100 » »	2 »	»	5.—	40.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 100—140 » »	3 »	» »	10.—	—
intermedius parvifolius ♣		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» **parvifolius**		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
opulifolius ●	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» **luteus**		1 »	bew. Steckl.	15.—	—

Platanus — Platane.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
acerifolia pyramidalis ♗	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	20.—	—
» pyramidalis	» 60—80 » »	2 »	Ableger	30.—	—
occidentalis	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	20.—	—
»	» 80—100 » »	2 »	Ableger	30.—	—
» Suttneri	» 40—60 » »	2 »	»	30.—	—

Populus — Pappel. ♗ ❀

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
alba nivea, Silberpappel	ca. 70—100 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	10.—	—
angulata cordata robusta	» 80—100 » »	1 »	» »	8.—	70.—
» cordata robusta	» 150—200 » »	2 »	» »	12.—	—
balsamifera (P. candicans)	» 80—100 » »	1 »	» »	8.—	—
»	» 100—140 » »	2 »	» »	12.—	—
berolinensis, Pyramidenpappel	» 80—100 » »	1 »	» »	12.—	—
canadensis	» 60—100 » »	1 »	» »	5.—	40.—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» betulifolia	» 60—80 » »	1 »	» »	6.—	—
» laevigata	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
canescens	» 50—70 » »	1 »	» »	10.—	—
Carreiriana	» 80—100 » »	1 »	» »	6.—	—
caudina	» 50—70 » »	1 »	» »	6.—	—
charkowiensis	» 80—100 » »	1 »	» »	6.—	—
Eucalyptus	» 80—100 » »	1 »	» »	6.—	—
incrassata	» 60—80 » »	1 »	» »	6.—	—
nigra, echt	» 40—70 » »	1 »	» »	8.—	—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	10.—	—
» fastigiata, ital. Pyramidenp.	» 60—100 » »	1 »	» »	7.—	60.—
» »	» 100—150 » »	2 »	» »	8.—	70.—
» » Plantierensis foemina	» 70—100 » »	1 »	» »	7.—	—
» » » mascula	» 60—80 » »	1 »	» »	7.—	—
Simonii	» 60—80 » »	1 »	» »	8.—	—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	12.—	—
» fastigiata, Pyramidenpappel	» 80—100 » »	1 »	» »	10.—	—
» »	» 100—150 » »	2 »	» »	12.—	—
szechuanica	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
»	» 100—150 » »	2 »	» »	12.—	—
trichocarpa	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	12.—	—
Wislizeni	» 60—80 » »	1 »	» »	8.—	—

Potentilla — Fünffingerstrauch.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
dahurica △ ⋀		2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
Farreri ♗		2 »	» »	18.—	170.—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	25.—	240.—
fruticosa ♗	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	3 »	»	8.—	70.—
»	» 50—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» albescens △	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» Friedrichsenii ♗	» 30—60 » »	2 »	Sämlinge	7.—	60.—
» mandschurica △		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
» ochroleuca ♗	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	18.—	—
» parvifolia △		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» Purdomii ♗		2 »	» »	18.—	—
» »	ca. 40—60 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» sulfurea	» 20—40 » »	2 »	» »	18.—	—
» Veitchi △	» 20—30 » »	2 »	» »	18.—	—

Prunus — Pflaume, Kirsche. ❀

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
incana		1jähr.	Ableger	20.—	—
Laurocerasus rotundifolia #	ca. 20—40 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» schipkaënsis ● #	» 10—25 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
» » compacta ● #	» 10—25 » »	2 »	» »	15.—	—
lusitanica pyramidalis ♗ #	» 15—30 » »	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Mahaleb ♗	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
Myrobalana ♗	» 80—120 » »	3 »	» »	5.—	40.—
»	» 120—180 » »	4 »	Sämlinge	6.—	50.—
Padus ● ♣	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 30—60 » »	1 »	»	7.—	60.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 40—80 » »	2 »	» »	9.—	80.—
Pissardi nigra ♗	» 25—50 » »	1 »	bew. Steckl.	20.—	—
Pseudocerasus	» 30—60 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
pumila △ ⌀		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
serotina ● ♗	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
spinosa ♗ ♣	» 20—40 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 40—70 » »	1 »	»	7.—	60.—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Prunus (Fortsetzung):					
spinosa	ca. 40—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	8.—	70.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	80.—
virginiana, rotfrüchtig, besser und wüchsiger als Prunus Padus ● ♧	ca. 25—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 40—70 » »	2 »	»	5.—	40.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
»	» 80—120 » »	3 »	Sämlinge	7.—	60.—
Ptelea — Lederblume.					
trifoliata ♀	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	60.—
Pterocarya — Flügelnuss.					
fraxinifolia ≌	ca. 80—100 cm hoch	1jähr.	Ableger	20.—	—
» **dumosa**	» 60—80 » »	2 »	»	30.—	—
rhoifolia	» 80—100 » »	2 »	»	25.—	—
sinensis	» 100—130 » »	2 »	»	30.—	—
Pyracantha coccinea, siehe Crataegus Pyracantha.					
Quercus — Eiche.					
Cerris Ø	ca. 20—45 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	8.—	—
coccinea Ø	» 10—25 » »	1 »	»	12.—	—
Ilex #	bis 20 » »	1 »	»	15.—	—
imbricaria, Schindeleiche Ø	ca. 40—70 » »	3 »	verpfl. Säml.	50.—	—
palustris, Sumpfeiche ≌ Ø	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	8.—	70.—
»	» 25—50 » »	2 »	»	9.—	80.—
pedunculata, Stieleiche ♗	» 10—15 » »	1 »	»	3.—	20.—
»	» 40—70 » »	2 »	»	5.—	40.—
»	» 50—90 » »	3 »	»	6.—	50.—
rubra, Roteiche ♀ Ø	» 10—20 » »	1 »	»	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	2 »	»	5.—	40.—
»	» 50—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
sessiliflora, Traubeneiche	» 25—50 » »	2 »	Sämlinge	7.—	—
Rhamnus — Faulbaum.					
cathartica ● ♗ ♠	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
chlorophora	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
Frangula ● ♗ ♧ ♠	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 50—80 » »	2 »	»	6.—	50.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
infectoria	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
Rhododendron — Alpenrose.					
ambiguum #		2jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Davidsonianum, laubabwerfend		3 »	» »	35.—	—
hirsutum #		2 »	» »	50.—	—
lutescens #		2 »	» »	30.—	—
»		3 »	» »	40.—	—
racemosum △ #		2 »	» »	30.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	35.—	—
Searsiae △ #		2 »	» »	30.—	—
yanthinum #		2 »	» »	30.—	—
Rhodora — Sumpfrose.					
canadensis △ Ø ≌	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Rhodotypus — Scheinkerrie.					
kerrioides ● ♧	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—
Rhus — Sumach.					
Cotinus, Perückenstrauch ○ ♧ Ø		1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
elegans superba ♧ Ø	ca. 40—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	—
» **superba**	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
typhina ♀ ♧ Ø	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Ribes — Stachel- und Johannisbeere. ♀					
alpinum ♗ von 2 Trieben an	ca. 20—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Ableger	15.—	140.—
aureum	» 100—120 » »	2 »	» »	8.—	70.—
floridum ◑ Ø	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
Grossularia	» 40—80 » »	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
»	» 40—70 » »	2 »	»	6.—	50.—
»	» 50—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
»	» 80—120 » »	3 »	» »	8.—	70.—
sanguineum, Blutjohannisbeere Ø	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» **carneum**	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» »		2 »	verpfl. Ableger	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Robinia — Falsche Akazie.					
Pseudacacia	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	30.—
Rosa — Rose.					
alpina	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
canina caucasica	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	—
» **caucasica**	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
coruscans	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
dahurica	bis 25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
gallica grandiflora	ca. 15—30 » »	1 »	»	6.—	—
kamtschatica	» 15—30 » »	1 »	»	6.—	—
lucida	» 10—20 » »	1 »	»	6.—	—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Mad. Plantier		1 »	bew. Steckl.	25.—	—
multiflora	ca. 50—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
nutkana	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
omeiensis polyphylla	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	10.—	—
» **pteracantha**	» 15—30 » »	1 »	»	10.—	90.—
» »	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
pisocarpa	» 20—35 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
rubiginosa, Schottische Zaunrose	» 20—40 » »	1 »	»	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	1 »	»	5.—	40.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
rubrifolia livida	» 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
rugosa, Apfelrose ♧ +	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» **alba** ♧ +	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» »	» 40—80 » »	3 »	» »	15.—	—
sericea pteracantha, siehe **R. omeiensis pteracantha.**					
tomentosa	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
tuschetica	» 15 » »	1 »	»	6.—	—
villosa pomifera ♧ +		1 »	»	8.—	—
Wichuraiana		1 »	»	10.—	90.—
Rubus — Brombeere.					
phoenicolasius, japanische Weinbeere ♧ +		1jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Theodor Reimers, Sandbrombeere ♧ +		1 »	Sämlinge	20.—	—
Salix — Weide.					
Aglaja	ca. 120—150 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	7.—	60.—
»	» 200—250 » »	2 »	verpfl. Steckl.	8.—	70.—
alba Casteriana	» 70—120 » »	1 »	bew. Steckl.	8.—	70.—
» **splendens**	» 60—100 » »	1 »	» »	8.—	—
» **vitellina aurea**	» 60—100 » »	1 »	» »	8.—	—
» » **Britzensis**	» 60—100 » »	1 »	» »	8.—	—
» » **pendula nova**	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	—
atrovirens pendula	» 80—100 » »	2 »	» »	12.—	—
babylonica pendula	» 70—100 » »	1 »	» »	12.—	—
» **ramulis aureis pendula**	» 70—100 » »	1 »	» »	12.—	—
Braune Weide von Fergana	» 40—70 » »	1 »	» »	8.—	—
candida	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
»	» 80—130 » »	2 »	» »	8.—	—
caroliniana	» 50—80 » »	1 »	» »	6.—	—
»	» 70—100 » »	2 »	» »	8.—	—
chrysostela	» 70—100 » »	1 »	» »	10.—	—
cinerea, ähnl. S. caprea, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
» **tricolor**, Kätzchenweide	» 40—80 » »	1 »	» »	12.—	—
coccinea (S. kermesina)	» 70—100 » »	1 »	» »	8.—	—
cotinifolia	» 40—70 » »	1 »	» »	8.—	—
daphnoides pomeranica, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
» **praecox**, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	12.—	—
elegantissima (S. Sieboldi)	» 70—100 » »	1 »	» »	8.—	—
fragilis sphaerica . . . . **Neu!**	» 60—100 » »	1 »	» »	15.—	—
» **sphaerica**	» 70—120 » »	2 »	» »	20.—	—
Hankensoni	» 70—120 » »	1 »	» »	8.—	—
hippophaëfolia	» 100—150 » »	2 »	» »	8.—	—
irrorata, Kätzchenweide	» 60—100 » »	1 »	» »	10.—	—
laurifolia	» 60—100 » »	1 »	» »	8.—	—
»	» 120—150 » »	2 »	» »	10.—	—
lou cheou	» 40—80 » »	1 »	» »	8.—	—
» »	» 80—120 » »	2 »	» »	10.—	—
lispoclados	» 60—100 » »	1 »	» »	8.—	—
lucida, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	10.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Salix (Fortsetzung):					
macrolepis, Kätzchenweide . . .	ca. 70—100 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
Medemii, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	12.—	—
Muscina, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	12.—	—
nigricans	» 50—80 » »	1 »	» »	8.—	—
phanera	» 80—100 » »	2 »	» »	10.—	—
Piperi	» 80—120 » »	1 »	» »	8.—	—
pischpekensis, Kätzchenweide . .	» 50—90 » »	1 »	» »	12.—	—
»	» 70—100 » »	2 »	» »	14.—	—
pontederana mas, Kätzchenweide	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	100.—
»	» 140—180 » »	2 »	» »	14.—	130.—
pulchra	» 80—130 » »	1 »	» »	12.—	—
» **ruberrima**, Kätzchenweide .	» 80—120 » »	1 »	» »	12.—	100.—
» »	» 150—200 » »	2 »	» »	14.—	—
purpurea nana △ :‖: ♗ ∅	» 20—30 » »	1 »	» »	20.—	—
» **nana**	» 20—30 » »	2 »	» »	25.—	—
Rehderiana	» 60—100 » »	1 »	» »	8.—	—
repens argentea △	» 40—70 » »	1 »	» »	12.—	—
rotundifolia	» 50—80 » »	1 »	» »	8.—	—
Sacramentana	» 70—100 » »	1 »	» »	8.—	—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	10.—	—
Salomoni	» 80—100 » »	1 »	» »	8.—	—
salviaefolia, Kätzchenweide	» 50—90 » »	1 »	» »	12.—	—
Sieboldi, siehe S. elegantissima.					
Smithiana, Kätzchenweide	ca. 70—120 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
tenuifolia	» 80—100 » »	2 »	» »	15.—	—
Sambucus — Holunder.					
canadensis ● ⚘ ≌	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
» **lutea**		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
Ebulus ♃ ●		3 »	Sämlinge	8.—	—
nigra ● ⚘	ca. 25—50 cm hoch	1 »	»	4.—	35.—
»	» 40—80 » »	2 »	»	6.—	50.—
» **argenteo-marginata**		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» **laciniata**		1 »	» »	15.—	—
racemosa ● ♗ ⚘	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
Sarcococca — Schleimbeere.					
ruscifolia ● △ ♯ ♗	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Securinega — Hartholz.					
ramiflora	ca. 40—80 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	18.—	—
Skimmia — Skimmie.					
japonica ♯	ca. 8—15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
»	» 10—20 » »	3 »	» »	20.—	—
Sophora — Schnurbaum.					
japonica	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Korolkowi	» 25—50 » »	2 »	» »	15.—	—
Sorbaria — Fieder-Spierstrauch.					
angustifolia (Sp. Aitchisoni) . . .		1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
»	ca. 15—30 cm hoch	2 »	»	8.—	70.—
arborea glabrata	» 15—30 » »	1 »	»	5.—	40.—
» **glabrata**	» 20—40 » »	2 »	»	8.—	—
» »	» 80—130 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
grandiflora	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
sorbifolia ●	» 15—30 » »	1 »	verpfl. Säml.	5.—	—
»	» 15—30 » »	2 »	» »	8.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	10.—	90.—
» **stellipila**	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
» »	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Sorbus — Vogelbeere. ⚘					
aria magnifica	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
aucuparia moravica + ...	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
foliolosa ⚘ ∅	» 50—80 » »	2 »	» »	15.—	—
sambucifolia	» 15—25 » »	2 »	» »	12.—	—
scandica (S. intermedia)	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
torminalis, Elsbeere	ca. 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Spartium — Pfrieme					
junceum ○ ⋀	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	8.—	—

Spiraea — Spierstrauch.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
albiflora △		2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
arbuscula		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 50—70 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
arcuata		2 »	» »	15.—	—
»	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
arguta		2 »	» »	25.—	225.—
ariaefolia (Holodiscus discolor)	bis 20 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	ca. 40—80 » »	2 »	» »	12.—	110.—
bullata △		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
»		3 »	» »	15.—	—
cana		2 »	» »	12.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	130.—
» × Thunbergi △		2 »	» »	12.—	—
» × »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
canescens myrtifolia		2 »	» »	12.—	—
» myrtifolia	ca. 40—70 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
cantoniensis		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
cinerea		2 »	» »	12.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Douglasi		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
Henryi	ca. 15—30 cm hoch	2 »	Sämlinge	10.—	—
»	» 50—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
japonica Froebeli		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
» macrophylla		2 »	» »	12.—	—
» »		3 »	» »	15.—	—
Menziesi alba × Douglasi		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» Billiardi		1 »	» »	12.—	—
» »	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» macrothyrsa		1 »	bew. Steckl.	12 —	—
» »	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» ovalifolia		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» pseudo-Douglasi		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
microthyrsa		1 »	» »	12.—	—
mollis △		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Nobleana		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» superbetulifolia		1 »	» »	12.—	—
notha superlatifolia		1 »	» »	12.—	—
polonicka		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	13.—	—
pruinosa		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
prunifolia, einfachblühend		2 »	» »	25 —	—
» plena		2 »	» »	25.—	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
pumila Bumalda △		2 »	» »	15.—	—
» Bumalda	ca. 25—45 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » Anthony Waterer △		2 »	» »	18.—	160.—
» » » Waterer	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » crispa △		2 »	» »	18.—	160.—
» glabra △		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
salicifolia latifolia		1 »	» »	12.—	—
» × superba		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
Sargentiana		2 »	» »	15.—	—
Thunbergi		2 »	» »	25.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
tomentosa	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
»	» 40—60 » »	2 »	»	10.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—

Staphylea — Pimpernuss.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
colchica		1jähr.	Ableger	30.—	—
» Coulombieri		1 »	»	30.—	—
» Kochiana		1 »	»	30.—	—
pinnata ◑ ●	bis 15 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	ca. 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
trifolia pauciflora		2 »	Ableger	30.—	—

Stephanandra — Kranzspiere.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
incisa (St. flexuosa)		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Tanakae		2 »	» »	18.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Stranvaesia — Stranvaesie.					
Davidiana ♟ # ஃ ✻		1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	140.—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	20.—	180.—
Styrax — Storaxbaum.					
japonica ஃ	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	bew. Säml.	10.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Obassia ஃ	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	30.—	—
Symphoricarpus — Schneebeere.					
Chenaulti ♟	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	bew. Säml.	15.—	—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	18.—	—
Giraldi	» 40—80 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
orbiculatus variegatus	» 20—40 » »	1 »	bew. Steckl.	18.—	—
racemosus ● ♟ ஃ	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	7.—	60.—
»	» 50—90 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
» **laevigatus** ஃ	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	8.—	—
» »	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	20.—	—
Symplocos — Rechenblume.					
crataegoides ஃ	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	20.—	—
Syringa — Flieder.					
Adamiana ⌀	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
»	ca. 40—70 » »	2 »	»	20.—	—
Emodi ⸸		1 »	Ableger	25.—	—
Palibiniana	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	—
reflexa ⸸ ✻	» 10 » »	1 »	»	8.—	70.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	»	12.—	100.—
»	» 50—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	140.—
Sweginzowi ⸸	bis 15 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
tomentella	ca. 10—25 » »	1 »	»	15.—	140.—
»	» 30—60 » »	2 »	»	20.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	25.—	—
vulgaris ♟	ca. 3—5 mm Durchmesser	2 »	Sämlinge	2.50	20.—
»	» 5—8 » »	2 »	»	5.—	40.—
»	» 3—5 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
»	» 5—8 » »	2 »	» »	6.—	50.—
» **alba**	ca. 15—30 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
Wolfi	bis 15 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
Tamarix — Tamariske.					
germanica (Myricaria)		1jähr.	bew. Steckl.	20.—	—
tetrandra ◑		1 »	» »	20.—	—
» **parviflora**		1 »	» »	20.—	—
Tecoma — Jasmintrompete.					
radicans ±	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
Tilia — Linde. ✻					
grandifolia, Sommerlinde ♟	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
parvifolia, Winterlinde ♟	» 15—30 » »	1 »	»	4.—	35.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
Ulmus — Ulme.					
campestris, Feldulme ♟	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	3.—	20.—
»	» 40—70 » »	2 »	»	4.—	30.—
hollandica	» 70—120 » »	2 »	Ableger	12.—	—
Viburnum — Schneeball.					
americanum	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	—
»		1 »	Ableger	20.—	—
cassinoides ⸸		1 »	»	30.—	—
dentatum		2 »	»	25.—	—
» **longifolium**		1 »	»	20.—	—
Lantana ● ⸸ ஃ	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
»	ca. 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	8.—	70.—
»	» 30—60 » »	2 »	» »	10.—	90.—
Lentago ◑ ஃ ⌀	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
»		1 »	Ableger	25.—	—
nudum ⌀		1 »	»	30.—	—

	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Viburnum (Fortsetzung):				
Opulus, gemeiner Schneeball ◑ ꕤ . . . bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
» . . . . ca. 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	10.—	90.—
» **edule** ꕤ + ...	1 »	Ableger	20.—	—
» **sterile** ⚘	1 »	»	15.—	140.—
» » . . . . ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	18.—	160.—
orientale	1 »	Ableger	20.—	—
prunifolium *L.* (nicht *Hort.*) ⊘	1 »	»	25.—	—
»	2 »	»	30.—	—
rhytidophyllum ♗ # ꕤ	1 »	verpfl. Säml.	20.—	—
tomentosum (V. plicatum) ♗	1 »	Ableger	25.—	—
»	2 »	»	30.—	—
» **sterile** ⊘ ⚘	1 »	»	35.—	—
venosum (V. Hanceanum)	2 »	»	25.—	—
» **Canbyi**	1 »	»	20.—	—
» »	2 »	»	25.—	—
Xanthoxylon — Gelbholz.				
fraxinifolium . . . . ca. 20—35 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	—
Giraldi . . . . bis 10 » »	1 »	Sämlinge	20.—	—

Alphabetisches Verzeichnis

der in vorliegender Preisliste enthaltenen deutschen Pflanzennamen

Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig.

NOTIZEN:

NOTIZEN:

NOTIZEN:

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferungsbedingungen
der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 8 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht massgebend
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Stauden, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist Weener (Ems). Ausschliesslicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich Weener (Ems), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Weener (Ems) oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstag in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäss und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuss durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung Reichsmark 50.— nicht übersteigt.

Muster und Masse.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Masse sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassenbezeichnungen und Grundmasse der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Zusatz der Firma:

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versandes sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig. Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.


Bei telephonisch erteilten Aufträgen muss ich jede Verantwortung infolge der Möglichkeit von Hörfehlern ablehnen und bitte daher stets schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen lassen zu wollen.

Gartenbaubetriebe werden höflichst gebeten, genügende Angaben zu machen, aus denen hervorgeht, dass sie Wiederverkäufer sind, da nur so die Berechnung einwandfrei erfolgen kann.

Da es sich bei den Spesen für Verpackung um Barauslagen handelt, erlaube ich mir diese gleich dem Rollgeld als Nachnahme zu erheben.

Weener, im Herbst 1937.

Herm. A. Hesse,
Baumschulen, Weener (Ems).



Bremen—Weener/Ems 2½ Stunden Fahrzeit.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

Für gedeckte Wagen kommen 5 % Aufschlag in Anrechnung.

	km	Offene Wagenladungen 5000 kg M.	10 000 kg M.
Aachen (Eilg.)	329	81.50	138.—
Allenstein (Hbf.)	1002	147.—	249.—
Altenbeken	262	69.—	117.—
Altenburg (Thür.)	526	112.50	190.—
Altona (Hgbf.)	239	63.50	108.—
Arnswalde	626	124.—	210.—
Aschaffenburg (Hbf.)	480	106.50	180.—
Aschersleben	394	92.50	156.—
Augsburg (Hbf.)	779	137.—	232.—
Bad Blankenburg i. Th.	510	110.50	187.—
Baden-Baden	619	123.50	209.—
Bamberg	621	124.—	210.—
Barmen, Wuppertal-	249	65.50	111.—
Basel (D. R. B.)	779	137.—	232.—
Bayreuth (Hbf.)	652	127.50	216.—
Bebra	404	94.50	160.—
Belzig (Reichsb.)	453	102.—	173.—
Berlin (H. u. L.)	456	102.50	174.—
Beuthen (O.-Schl.)	955	145.50	246.—
Bielefeld (Hbf.)	219	60.—	101.—
Blankenburg (Harz)	409	95.—	161.—
Bocholt	202	56.50	96.—
Bochum (Hbf.)	224	60.50	102.—
Bodenbach	661	128.—	217.—
Bonn	321	80.—	135.—
Bottrop (Hbf.)	213	58.50	99.—
Braunschweig (Hbf.)	295	76.—	129.—
Bremen	116	37.50	64.—
Breslau (Ost)	790	139.—	235.—
Chemnitz (Hbf.)	570	118.50	200.—
Coburg	569	117.50	199.—
Cottbus	579	119.—	201.—
Cuxhaven-Stadt	223	60.50	102.—
Darmstadt (Hbf.)	484	106.50	180.—
Delitzsch	470	104.50	177.—
Dessau (Hbf.)	433	99.—	167.—
Detmold	239	63.50	108.—
Dortmund (Hbf.)	207	58.—	98.—
Dresden-Neustadt	588	120.50	204.—
Duisburg (Hbf.)	226	62.—	105.—
Düsseldorf (Hbf.)	248	65.50	111.—
Eberswalde	500	109.—	185.—
Eger	658	127.50	216.—
Einbeck	316	79.50	134.—
Elberfeld, Wuppertal-	253	67.—	113.—
Elbing	932	145.—	245.—
Emmerich	233	62.50	106.—
Erfurt	462	103.50	175.—
Essen (Hbf.)	226	62.—	105.—
Eydtkuhnen	1198	151.50	256.—
Falkenberg (Elster)	514	110.50	187.—
Flensburg	413	95.50	162.—
Frankfurt a. M. (Hbf.)	458	102.50	174.—
Frankfurt a. d. O.	548	115.—	195.—
Freiburg (Breisg.)	718	132.50	224.—
Freilassing	954	145.50	246.—
Friedrichshafen	841	141.50	240.—
Fulda	460	103.50	175.—
Fürth i. Wald	802	140.—	237.—
Gera (Hbf.)	537	114.—	193.—
Glatz	838	141.—	239.—
Gleiwitz	945	145.50	246.—
Glogau	693	131.50	222.—
Gmünd (Schwäbisch-) (Hbf.)	697	131.50	222.—
Görlitz	664	128.—	217.—
Goslar	328	81.50	138.—
Gotha	445	101.50	172.—
Göttingen	343	84.—	142.—
Gronau i. W.	138	42.50	72.—
Guben	598	121.50	206.—
Güstrow	415	97.—	164.—
Gütersloh (Reichsb.)	204	56.50	96.—
Hadmersleben	368	88.50	150.—
Hagenow	322	80.—	135.—
Halberstadt	363	87.—	147.—
Halbstadt	796	139.—	235.—
Halle (Saale)	452	102.—	173.—
Hamburg (Hgbf.)	233	62.50	106.—
Hameln	259	67.50	114.—
Hamm i. W.	186	53.50	90.—
Hannover (Hgbf.)	232	62.50	106.—
Heide (Holst.)	358	86.50	146.—
Heidelberg (Hbf.)	543	114.50	194.—
Heilbronn (Hbf.)	593	121.—	205.—
Hildesheim (Hbf.)	274	71.—	120.—
Hirschberg (Riesengeb., Hbf.)	738	134.50	228.—
Hoyerswerda	591	121.—	205.—
Ingolstadt (Hbf.)	765	136.50	231.—
Insterburg	1136	150.—	254.—
Iserlohn	238	63.50	108.—
Jena (West)	506	110.—	186.—
Johannisburg	1105	149.50	253.—
Jüterbog	490	108.—	183.—
Kaiserslautern (Hbf.)	513	110.50	187.—
Karlsruhe (Hbf.)	586	120.50	204.—
Kassel (Hbf.)	349	84.50	143.—
Kempen (Niederrhein)	260	69.—	117.—
Kiel (Hbf.)	344	84.—	142.—
Koblenz (Hbf.)	375	89.50	152.—
Kolberg	689	130.—	220.—
Köln Gereon	297	76.—	129.—
Königsberg (O.-Pr.) (Ost)	1050	148.—	251.—
Konstanz	829	140.50	238.—
Köslin	729	134.—	227.—

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Fortsetzung: Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

Für gedeckte Wagen kommen 5 % Aufschlag in Anrechnung.

	km	Offene Wagenladungen 5000 kg M.	10 000 kg M.		km	Offene Wagenladungen 5000 kg M.	10 000 kg M.
Korschen	1066	149.—	252.—	Pritzwalk	376	89.50	152.—
Krefeld	248	65.50	111.—	Quakenbrück	117	37.50	64.—
Kreiensen	304	76.50	130.—	Rastenburg	1078	149.—	252.—
Kreuz	652	127.50	216.—	Ratibor	946	145.50	246.—
Kreuzburg (Oberschl.)	880	143.50	243.—	Regensburg (Hbf.)	774	137.—	232.—
Kufstein (Reichsb.)	934	145.—	245.—	Reutlingen (Hbf.)	702	132.—	223.—
Kulmbach	620	124.—	210.—	Riesa	546	115.—	195.—
Küstrin Neustadt (Hbf.)	549	115.—	195.—	Rottweil	729	134.—	227.—
Landsberg (Warthe)	593	121.—	205.—	Saarbrücken (Hbf.)	555	116.50	197.—
Landshut (Bay.) (Hbf.)	836	141.—	239.—	Sagan	651	127.50	216.—
Langensalza	424	97.50	165.—	Salzburg (Reichsb.)	961	146.50	248.—
Leipzig (M.-Th.-Bf.)	486	107.50	182.—	Sangerhausen	434	99.—	167.—
Liegnitz	724	134.—	227.—	Sassnitz	559	116.50	197.—
Lindau (Hbf.)	864	142.50	241.—	Schaffhausen (Reichsb.)	817	140.—	237.—
Lippstadt	225	62.—	105.—	Schleswig Altstadt	376	89.50	152.—
Lübben (Reichsb.)	538	114.—	193.—	Schneidemühl	711	132.50	224.—
Lübeck	299	76.—	129.—	Schweinfurt (Hbf.)	579	119.—	201.—
Luckenwalde	503	109.—	185.—	Schwerin (Meckl.) (Hbf.)	346	84.50	143.—
Lüneburg	241	65.—	110.—	Seestadt Rostock	433	99.—	167.—
Lyck	1155	151.—	255.—	Siegen	326	81.50	138.—
Magdeburg (Hbf.)	371	89.—	151.—	Singen (Hohentwiel)	797	139.—	235.—
Mainz (Hbf.)	466	104.—	176.—	Sorau	638	125.50	212.—
Mannheim (Hgbf.)	527	112.50	190.—	Stargard (Pom.)	592	121.—	205.—
Marburg (Lahn)	370	89.—	151.—	Stendal	351	86.—	145.—
Marienburg (Westpr.)	903	144.50	244.—	Stettin (Hbf.)	559	116.50	197.—
Meiningen	501	109.—	185.—	Stolp	796	139.—	235.—
Memmingen	793	139.—	235.—	Stralsund	507	110.—	186.—
Meppen	62	23.—	39.—	Straubing	816	140.—	237.—
Minden (Westf.)	228	62.—	105.—	Stuttgart (Hbf.)	645	126.—	213.—
Mittelwalde	874	143.—	242.—	Swinemünde (Hbf.)	586	120.50	204.—
Mühlhausen i. Th.	405	95.—	161.—	Taben	501	109.—	185.—
Mülheim (Ruhr)	224	60.50	102.—	Templin	485	107.50	182.—
München (Hbf.)	840	141.50	240.—	Tetschen	661	128.—	217.—
Münster i. W. (Hbf.)	152	45.50	77.—	Tilsit	1172	151.50	256.—
Naumburg (Saale) (Hbf.)	498	108.50	184.—	Torgau	504	109.—	185.—
Neumünster	313	78.50	133.—	Trier (Hbf.)	468	104.—	176.—
Neustettin	726	134.—	227.—	Tübingen (Hbf.)	708	132.—	223.—
Neustrelitz (Reichsb.)	446	101.50	172.—	Uelzen	243	65.—	110.—
Nordhausen	395	93.50	158.—	Ulm	738	134.50	228.—
Nürnberg (Hbf.)	681	130.—	220.—	Velbert (Hbf.)	250	67.—	113.—
Oberhausen (Hbf.)	218	60.—	101.—	Waren (Müritz)	425	98.—	166.—
Oderberg	972	146.50	248.—	Warnemünde	447	101.50	172.—
Offenbach (Main)	467	104.—	176.—	Weimar (Thür.)	483	106.50	180.—
Oldenburg (Oldbg.)	70	24.50	42.—	Wetzlar	382	91.—	154.—
Oldenburg (Holst.)	359	86.50	146.—	Wesel	221	60.50	102.—
Oppeln	872	143.—	242.—	Wittenberge	339	83.—	141.—
Osnabrück (Eilg.)	161	47.50	80.—	Würzburg	570	118.50	200.—
Osterode (Harz)	343	84.—	142.—	Ziegenhals (Hbf.)	886	143.50	243.—
Passau (Hbf.)	892	144.50	244.—	Zittau	687	130.—	220.—
Plathe	632	125.50	212.—	Züllichau	642	126.—	213.—
Plauen (Vogtl.) (Ob. Bf.)	595	121.50	206.—				

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Tarifsätze für Stückgüter

können nicht genau angegeben werden, da sie bis zu 200 kg bei je 10 kg und über 200–1000 kg bei je 20 kg sich ändern unter Berücksichtigung von je 5 km bei 1—99 km und je 10 km bei über 100 km Entfernung. Mindestfracht M. —.60.

Lieferfristen.

Die Lieferfristen betragen, sofern der Tarif keine kürzeren Fristen vorsieht, im Geltungsbereich der Verkehrsordnung:

a) für Frachtgut:
1. Abfertigungsfrist .... 2 Tage
2. Beförderungsfrist bei einer Entfernung bis zu 100 Tarifkilometern. 1 Tag

Bei grösseren Entfernungen für je weitere angefangene 200 Tarifkilometer ... 1 »

b) für Eilgut:
1. Abfertigungsfrist .... 1 »
2. Beförderungsfrist für je angefangene 300 Tarifkilometer .... 1 »

c) für beschleunigtes Eilgut:
1. Abfertigungsfrist .... $1/2$ »
2. Beförderungsfrist für je angefangene 300 Tarifkilometer .... $1/2$ »

Im Geltungsbereiche des internationalen Frachtübereinkommens betragen die Lieferfristen

a) für Eilgut:
1. Abfertigungsfrist .... 1 Tag
2. Beförderungsfrist für je auch nur angefangene 250 Tarifkilometer. 1 »

b) für Frachtgut:
1. Abfertigungsfrist .... 2 Tage
2. Beförderungsfrist für je auch nur angefangene 250 Tarifkilometer. 2 »

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf deutschen Bahnen werden als Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von 4 m nicht überschreiten; bei Aufgabe als Wagenladungen ohne diese Beschränkung.

☛ Schutz der Sendungen bei Frostgefahr! ☚

Alle Sendungen verlassen meinen Betrieb auf Grund sorgfältiger, täglicher Beobachtungen nur bei vollkommen frostfreier Witterung. Außerdem wird die Verpackung von alteingearbeitetem Personal so wetterfest hergestellt, daß mäßige Kältegrade den Sendungen nichts anhaben können. Sollte aber infolge unvorhergesehenen Witterungsumschwungs dennoch eine Sendung am Bestimmungsort bei größerer Kälte eintreffen, so sind nachstehende Weisungen zu beachten, wodurch der geschätzte Käufer verhindert, daß die angekommenen Pflanzen Schaden leiden.

Alle Sendungen müssen in frostfreiem, nicht geheiztem Raum langsam auftauen, und zwar ohne daß vorher mit dem Auspacken begonnen wurde. Erst nach dem vollständigen Auftauen dürfen die Pflanzen ausgepackt und, falls Tauwetter inzwischen eingetreten ist, an Ort und Stelle gepflanzt werden. Sollte dies des Frostes wegen nicht möglich sein, so müssen die ausgepackten Pflanzen an einer geschützten Stelle im Garten — etwa unter hohen Bäumen, wo der Frost noch nicht zu tief ins Erdreich eingedrungen ist — nach Beseitigung der oberen zusammengefrorenen Erdschicht dicht beieinander eingeschlagen und stark mit Erde bedeckt und angehäufelt werden. Zur weiteren Vorsicht empfiehlt es sich, das Ganze noch mit Stroh, Schilf, Tannenreisig, trockenem Laub oder strohigem Dünger einzudecken, und zwar so, daß Wasser gut ablaufen kann. So versorgt, können die Pflanzen bis zum Eintritt des Tauwetters im Einschlag verbleiben, um dann möglichst unter Ausnutzung der wärmeren Mittagsstunden und unter Beachtung aller sonstigen Pflanzregeln an Ort und Stelle gepflanzt zu werden.